## La théorie de Gross Pitaevskii pour un condensat de Bose-Einstein en rotation : vortex et transitions de phase

Nicolas Rougerie Directeurs de thèse : Xavier Blanc et Sylvia Serfaty


Laboratoire Jacques-Louis Lions, 09 Décembre 2010

#### La condensation de Bose-Einstein


- un condensat de Bose-Einstein (BEC) exhibe des propriétés quantiques à une échelle macroscopique ( $\sim 100 \mu m$  typiquement)
- de 'nombreux' (bosons) d'un gaz ultra-froid occupent le même état quantique
- On peut décrire un BEC avec une seule fonction d'onde macroscopique ψ à valeurs complexes,
- $|\psi|^2$  donne la densité de matière.
- Prédiction du phénomène par Einstein, basée sur des idées de Bose (1924, 1925)
- Première observation expérimentale en 1995 (prix Nobel de physique 2001 attribué à Cornell, Wieman et Ketterle)

## Superfluidité et tourbillons quantiques

Un BEC réagit à la rotation par la nucléation de tourbillons (vortex). L'observation de tourbillons dans un fluide à l'équilibre est une manifestation de l'absence de viscosité, et donc de la superfluidité.



Vortex dans un condensat en rotation, expériences au LKB, ENS Ulm [K.W. Madison et al, Phys. Rev. Lett. 84 806 (2000)]



Réseaux de vortex, expériences au MIT [J.R. Abo-Shaeer et al. Science 292 476 (2001)]



#### Théorie de Gross-Pitaevskii bi-dimensionnelle

On note 
$$x = (x_1, x_2)$$
 et  $x^{\perp} = (-x_2, x_1)$ 

$$\mathcal{E}^{\mathrm{GP}}[\psi] = \int_{\mathbb{R}^2} \left( |\nabla \psi|^2 - 2\Omega x^{\perp} \cdot (i\psi, \nabla \psi) + V(x) |\psi|^2 + G|\psi|^4 \right) dx$$

à minimiser sous la contrainte de masse

$$\int_{\mathbb{R}^2} |\psi|^2 dx = 1.$$

- G: mesure les interactions entre particules
- ightharpoonup V(x) : potentiel de piégeage, en général un piège magnétique
- $ightharpoonup \Omega$  : vitesse angulaire à laquelle le piège est mis en rotation
- $(i\psi, \nabla \psi) = -Im(\psi \nabla \psi^*)$ : courant superfluide  $(= \rho^2 \nabla \phi$  si  $\psi = \rho e^{i\phi})$



## Description des tourbillons

Un vortex est décrit par un point où il y a

- ▶ annulation de la densité de matière  $|\psi|^2 = 0$
- une circulation de phase (degré topologique) quantifiée

$$\int_{\mathcal{C}}\partial_{ au}\phi=2\pi d,\quad d\in\mathbb{Z}^*$$

si  $\psi = \rho e^{i\phi}$  sur  $\mathcal{C}$ , une courbe fermée autour du vortex avec vecteur tangent  $\tau$ .

Prototype de vortex de degré d à l'origine:

$$\psi(r,\theta) = f(r)e^{id\theta} = f(r)\left(\frac{z}{|z|}\right)^d$$

avec

- ightharpoonup f radiale, réelle et  $\geq 0$
- f(0) = 0



## Quelques livres de référence

- ► F. Béthuel, H. Brézis, F. Hélein, *Ginzburg-Landau vortices*, Birkhäuser 1994
- ► E.H. Lieb, R. Seiringer, J.P. Solovej, J. Yngvason, *The Mathematics of the Bose Gas and its Condensation*, Birkhäuser 2005
- ► A. Aftalion, Vortices in Bose-Einstein Condensates, Birkhäuser 2006
- E. Sandier, S. Serfaty, Vortices in the Magnetic Ginzburg-Landau Model, Birkhäuser 2007
- S. Fournais, B. Helffer, Spectral Methods in Surface Superconductivity, Birkhäuser 2010

## Importance du potentiel de piégeage

$$\mathcal{E}^{\mathrm{GP}}[\psi] = \int_{\mathbb{R}^2} \left( |\nabla \psi - i\Omega x^{\perp} \psi|^2 + \left( V(x) - \Omega^2 |x|^2 \right) |\psi|^2 + G|\psi|^4 \right) dx,$$

- ▶ pour la plupart des expériences V est un potentiel harmonique  $V(x) = a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$   $\Omega^2 > \min(a_1, a_2) \Rightarrow \mathcal{E}^{\mathrm{GP}}$  n'est pas bornée inférieurement, perte de confinement.
- Fetter (PRA 2001): utiliser un potentiel croissant plus rapidement que  $|x|^2$  à l'infini. Alors  $\Omega$  peut être arbitrairement grand.
- Expériences à l' ENS (Bretin-Stock-Seurin-Dalibard PRL 2004) avec un potentiel  $V(x) \approx |x|^2 + k|x|^4$

Autres types de potentiels permettant de prendre  $\Omega \to +\infty$ :

- pièges homogènes  $V(x) = |x|^s$ , s > 2
- ▶ piège plat  $V_R(x) = +\infty$  pour |x| > R, V(x) = 0 pour  $|x| \le R$ , problème posé sur  $B_R$ .



# Vitesses critiques en théorie de Gross-Pitaevskii avec piégeage anharmonique


#### "Conjectures": le condensat

- ne contient pas de vortex si  $\Omega \leq \Omega_{c1}$
- lacktriangle contient un réseau de vortex si  $\Omega_{c1} < \Omega \leq \Omega_{c2}$
- lacktriangle contient un réseau de vortex et un trou central si  $\Omega_{c2} \leq \Omega \leq \Omega_{c3}$
- ightharpoonup contient uniquement un vortex géant central si  $\Omega_{c3} < \Omega$ .


[Fischer-Baym PRL 2003, Kavoulakis-Baym NJP 2003, Fetter-Jackson-Stringari PRA 2005 ...] Comparaison avec le piégeage harmonique :

- ▶ Si  $\Omega$  "proche de"  $\Omega_{c2}$ , régime de Landau (Aftalion-Blanc, Aftalion-Blanc-Nier …), réseau de vortex déformé
- ightharpoonup Si  $\Omega$  "trop proche de"  $\Omega_{c2}$ , perte de validité de la description Gross-Pitaevskii (Lieb-Seiringer-Yngvason, Lewin-Seiringer), "effet Hall quantique"

## Les trois transitions de phase en images : expériences




Expériences au LKB, ENS Paris, piège harmonique. [K.W. Madison *et al* Phys. Rev. Lett. 84, 806 (2000)]



Expériences au LKB, ENS Paris, piège anharmonique. [V. Bretin et al. Phys. Rev. Lett. 92, 275 (2004)]

# Les trois transitions de phase en image : simulations numériques



[A.L. Fetter, B. Jackson, S. Stringari, Phys. Rev. A 71 (2005)]



#### Présentation des résultats

- 1. Résultats pour le piège "quadratique plus quartique"
  - 1.1 Régime "plus bas niveau de Landau" : réseau de vortex dans un condensat annulaire (avec Xavier Blanc)
  - 1.2 Régime de rotation extrême et vortex géant
- 2. Résultats pour le "piège plat" : la troisième vitesse critique
  - 2.1 Borne supérieure et vortex géant (avec Michele Correggi et Jakob Yngvason)
  - 2.2 Borne inférieure et cercle de vortex
  - 2.3 Quelques idées des preuves

#### Présentation des résultats

- 1. Résultats pour le piège "quadratique plus quartique"
  - 1.1 Régime "plus bas niveau de Landau" : réseau de vortex dans un condensat annulaire (avec Xavier Blanc)
  - 1.2 Régime de rotation extrême et vortex géant
- 2. Résultats pour le "piège plat" : la troisième vitesse critique
  - 2.1 Borne supérieure et vortex géant (avec Michele Correggi et Jakob Yngvason)
  - 2.2 Borne inférieure et cercle de vortex
  - 2.3 Quelques idées des preuves

## Le plus bas niveau de Landau "LLL"

- Premier espace propre de l'opérateur de Ginzburg-Landau  $-(\nabla i\Omega x^{\perp})^2$  sur  $\mathbb{R}^2$
- Associé à la valeur propre Ω :

$$\inf_{\|\psi\|_{L^2(\mathbb{R}^2)}=1}\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2}\left|\nabla\psi-i\Omega x^\perp\right|^2=\Omega$$

- Existence d'un trou spectral égal à Ω.
- Constitué des fonctions de la forme

$$\psi(x_1, x_2) = f(z)e^{-\Omega|z|^2/2}$$

avec  $z = x_1 + ix_2$  et f holomorphe.

## Idée : Restreindre la minimisation de l'énergie au LLL

Utilisé pour des condensats dans des pièges harmoniques dans la limite  $\Omega \to 1$ : Ho, Cooper, Komineas, Read, Dalibard, Aftalion, Blanc, Nier ...

$$\mathcal{E}^{\mathrm{GP}}[\psi] = \int_{\mathbb{R}^2} \left( \frac{1}{2} |\nabla \psi - i\Omega x^{\perp} \psi|^2 + \frac{1 - \Omega^2}{2} |x|^2 |\psi|^2 + \frac{G}{2} |\psi|^4 \right) dx.$$

Partant de

$$\mathcal{E}^{GP}[\psi] = \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{2} |\nabla \psi - i\Omega x^{\perp} \psi|^2 + \left( \frac{(1 - \Omega^2)}{2} |x|^2 + \frac{k}{4} |x|^4 \right) |\psi|^2 + \frac{G}{2} |\psi|^4$$

et prenant  $\varepsilon = k^{1/3} \to 0$ ,  $\Omega = 1 + \beta k^{2/3} = 1 + \beta \varepsilon^2$ 

on se ramène à l'étude du problème variationnel

$$\begin{split} \mathcal{F}^{\mathrm{LLL}}[f] &= \int_{\mathbb{C}} \left( \left( -\beta |z|^2 + \frac{1}{4} |z|^4 \right) |f|^2 e^{-|z|^2/\varepsilon} + \frac{G}{2} |f|^4 e^{-2|z|^2/\varepsilon} \right) dz. \\ F^{\mathrm{LLL}} &= \inf \left\{ \mathcal{F}^{\mathrm{LLL}}[f], \ f \in \mathfrak{F}_{\varepsilon}, \ \|f\|_{\mathfrak{F}_{\varepsilon}} = 1 \right\}. \end{split}$$

dans l'espace de Fock-Bargmann

$$\mathfrak{F}_{\varepsilon}:=\left\{f \text{ holomorphe }, \int_{\mathbb{C}}|f|^2 \mathrm{e}^{-|z|^2/\varepsilon}dz<\infty\right\}$$

# Résultats théoriques (1) : Aspect bien posé et propriétés des minimiseurs

#### Théorème (X. Blanc, NR, 2008)

- ▶ Il existe au moins une solution au problème de minimisation.
- Tout minimiseur satisfait l'équation d'Euler-Lagrange

$$(-\beta + \frac{1}{4}\varepsilon)\Pi_{\varepsilon}(|z|^{2}f) + \frac{1}{4}\Pi_{\varepsilon}(|z|^{2}\Pi_{\varepsilon}(|z|^{2}f)) + G\Pi_{\varepsilon}(^{-|z|^{2}/\varepsilon}|f|^{2}f) = \mu f$$

où  $\mu$  est un multiplicateur de Lagrange et  $\Pi_{\varepsilon}$  le projecteur orthogonal sur  $\mathfrak{F}_{\varepsilon}$ .

Si ε est suffisament petit, toute solution du problème de minimisation a un nombre infini de zéros.

## Résultats théoriques (2) : Construction de points quasi-critiques

$$\begin{split} \mathcal{E}_b^{\mathrm{TF}}[\rho] &= \int_{\mathbb{C}} \left( \left( -\beta |z|^2 + \frac{1}{4} |z|^4 \right) |\rho| + \frac{bG}{2} |\rho|^2 \right) dz \\ E_b^{\mathrm{TF}} &= \inf \left\{ \mathcal{E}_b^{\mathrm{TF}}[\rho] \,, \, \rho \geq 0, \, \int_{\mathbb{R}^2} |z|^2 \rho < +\infty, \, \int_{\mathbb{R}^2} \rho = 1 \right\}. \end{split}$$

Théorème (X. Blanc, NR 2008)

On peut construire une fonction test f telle que

$$(-\beta + \frac{1}{4}\varepsilon)\Pi_{\varepsilon}(|z|^{2}f) + \frac{1}{4}\Pi_{\varepsilon}\left(|z|^{2}\Pi_{\varepsilon}(|z|^{2}f)\right) + G\Pi_{\varepsilon}(e^{-|z|^{2}/\varepsilon}|f|^{2}f) = \mu_{b}^{\mathrm{TF}}f + R_{\varepsilon}$$

avec  $\mu_h^{\mathrm{TF}} \in \mathbb{R}$  et  $\|R_{\varepsilon}\|_{\mathfrak{F}_{-}} < C\varepsilon^{1/4}$ . De plus


$$F^{\mathrm{LLL}} \leq \mathcal{F}^{\mathrm{LLL}}[f] = E_b^{\mathrm{TF}} + O(\varepsilon^{1/4}).$$

- Idée : déformer un réseau de vortex hexagonal régulier.
- Question naturelle (et difficile) : borne inférieure correspondante




#### Résultats numériques

Minimisation de  $\mathcal{F}^{\mathrm{LLL}}[P]$  pour un polynôme P en fonction de la position des zéros (ie vortex).



Simulations numériques,  $\textit{G}=3, \textit{k}=10^{-4}, \textit{\beta}=1 \, (\Omega-1=2.2 \, 10^{-3})$ 



Simulations numériques,  $G = 3, k = 10^{-5}, \beta = 1 (\Omega - 1 = 4.6 \cdot 10^{-4})$ 

#### Présentation des résultats

- 1. Résultats pour le piège "quadratique plus quartique"
  - 1.1 Régime "plus bas niveau de Landau" : réseau de vortex dans un condensat annulaire (avec Xavier Blanc)
  - 1.2 Régime de rotation extrême et vortex géant
- 2. Résultats pour le "piège plat" : la troisième vitesse critique
  - 2.1 Borne supérieure et vortex géant (avec Michele Correggi et Jakob Yngvason)
  - 2.2 Borne inférieure et cercle de vortex
  - 2.3 Quelques idées des preuves

## Vortex géant dans le régime de rotation extrême

$$\mathcal{E}^{\mathrm{GP}}[\psi] = \int_{\mathbb{R}^2} \left( \left| \nabla \psi - i \Omega x^{\perp} \psi \right|^2 + \left( \left( 1 - \Omega^2 \right) |x|^2 + k|x|^4 \right) |\psi|^2 + G|\psi|^4 \right) dx.$$

Etat fondamental  $\Psi^{\mathrm{GP}}$  et énergie fondamentale  $E^{\mathrm{GP}}$ . Régime de rotation extrême :

$$L = \Omega^3 k^{-1} \to +\infty$$
, G fixé.

#### Théorème (NR 2009)

Il existe un anneau  $\mathcal{A}=\left\{1-\mathit{CL}^{-1/2}\leq r\leq 1+\mathit{CL}^{-1/2}\right\}$  tel que

- $\blacktriangleright \int_A \left| \Psi^{\mathrm{GP}} \right|^2 = 1 o(1)$ . La masse est concentrée dans  $\mathcal A$
- $ightharpoonup \Psi^{\mathrm{GP}}$  ne s'annule pas dans  $\mathcal{A}$ . Pas de vortex dans  $\mathcal{A}$
- + Résultats partiels dans le cas  $L \gg G^2$ .

#### Présentation des résultats

- 1. Résultats pour le piège "quadratique plus quartique"
  - 1.1 Régime "plus bas niveau de Landau" : réseau de vortex dans un condensat annulaire (avec Xavier Blanc)
  - 1.2 Régime de rotation extrême et vortex géant
- 2. Résultats pour le "piège plat" : la troisième vitesse critique
  - 2.1 Borne supérieure et vortex géant (avec Michele Correggi et Jakob Yngvason)
  - 2.2 Borne inférieure et cercle de vortex
  - 2.3 Quelques idées des preuves

## Le cadre : régime de forte interaction

On considère le piège plat

$$V(x)=+\infty$$
 pour  $|x|>1, \quad V(x)=0$  pour  $|x|\leq 1.$ 

- En toute rigueur, modèle pour un superfluide dans une enceinte solide.
- ▶ Formellement, limite  $s \to +\infty$  d'un piège homogène.

$$V(x) = |x|^s.$$

L'énergie devient (avec  $G = \frac{1}{\epsilon^2}$ )

$$\mathcal{E}^{\mathrm{GP}}[\psi] = \int_{B_1} \left( |\nabla \psi - i\Omega x^{\perp} \psi|^2 - \Omega^2 |x|^2 |\psi|^2 + \frac{1}{\varepsilon^2} |\psi|^4 \right) dx,$$

avec état fondamental  $\Psi^{\mathrm{GP}}$  et énergie fondamentale  $E^{\mathrm{GP}}$  ie

$$\mathcal{E}^{\mathrm{GP}} = \inf_{\|\psi\|_{\boldsymbol{L}^{2}(\boldsymbol{B}_{1})}=1} \mathcal{E}^{\mathrm{GP}}[\psi] = \mathcal{E}^{\mathrm{GP}}[\boldsymbol{\Psi}^{\mathrm{GP}}].$$

On considère le régime de forte interaction  $\varepsilon \to 0$ .



## Résultats antérieurs : la première vitesse critique

#### Régime $\Omega \lesssim |\log \varepsilon|$ :

- les forces centrifuges sont négligeables, on peut adapter l'analyse pour des pièges harmoniques
- Aftalion, Du PRA 2001, Ignat, Millot JFA et RMP 2006, Rindler-Daller Physica A 2008, Aftalion, Jerrard et Royo-Letelier preprint 2010
- ightharpoonup Evaluation de  $Ω_{c1}$

$$\Omega_{c1} = |\log \varepsilon|(1 + o(1)).$$

- lacksquare Si  $\Omega < \Omega_{c1}$  : pas de vortex
- ▶ Si  $\Omega = \Omega_{c1} + C \log |\log \varepsilon|$  : nombre borné de vortex minimisant une certaine énergie renormalisée.

## Résultats antérieurs : la deuxième vitesse critique

## Régime $|\log \varepsilon| \ll \Omega \ll \varepsilon^{-2} |\log \varepsilon|^{-1}$ :

- Correggi, Rindler-Daller, Yngvason JMP 2007 (deux articles), Correggi, Yngvason JPA 2008
- ightharpoonup Si  $\Omega \leq rac{2}{\sqrt{\pi}arepsilon}$  : condensat en forme de disque
- If  $\Omega > \frac{2}{\sqrt{\pi}\varepsilon}$  : condensat annulaire
- ▶ Distribution uniforme de vorticité dans le condensat tant que  $|\log \varepsilon| \ll \Omega \ll \varepsilon^{-2} |\log \varepsilon|^{-1}$ .
- ► Evaluation de la seconde vitesse critique

$$\Omega_{c2}=rac{2}{\sqrt{\pi}arepsilon}(1+o(1)).$$

#### Présentation des résultats

- 1. Résultats pour le piège "quadratique plus quartique"
  - 1.1 Régime "plus bas niveau de Landau" : réseau de vortex dans un condensat annulaire (avec Xavier Blanc)
  - 1.2 Régime de rotation extrême et vortex géant
- 2. Résultats pour le "piège plat" : la troisième vitesse critique
  - 2.1 Borne supérieure et vortex géant (avec Michele Correggi et Jakob Yngvason)
  - 2.2 Borne inférieure et cercle de vortex
  - 2.3 Quelques idées des preuves

Le régime 
$$\Omega \propto rac{1}{arepsilon^2 |\log arepsilon|}$$

$$\Omega = \frac{\Omega_0}{\varepsilon^2 |\log \varepsilon|}$$

avec une constante  $\Omega_0$ .

Fonctionnelle d'énergie de type Thomas-Fermi :

$$\mathcal{E}^{\mathrm{TF}}[\rho] = \int_{\mathcal{B}} \left( -\Omega^{2} |x|^{2} \rho + \frac{1}{\varepsilon^{2}} \rho^{2} \right) dx$$

$$E^{\mathrm{TF}} = \inf_{\|\rho\|_{L^{1}(B_{1})} = 1} \mathcal{E}^{\mathrm{TF}}[\rho] = \mathcal{E}^{\mathrm{TF}}[\rho^{\mathrm{TF}}]$$

$$\rho^{\mathrm{TF}}(r) = \frac{\varepsilon^{2} \Omega^{2}}{2} \left( r^{2} - R_{h}^{2} \right)_{+}$$

avec

$$1 - R_h^2 = \frac{2}{\sqrt{\pi} \varepsilon \Omega} \propto \frac{\varepsilon |\log \varepsilon|}{\Omega_0}.$$

On définit

$$\mathcal{A}_{\text{bulk}} = \left\{ R_h + \varepsilon |\log \varepsilon|^{-1} \le r \le 1 \right\}.$$

Si

$$\Omega_0 > rac{2}{3\pi},$$

Alors, pour tout  $x \in A_{\text{bulk}}$ 

$$\left| |\Psi^{\mathrm{GP}}(x)|^2 - \rho^{\mathrm{TF}}(x) \right| \ll \rho^{\mathrm{TF}}(x).$$

De plus

$$\deg(\Psi^{\mathrm{GP}},\partial\mathcal{B}) = \Omega - rac{2}{3\sqrt{\pi}arepsilon}(1-o(1))$$

La masse est concentrée dans  $\mathcal{A}_{\mathrm{bulk}}$ 

$$\int_{A_{\text{balls}}} |\Psi^{\text{GP}}(x)|^2 = 1 - o(1)$$

▶ II n'y a pas de vortex dans  $\mathcal{A}_{\text{bulk}}$ 

$$|\Psi^{\mathrm{GP}}(x)|^2 \geq \frac{C}{\varepsilon |\log \varepsilon|^{-3}}.$$

•  $\Omega_{c3} \leq \frac{2}{3\pi \varepsilon^2 || \log \varepsilon|} (1 + o(1))$ 

- 1. Résultats pour le piège "quadratique plus quartique"
  - 1.1 Régime "plus bas niveau de Landau" : réseau de vortex dans un condensat annulaire (avec Xavier Blanc)
  - 1.2 Régime de rotation extrême et vortex géant
- 2. Résultats pour le "piège plat" : la troisième vitesse critique
  - 2.1 Borne supérieure et vortex géant (avec Michele Correggi et Jakob Yngvason)
  - 2.2 Borne inférieure et cercle de vortex
  - 2.3 Quelques idées des preuves

## Comment repérer les vortex ? : la mesure de vorticité

#### Extraction du vortex géant

▶ Pour  $\omega \in \mathbb{Z}$  et f à valeurs réelles on introduit la fonctionnelle d'énergie "vortex géant"

$$\hat{\mathcal{E}}_{\omega}^{\text{GP}}[f] = \mathcal{E}^{\text{GP}}[f(r)e^{i([\Omega]-\omega)\theta}]$$

avec son énergie fondamentale  $\hat{\mathcal{E}}_{\omega}^{\mathrm{GP}}$ .

- On prend  $\omega_0$  minimisant  $\hat{E}_{\omega}^{GP}$  et g le fondamental associé.
- On définit

$$u = \frac{\Psi^{\mathrm{GP}}}{ge^{i([\Omega] - \omega_{\mathbf{0}})}}.$$

Courant superfluide associé

$$j := (iu, \nabla u)$$

Mesure de vorticité associée

$$\mu := \operatorname{curl} j$$
.

La mesure  $\mu$  "compte" les vortex du condensat.



## Asymptotiques pour la mesure de vorticité (1)

On prend

$$\Omega = \frac{2}{3\pi\varepsilon^2|\log\varepsilon|} - \frac{\Omega_1}{\varepsilon^2|\log\varepsilon|}, \quad \frac{\log|\log\varepsilon|}{|\log\varepsilon|} \ll \Omega_1 \ll 1.$$

Soit

$$\mathcal{A}_{\text{bulk}} := \{ \vec{r} \mid R_{\text{bulk}} \le r \le 1 \}, \quad R_{\text{bulk}} := R_h + \varepsilon |\log \varepsilon| \Omega_1^{1/2}.$$

 $\mathcal{A}_{\mathrm{bulk}}$  contient presque toute la masse

$$\int_{A_{
m b, M_2}} |\Psi^{
m GP}|^2 = 1 - O(\Omega_1^{1/2}).$$

Pour  $\nu$  dans  $C_c^1(A_{\text{bulk}})^*$  on définit la norme

$$\left\|\nu\right\|_{g} := \sup_{\phi \in C_{\epsilon}^{\infty}(\mathcal{A}_{\text{bulk}})} \frac{\left|\int_{\mathcal{A}_{\text{bulk}}} \nu \phi\right|}{\left(\int_{\mathcal{A}_{\text{bulk}}} \frac{1}{g^{2}} |\nabla \phi|^{2}\right)^{1/2} + \varepsilon |\log \varepsilon| \|\nabla \phi\|_{L^{\infty}(\mathcal{A}_{\text{bulk}})}}.$$

## Asymptotiques pour la mesure de vorticité (2)

#### Théorème (NR 2010)

Il existe un rayon R<sub>\*</sub> (calculable) et un nombre (calculable)

$$N_* \propto rac{\Omega_1}{arepsilon}$$

tels que, en notant  $\delta_*$  la mesure de Lebesgue sur le cercle de rayon  $R_*$ ,

$$\|\mu - N_* \delta_*\|_{g} \ll \|N_* \delta_*\|_{g}.$$

- ▶ II y a "environ"  $N_*$  vortex dans le condensat.
- ▶ Ils sont équitablement répartis sur le cercle de rayon R<sub>\*</sub>

$$\Omega_{
m c3} = rac{2}{3\piarepsilon^2 |\logarepsilon|} (1+o(1)).$$



- 1. Résultats pour le piège "quadratique plus quartique"
  - 1.1 Régime "plus bas niveau de Landau" : réseau de vortex dans un condensat annulaire (avec Xavier Blanc)
  - 1.2 Régime de rotation extrême et vortex géant
- 2. Résultats pour le "piège plat" : la troisième vitesse critique
  - 2.1 Borne supérieure et vortex géant (avec Michele Correggi et Jakob Yngvason)
  - 2.2 Borne inférieure et cercle de vortex
  - 2.3 Quelques idées des preuves

#### Un problème réduit sur un anneau

Nec  $\hat{\mathcal{E}}_{\omega_0}^{\mathrm{GP}}$ , g respectivement l'énergie et le profil "vortex géant", on peut découpler l'énergie [Lassoued-Mironescu, JAM 1999]

$$\begin{split} \mathcal{E}^{\mathrm{GP}}[\psi] &= \hat{\mathcal{E}}_{\omega_{0}}^{\mathrm{GP}} + \mathcal{E}[v] \\ \mathcal{E}[v] &= \int_{\mathcal{B}} g^{2} |\nabla v|^{2} - 2g^{2} B_{\omega_{0}} \cdot (iv, \nabla v) + \frac{g^{4}}{\varepsilon^{2}} (1 - |v|^{2})^{2} \end{split}$$

pour "toute" fonction d'onde  $\psi = gve^{i([\Omega] - \omega_0)\theta}$ , avec

$$B_{\omega_{\mathbf{0}}} = \left(\Omega r - \frac{[\Omega] - \omega_{\mathbf{0}}}{r}\right) \vec{e}_{\theta}.$$

- ▶ Il existe un anneau  $\mathcal A$  d'épaisseur  $\varepsilon |\log \varepsilon|$  tel que g et  $|\Psi^{\mathrm{GP}}|$  sont  $O(\varepsilon^{\infty})$  dans  $\mathcal B\setminus \mathcal A$ .
- ightharpoonup En écrivant  $\Psi^{GP}$  sous la forme

$$\Psi^{\mathrm{GP}} = gue^{i([\Omega] - \omega_0)\theta}$$

u devrait "presque" minimiser  $\mathcal{E}$ , restreinte à  $\mathcal{A}$ , sous la contrainte

$$\int_A g^2 |v|^2 = 1.$$

- Outils principaux : méthodes de boules-vortex et d'estimations de Jacobiens (Béthuel, Brézis, Hélein, Sandier, Jerrard, Serfaty, Soner ... )
- ▶ Analyse réminiscente du régime  $\Omega \sim \Omega_{c1}$  (Aftalion-Alama-Bronsard ARMA 2005, Ignat-Millot JFA et RMP 2006)
- Permet l'obtention de bornes inférieures de la forme

$$\int_{\mathcal{A}} g^2 |\nabla u|^2 - g^2 B_{\omega_0} \cdot (iu, \nabla u) \ge \sum_j 2\pi |d_j| \left( \frac{1}{2} g^2(a_j) |\log \varepsilon| + F(a_j) \right)$$

en fonction des positions  $a_i$  et des degrés  $d_i$  de "vortex approchés"

▶ Si  $\Omega_0$  est assez grand, la fonction de coût

$$H(r) = \frac{1}{2}g^2(r)|\log \varepsilon| + F(r)$$

est positive.

- ▶ Donc si  $\Omega_0$  est assez grand, les vortex ne sont plus favorables énergétiquement
- C'est le point clé pour l'obtention du Théorème "vortex géant".



- ▶ Point de départ : couvrir l'ensemble  $\{|1 |u|| > |\log \varepsilon|^{-1}\}$  par une collection de boules vortex  $B_j(a_j, r_j)$ , avec  $\sum_i |B_j| \ll |\mathcal{A}|$ .
- Nécessite une borne supérieure sur

$$\mathcal{F}[u] = \int_{\mathcal{A}} g^2 |\nabla u|^2 + \frac{g^4}{\varepsilon^2} \left(1 - |u|^2\right)^2$$

▶ Seule borne naturelle (fonction test  $v_{trial} \equiv 1$ )

$$\mathcal{E}[u] \leq 0$$

permet d'obtenir

$$\mathcal{F}[u] \leq C \int_{\mathcal{A}} |B_{\omega_0}|^2 g^2 |u|^2 \leq C \varepsilon^{-2}$$

- ▶ Problème : on a seulement  $|\{|1-|u||>|\log\varepsilon|^{-1}\}| \le C\varepsilon|\log\varepsilon|\sim |\mathcal{A}|.$
- Fort contraste avec le régime  $\Omega \sim \Omega_{c1}$  dû à l'épaisseur infiniment fine de l'anneau



- ▶ Solution : Découper l'anneau en  $N \propto \varepsilon^{-1} |\log \varepsilon|^{-1}$  cellules  $A_1, \ldots, A_N$  de taille  $\varepsilon |\log \varepsilon|$
- Supposons qu'on puisse "localiser" l'estimation

$$\int_{\mathcal{A}_{i}} g^{2} |\nabla u|^{2} + \frac{g^{4}}{\varepsilon^{2}} \left(1 - |u|^{2}\right)^{2} \leq C \varepsilon^{-2} \frac{1}{N} \propto \frac{|\log \varepsilon|}{\varepsilon}$$

Alors

$$\left|\left\{|1-|u||>|\log\varepsilon|^{-1}\right\}\cap\mathcal{A}_i\right|\leq C\varepsilon^3|\log\varepsilon|\ll |\mathcal{A}_i|\propto \varepsilon^2|\log\varepsilon|^2.$$

#### Méthode:

- Distinguer entre bonnes et mauvaises cellules
- Construire les boules vortex dans les bonnes cellules
- ▶ Utiliser les bornes inférieures sur  $\mathcal{E}[u]$  dans les bonnes cellules pour réduire progressivement le nombre de mauvaises cellules.

#### Le cercle de vortex

lacksquare Pour  $\Omega_1\ll 1$  la fonction coût H a un minimum négatif en  $r=R_*$ 

$$H(R_*) \propto -rac{\Omega_1}{arepsilon}$$

- Les vortex sont favorables près du cercle  $C_{R_*}$  de rayon  $R_*$ .
- La répulsion inter-vortex est évaluée via un "champ électrique" associé à toute mesure ν

$$\begin{cases} -\nabla \left(\frac{1}{g^2}\nabla h_{\nu}\right) = \nu \text{ dans } \mathcal{A} \\ h_{\nu} = 0 \text{ sur } \partial \mathcal{A}. \end{cases}$$

On a l'asymptotique d'énergie

$$E^{\mathrm{GP}} = \hat{E}_{\omega_{\mathbf{0}}}^{\mathrm{GP}} + \inf_{\mathrm{supp}(\nu) \subset \mathcal{C}_{R_*}} \left( \int_{\mathcal{A}_{\mathrm{bulk}}} \frac{1}{g^2} |\nabla h_{\nu}|^2 + H(R_*) \int \nu \right) (1 + o(1))$$

 $\blacktriangleright$   $\mu$  devrait minimiser l'énergie "électrostatique" ci-dessus  $\Rightarrow \mu \propto \delta_*$ .



## Perspectives

- Etendre l'analyse des deux dernières vitesses critiques à un piège plat avec conditions de Dirichlet : <u>fait</u> (Correggi, Pinsker, NR, Yngvason 2010)
- ▶ Considérer un  $\Omega_0$  variable : transition entre le réseau de vortex et le cercle de vortex au voisinage de  $\Omega_{c3}$
- ► Etendre l'analyse des deux dernières vitesses critiques à des potentiels de piégeage plus réalistes
- ► Etendre l'analyse à des pièges anisotropes
- ► Etudier certains régimes au niveau du problème quantique à *N* corps
- Prouver l'apparition du réseau hexagonal de vortex.