

Corrélations chronologiques et géochimiques des formations volcaniques du sud de la basse terre de Guadeloupe (petites Antilles): début du cycle récent

Françoise Blanc

▶ To cite this version:

Françoise Blanc. Corrélations chronologiques et géochimiques des formations volcaniques du sud de la basse terre de Guadeloupe (petites Antilles): début du cycle récent. Géochimie. Université Scientifique et Médicale de Grenoble, 1983. Français. NNT: . tel-00690766

HAL Id: tel-00690766 https://theses.hal.science/tel-00690766

Submitted on 24 Apr 2012

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



BLANC (F.) Ex. ho1

UNIVERSITE SCIENTIFIQUE ET MEDICALE DE GRENOBLE

INSTITUT DE GRENOBLE 1
INSTITUT DE GEGLOGIE
DOCUMENTATION
RUE MAURICE GIGNOUX
E 38031 GRENOBLE CEDEX
TEL. (76) 87.46.43

2 9 NOV. 1983

CORRELATIONS CHRONOLOGIQUES ET GEOCHIMIQUES
DES FORMATIONS VOLCANIQUES
DU SUD DE LA BASSE_TERRE DE GUADELOUPE
(PETITES ANTILLES)
Début du cycle récent

FRANÇOISE BLANC



Thèse pour obtenir le grade de Docteur de Spécialité Géologie appliquée Option Pétrologie UNIVERSITE DE GRENOBLE INSTITUT DE GEOLOGIE

DOCUMENTATION
RUE MAURICE-GIGNOUX
R 38031 GRENOBLE CEDE

TEL. (76) 87.46.43

Thèse soutenue le 25 novembre 1983 devant la commission d'examen

PRESIDENT RAPPORTEURS

EXAMINATEURS

R. MICHEL

N. VATIN-PERIGNON

M.P. SEMET

J. LABEYRIE P.Y. GILLOT

G. VALLADAS

USM GRENOBLE CNRS GRENOBLE

IPG PARIS

CEA/CNRS GIF-SUR-YVETTE

CEA SACLAY

UNIVERSITE SCIENTIFIQUE ET MEDICALE DE GRENOBLE

CORRELATIONS CHRONOLOGIQUES ET GEOCHIMIQUES DES FORMATIONS VOLCANIQUES DU SUD DE LA BASSE_TERRE DE GUADELOUPE (PETITES ANTILLES) Début du cycle récent

UNIVERSITE DE GRENOBLE 1 INSTITUT DE GEOLOGIE

DOCUMENTATION

RUE MAURICE - GIGNOUX F 38031 GRENOBLE CEDEX TEL. (76) 87.46.43

Thèse pour obtenir le grade de Docteur de Spécialité Géologie appliquée Option Pétrologie

FRANÇOISE BLANC

2 9 NOV. 1983

Thèse soutenue le 25 novembre 1983 devant la commission d'examen

PRESIDENT **RAPPORTEURS**

EXAMINATEURS

R. MICHEL N. VATIN-PERIGNON

M.P. SEMET J. LABEYRIE P.Y. GILLOT G. VALLADAS

USM GRENOBLE CNRS GRENOBLE IPG PARIS

CEA/CNRS GIF-SUR-YVETTE

CEA SACLAY CEA SACLAY

ERRATA

- p.12 ligne 25 , lire NNW-SSE au lieu de WNW-ESE ; ligne 26 , lire WNW-ESE au lieu de NNW-SSE ; ligne 34 , lire NW au lieu de NE.
- p.30 ligne 9 , lire Trois-Rivières au lieu de la Regrettée.
- p.89 La coulée de La Regrettée est une coulée "Trois-Rivières".
- diag. 50,53,57,60 : ajouter après bordures: microlites et inclusions.
- p.170 fig.75, les points 23 et 24 représentent les ponces du Bouchu, (faciès foncé et clair).

RESUME

Cette étude, effectuée dans le cadre des Observatoires Volcanologiques de l'Institut de Physique du Globe de Paris et des programmes de Recherche du CNRS sur l'Histoire des volcans actifs, contribue à la chronologie des événements récents du Sud de la Basse-Terre de Guadeloupe (Petites Antilles) pour laquelle des lacunes importantes subsistaient du fait de mauvaises conditions d'affleurements.

Les méthodes employées sont:1)le potassium-argon(CFR,Gif), 2)la ther-moluminescence(CFR,Gif) et 3)la géochimie des majeurs et des traces utilisée en tant que critère de corrélation des différents dépôts (Grenoble,Saclay).

- 1) la méthode du potassium-argon, dans son adaptation aux périodes récentes (inférieure à 1 Ma), a permis d'obtenir l'âge des coulées de laves massives basaltiques à andésitiques, appartenant au cycle Pitons de Bouillante Sans-Toucher, aux Monts Caraïbes et à la phase initiale du cycle récent Madeleine-Soufrière.
- 2) la méthode de thermoluminescence sur quartz a été utilisée pour la datation de certains niveaux ponceux dacitiques à quartz appartenant à la Chaîne andésitique de Bouillante et au cycle récent Madeleine-Soufrière.
- 3) les éléments majeurs, incompatibles (La, Th) et de transition (Sc, Co) des niveaux ponceux et les analyses des phases minérales à la microsonde ont permis d'établir ou de préciser des corrélations jusqu'ici rendues aléatoires par les conditions de terrain, de regrouper dans un même cycle des niveaux attribués à des cycles différents, et de déceler des indices de mélanges magmatiques.

Les résultats obtenus modifient la chronologie de la Basse-Terre comme suit :

- la fin du cycle des Pitons de Bouillante Sans-Toucher est aux environs de 600 000 ans,
- celle de la Chaîne andésitique de Bouillante est proche de 244 000 ans.
- et le début de l'activité des Monts Caraïbes se situe aux environs de 500 000 ans.

Le résultat le plus important concerne le début du cycle récent Madeleine-Soufrière pour lequel une phase Carmichaël est datée entre 150 000 et 100 000 ans ; son activité débute par un épisode explosif (ponces à quartz de l'anse des Pères et ponces andésitiques de Pintade) et se poursuit par un épisode effusif de grande importance (coulées de Trois Rivières, groupes nord et sud). Entre la fin de la phase Carmichaël et le début de la phase Madeleine, une période d'accalmie est mise en évidence ; sa durée est voisine de 70 000 ans.

<u>Mots-clés</u>: chronologie, corrélation, formation volcanique, potassium-argon, thermoluminescence, géochimie, microsonde, mélange magmatique, phase Carmichaël, cycle récent Madeleine -Soufrière, Basse-Terre de Guadeloupe, Petites Antilles.

ABSTRACT

This study, supported by the Observatoires Volcanologiques de l'Institut de Physique du Globe de Paris and by the Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) programs, is a contribution to the geochronology of the recent volcanic events of the South of the Basse-Terre of Guadeloupe (Lesser Antilles).

Three methods were adopted :1) K/Ar dating adapted for ages less than 1 m.y. was used to obtain ages on basaltic to andesitic lava flows of the Pitons de Bouillante - Sans Toucher cycle, of Monts Caraïbes and of the initial phase of the early cycle of Madeleine - Soufrière. 2) Thermoluminescence studies on quartz were used for dating some dacitic pumice layers of the Chaîne andésitique de Bouillante cycle and the early cycle of Madeleine - Soufrière. 3) whole-rock analyses of major and trace elements (La, Th, Sc, Co) and microprobe analyses of phases were used to geochemically characterize the different pumice layers and to regroup these layers into their most likely cycle, and to record evidence for magma mixing.

The results obtained enable the geochronology to be modified as follows :

- the end of the cycle of the Pitons de Bouillante Sans Toucher occurred at about 600 000 years,
- the end of the Chaîne andésitique de Bouillante occurred at approximately 244 000 years,
- the start of the activity of the Monts Caraïbes cycle took place at about 500 000 years.

The most important result concerns the start of the recent Madeleine - Soufrière cycle for which a volcanic phase 'the phase Carmichaël' was dated at between 150 000 and 100 000 years; its activity began with an explosive episode (quartz pumice of the Anse des Pères and andesitic pumice of Pintade) and was followed by a very important effusive episode (flows of the north and south groups of Trois Rivières). Between the end of the phase Carmichaël and the start of the phase Madeleine, was a period of quiescence lasting about 70 000 years.

Key-words: chronology, correlation, volcanic deposit, K-Ar ages, thermoluminescence ages, geochemistry, microprobe analyses, magma mixing, Carmichaël phase, recent cycle of Madeleine - Soufrière, Basse-Terre de Guadeloupe, Lesser Antilles, French West Indies.

AVANT-PROPOS

Ce travail a bénéficié de nombreuses aides et je voudrais remercier tous ceux qui y ont contribué. Je suis surtout redevable à ceux qui m'ont accordé, à maintes reprises, leur appui financier.

le Directeur des Programmes Interdisciplinaires de Recherches sur la Prévision et la Surveillance des Eruptions Volcaniques (P. I. R. P. S. E. V.) (M. Treuil, C. N. R. S. et I. N. A. G.) et le Responsable du groupe "Histoire des volcans" (J. Labeyrie)

les responsables des Observatoires Volcanologiques de l'I. P. G. Paris (J. L. Le Mouël et J. L. Cheminée).

Mes remerciemnts vont à R. Michel, Professeur à l'Université Scientifique et Médicale de Grenoble (U. S. M. G.), qui a bien voulu me faire l'honneur de présider le jury.

Je voudrais exprimer ma gratitude à

N. Vatin-Pérignon, Maître de recherche au ^C. N. R. S., et à M. P. Semet, Physicien-Adjoint à l'I. P. G., pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en me proposant ce sujet, et pour l'aide sans cesse renouvelée au cours de ces deux années passées ensemble.

Toute ma reconnaissance va à

- J. Labeyrie, Directeur du centre des Faibles Radioactivités (C. F. R) laboratoire mixte C. E. A. C. N. R. S., pour m'avoir accueillie dans son laboratoire,
- P. Y. Gillot, Responsable du laboratoire de potassium-argon du C. F. R., pour l'aide sans défaut qu'il m'a apportée lors des analyses potassium-argon, et pour les encouragements qu'il a toujours su me prodiguer.

G. Valladas, Créateur et Responsable du laboratoire de thermoluminescence, qui, avec patience, m'a initiée à cette technique.

Je ne voudrais pas oublier G. Vivier, Responsable des laboratoires techniques de l'Institut Dolomieu, sans lequel mon expérience du potassium-argon ne serait pas ce qu'elle est, ainsi que Charlotte et Désirée, mes fidèles rampes à argon, pour les heures d'anxiété qu'elles m'ont fait subir.

Je remercie M. Feuillard et avec lui tout le personnel de l'Observatoire de Parnasse à la Guadeloupe. Grâce à eux, mes missions se sont déroulées dans des conditions exceptionnelles.

Je ne veux pas oublier

- G. Boudon, de l'Université de Clermont-Ferrand, avec qui j'ai découvert la géologie de la Guadeloupe,
- A. Gadalia, du B. R. G. M., grâce à qui les problèmes posés par la chaîne andésitique de Bouillante se sont clarifiés,
- J. L. Joron, de Pierre Süe, pour les analyses des éléments en traces,
- F. Keller de l'Université de Grenoble, pour les analyses des éléments majeurs.

Je remercie également

- Y. Cornette, du laboratoire de potassium-argon du C. F. R., pour sa disponibilité sans pareille et sa gentillesse et
- C. Cassignol instigateur de la méthode K.Ar au C. F. R., pour les critiques judicieuses apportées à mon manuscrit.

Je n'oublie pas E. Dompnier, et M. Domeyne de l'Université de Grenoble pour l'aide apportée dans la préparation des échantillons et

Cl. Merlet de l'Université des Sciences et Techniques de Montpellier, pour son aide à la microsonde:

Je remercie M. J. Babault pour la rapidité avec laquelle ce mémoire a été frappé.

Enfin, je n'oublie pas mes camarades et amis de 3e cycle, éloignés (péruviens, réunionnais...) et présents, mes amis Michèle et Christian, qui m'ont reçu si gentiment fort tard le soir après de grandes journees de rédaction...

Des pensées affectueuses vont à

la famille Grandperret, sans qui les séjours à Paris auraient été moroses,

aux Parents de Christian, toujours accueillants et disponibles,

à Joselyne, pour la gentillesse avec laquelle elle m'a aidée, à Robert, Deborah et Yann,

à Marie-Do, imbattable à l'ordinateur,

à Jean, Jacques, Michèle et Christian.

Pour mes Parents, mes remerciements ne seront jamais assez forts, et donc difficiles à exprimer.

Quant à Christian, c'est à lui que revient le partage de mes angoisses, et surtout de toutes mes joies...

SOMMAIRE

INTRODUCTION	100
CHAPITRE 1.PRESENTATION DE LA GUADELOUPE-PROBLEMES POSES.	
1.CADRE STRUCTURAL ET GEOLOGIQUE REGIONAL	
1.1. Cadre structural	- 6
1.2.Contexte géologique régional	-
1.2.1 Caractéristiques pétrographiques	6
1.2.2 Caractéristiques géochimiques	,
1.2.3 Coexistence de plusieurs séries volcaniques dans l'arc des	,
Petites Antilles	8
1.2.4 Genèse des laves des Petites Antilles	ç
1.3.La Guadeloupe	10
1.3.1.La Grande-Terre	10
1.3.2.La Basse-Terre ou Guadeloupe sensu stricto	10
2.DESCRIPTION DES FORMATIONS GUADELOUPEENNES.PROBLEMES POSES	12
2.1. La chaîne septentrionale	12
2.2 L'épisode des Pitons de Bouillante-Sans-Toucher 2.3 Les Monts Caraïbes	12
2.4 La chaîne andésitique de Bouillante et le début du cycle récent	12
Madeleine-Soufrière	16
2.4.1 La chaîne andésitique de Bouillante	18
2.4.2.Le cycle récent Madeleine-Soufrière	25
2.4.2.1 Les événements anté-Pintade	25
2.4.2.2 L'événement ponceux de Pintade	28
2.4.2.3.Les événements post-Pintade	28
2.4.2.4 Les datations absolues sur ces événements	32
2.5. Problèmes poséspar les formations guadeloupéennes. Solutions	
pour les résoudre	33
CHAPITRE 2.CHRONOMETRIE	0.0
CHAPTIRE 2. CHRONOMETRIE	39
I.METHODE DU PCTASSIUM-ARGON .	39
and the state of t	00
1.INTRODUCTION	39
1.1 Nécessité d'une méthode adaptée aux âges jeunes	39
1.2 Principe	40
1.3 Description succinte de la technique de datation K-Ar	43
2.MESURE DU POTASSIUM	44
3.MESURE DE L'ARGON	45
3.1. Conditions de mesures	
3.1.1. Maintien du vide résiduel à un niveau minimum et constant- Purification des échantillons	4.5
3.1.2. Stabilité et reproductibilité des conditions de mesures	45
d'argon	46
3.1.2.1.Stabilité des paramètres de source	46
3.1.2.2. Mesures en double collection	46
3.1.2.3.Diminution des effets de mémoire	46

3.2. Principe des mesures 3.2.1.Composition de l'argon de contamination 3.2.2.Mesures au spectromètre de masse 3.3.Précision de la mesure d'argon 3.4.Traitement des échantillons 3.4.1.Excès d'argon-préparation des échantillons 3.4.2.Conditions de prédégazage 3.4.2.1.Fractionnement isotopique de l'argon de contamination 3.4.2.2.Départ de l'argon radiogénique 3.5.Manipulations-Mode opératoire	47 49 49 50 54 54 54 55 55
3.5.1.Prédégazage 3.5.2.Fusion 3.5.3.Purification 3.5.4.Mesures au spectromètre de masse 3.5.4.1.Description de la rampe d'introduction 3.5.4.2.Mesures	57 57 57 57 59 61
3.6.Exemples comparant deux méthodes géochronologiques appliquées aux âges jeunes:le C et la thermoluminescence 3.6.1.Comparaisons avec le C-âges zéro 3.6.2.Comparaisons avec la thermoluminescence 4.RESULTATS 4.1.Mesures des âges zéro 4.2.Résultats	62 62 62 62 62 64
II.LA THERMOLUMINESCENCE	67
1.INTRODUCTION 2.PRINCIPE DE LA THERMOLUMINESCENCE 2.1.Principe de base 2.2.Mesure de la thermoluminescence 3.PREPARATION DES ECHANTILLONS-MESURES DE LA PALEODOSE-CALCUL DE LA DOSE ANNUELLE 3.1.Choix des échantillons 3.2.Préparation des échantillons 3.3.Mesure de la paléodose 3.3.1.Mesure de la thermoluminescence 3.3.2.Mesure de la supralinéarité 3.3.3.Résultats 3.4.Calcul de la dose annuelle 3.4.1.Calcul de la dose interne d 3.4.2.Calcul de la dose externe d 3.4.3.Effet de l'imprégnation en éau dans le calcul de la dose annuelle	67 67 68 71 71 72 72 74 74 74 76 78 79
3.5.Résultats-Discussion III.INTERPRETATION DES RESULTATS OBTENUS PAR POTASSIUM-ARGON ET THERMOLUMINESCENCE	82 85
1.PITONS DE BOUILLANTE-SANS-TOUCHER 2.LES MONTS CARAIBES 3.LA CHAINE ANDESITIQUE DE BOUILLANTE ET LE CYCLE RECENT 3.1.La chaîne andésitique de Bouillante 3.2.Le début du cycle récent	85 85 86 86

CHAPITRE 3. ETUDE GEOCHIMIQUE DES NIVEAUX PONCEUX	95
1.CORRELATIONS DES NIVEAUX PONCEUX	95
1.1. Etude de la composition chimique des roches totales	95
1.2. Etude minéralogique des niveaux ponceux	101
1.2.1.Les ponces soyeuses du Morne à Jules	102
1.2.2.La nuée Saint-Vincent de la carrière Danoy	103
1.2.3.Les dacites à quartz de l'anse des Pères et de la carrière	
Danoy	111
1.2.4.L'événement ponceux de Pintade	131
1.3.Les pyroxènes	150
1.4.Les éléments en traces	155
2.CONCLUSION	158
3.MELANGES MAGMATIQUES	161
CHAPITRE 4. CONCLUSIONS GENERALES: CHRONOLOGIE DES DIFFERENTS EPISODES	
ERUPTIFS DU SUD DE LA BASSE-TERRE	165

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

LISTE DES FIGURES

Fig.	n° 1	-	Unités morphologiques de la plaque caraîbe et ses	
			limites	2
_	nº 2	-	Arc des Petites Antilles	4
Fig.	n° 3	-	Carte sismique de l'archipel des Petites Antilles	5
Fig.	n° 4	_	Bloc-diagramme schématique de l'arc des Petites Antilles	5
Fig.	n° 5	-	Diagramme Ol-Di-Qtz	7
Fig.	nº 6	-	Diagramme K ₂ O/SiO ₂	7
Fig.	nº 7	-	Diagramme K ₂ O/SiO ₂ Diagramme An + Ab ² +Or/DI	7
Fig.	nº 8	-	La Guadeloupe	11
Fig.	nº 9	-	Carte des ensembles volcaniques de la Basse-Terre	13
Fig.	n° 10		Carte géologique simplifiée des Monts Caraîbes	15
Fig.	nº 11		Carte des ensembles volcaniques de la Basse-Terre	19
Fig.	nº 12		Carte des ensembles volcaniques de la Basse-Terre	21
Fig.	nº 13	-	Le Sud de la Basse-Terre	24
Fig.	nº 14	-	Coupe de la carrière Blanchette	26
Fig.	nº 15	_	Coupe de la carrière Danoy	27
Fig.	nº 16	_	Affleurements des ponces de Pintade dans le Sud de la	-/
			Basse-Terre	29
Fig.	nº 17	_	Carte géologique simplifiée du Sud-Est de la Basse-Terre	31
Fig.	nº 18	_	Localisation des échantillons étudiés	
Fig.	nº 19	_	Mesures des signaux de l'argon 36 de l'étalon Gl-O et d'un	52
0.			échantillon (coulée du Plessis E 1101)	18
Fig.	nº 20	_	Réponse du spectremètre de masse en fonction de la pression	-10
6.			régnant dans la cellule (linéarité)	51
Fig.	nº 21		Erreur sur l'âge en fonction du taux d'argon radiogénique	51
Fig.	nº 22	_	Schéma d'un module-stade du prédégazage	53
Fig.	no 23	_	Schéma d'un module-stade de la fusion de l'échantillon	56
Fig	nº 24	222	Schéma d'un module-stade de la purification	56
Fig.	nº 25	0	Schéma d'un module-stade de la mesure	57
	nº 26	_	Schéma de la rampe d'introduction	5/
				60
rig.	11, 21	-	Dispositif de cryopompage de la cellule du spectromètre	No. Contraction
m:	-000		de masse	31
			Schéma de l'appareil de mesure de thermoluminescence	
_	n° 29		Test du plateau	
	nº 30		Courbes de thermoluminescence	
	n° 31		Comportement supralinéaire aux faibles doses	71
Fig.	nº 32	-	Ccurbes de thermoluminescence relatives au quartz de l'anse	
			des Pères	73
Fig.	n° 33	-	Test du plateau sur la mesure de thermoluminescence du	
			quartz de l'anse des Pères	73
			Mesure de la paléodose (Anse des Pères)	
Fig.	n° 35	-	Mesure de la paléodose (Montval)	75
			Mesure de la paléodose (Carrière Danoy)	
			Arc insulaire des Petites Antilles	81
Fig.	n°38	-	Corrélations entre courbe d'ensoleillement pour l'hémis-	
			phère nord, température de la surface de l'océan atlantique	
			et courbe de fluctuations au niveau de l'océan	81

Fig.	n° 39	Carte des ensembles volcaniques du Sud de la Basse-Terre	87
	n° 40	Carte géologique simplifiée du Sud-Est de la Basse-Terre	
	n° 41	Position des ponces étudiées dans le diagramme Fe ₂ 0 ₃ /Si0 ₂	97
	n° 42	Position des ponces étudiées dans le diagramme Al ₂ 0 ₃ /Si0 ₂	97
	n° 43	Position des ponces étudiées dans le diagramme Na 0/SiO 2	98
	nº 44	Position des ponces étudiées dans le diagramme K ₂ 0/Si0 ₂	98
	n° 45	Position des ponces étudiées dans le diagramme MgO/SiO2	99
	n° 46	Position des ponces étudiées dans le diagramme CaO/SiO2	99
	n° 47	Position des nonces étudiées dans le diagramme D 0 /Siñ	106
	n° 48	Position des ponces étudiées dans le diagramme P ₂ O ₅ /SiO ₂ Position des ponces étudiées dans le diagramme TiO ₂ /SiO ₂	100
	n° 49	Position des plagioclases des ponces du Morne à Jules, et	100
5.	49	de la carrière Blanchette dans le diagramme An-Ab-Or	100
Fia.	n° 50	Position des pyroxènes et des olivines des ponces du Morne	103
5.	11 50	à Jules et de la Carrière Blanchette dans le diagramme	
		En-Fe-Wo	104
Fia	n° 51		104
rig.	11 2T	Position des magnétites des ponces du Morne à Jules et de la	
₽i~	20 =0	carrière Blanchette dans le diagramme Fe 0 -Feo-Tio	104
	n° 52	diamenta An Ah On	
Fi~	×0 ==	diagramme An-Ab-Or	109
rīg.	n 53	Position des pyroxenes de 1802a et de 1802a (nuee Saint-	
		The state of the s	109
rig.	n° 54	Position des magnétites de F802a ₁ et de F802a ₂ dans le	100
	0.55	diagramme TiO ₂ -Fe ₂ O ₃ -FeO	109
rig.	n° 55	Position des verres de la mesostase et en inclusions, analysés à	
		la microsonde, de l'ensemble des ponces étudiées, dans le	
		diagramme K ₂ 0/Si0 ₂	110
Fig.	n° 56	Position des plagioclases des dacites à quartz de la carrière	
		Danoy et de l'anse des Pères dans le diagramme An-Ab-Or	119
Fig.	nº 57	Position des pyroxènes et des olivines des dacites à quartz de	
	0.	la carrière Danoy et de l'anse des Pères dans le diagramme	
		En-Fe-Wo	119
Fig.	nº 58	Position des magnétites et des ilménites des dacites à quartz	
8 -	30	de la carrière Danoy et de l'anse des Pères dans le diagramme	
	-	TiO ₂ -Fe ₂ O ₃ -FeO	119
T	-0.50	<u> </u>	110
rig.	noce	Position des plagioclases des ponces du Morne à Jules et de la	
n .	0	carrière Blanchette dans le diagramme An-Ab-Or	128
rig.	n° 60	Position des pyroxènes et des olivines des ponces de la carrière	100
			129
rig.	n° 61	Position des magnétites des ponces du Morne à Jules et de la	
	_	carrière Blanchette dans le diagramme Fe ₂ 0 ₃ -Fe0-Ti0 ₂	129
Fig.	n° 62	Position des plagioclases des ponces de Pintade dans le dia-	
	-		146
Fig.	n° 63	Position des orthopyroxènes des ponces de Pintade dans le	
Sport or		diagramme En-Fe-Wo	147
Fig.	n° 64	Position des clinopyroxènes des ponces de Pintade dans le	
		diagramme En-Fe-Wo	148
Fig.	n° 65	Position des magnétites des ponces de Pintade dans le diagramme	
	22070	TiO ₂ -Fe ₂ O ₃ -FeO	148
Fig.	n° 66	Position des orthopyroxènes des ponces de Pintade et des dacites	-
		à quartz de l'anse des Pères dans le diagramme Mn/Mg/Mg+Fe	151
Fig.	n° 67	Position des orthopyroxènes des ponces de Pintade et des dacites	
0	07	à quartz de l'anse des Pères dans le diagramme Al/Mg/Mg+Fe	-

Fig.	nº	68	Position des orthopyroxènes des ponces de Pintade et des dacites	
			à quartz de l'anse des Pères dans le diagramme Ca/Mg/Mg + Fe	152
Fig.	nº	69	Position des orthopyroxènes des ponces de Rocroy, du Morne à	
			Jules et des carrières Blanchette et Danoy dans le diagramme	
			Al/Mg/Mg + Fe	153
Fig.	nº	70	Position des orthopyroxènes des ponces de Rocroy, du Morne à	
			Jules, de la carrière Blanchette et de la carrière Danoy dans	
			le diagramme Ca/Mg/Mg + Fe	154
Fig.	nº	71	Diagrammes La/Th et Co/Sc/Th	156
Fig.	nº	72	Aire de répartition des ponces de Pintade	159
Fig.	nº	73	Traversées de phénocristaux	163
Fig.	nº	74	Carte géologique simplifiée du Sud de la Basse-Terre d'après	100
J			DAGAIN (1981), BOUDON (1981) et les résultats de la présente	
			étude	168
Fig.	nº	75	Position des échantillons de ponces étudiées à la microsonde et	100
6.		, 0	des coulées du Morne Goyavier, Fond de Bernard, Carbet (3ème	
			chute), Schoelcher, Habituée dans le diagramme La/Th	170
			onder, beneficier, nabituee dans le diagramme La/Th	1/0

LISTE DES TABLEAUX

Tab.	n°	1	-	Tableau synthétique illustrant les différentes hypothèses concernant l'édification du massif Madeleine-Soufrière et	
		18		la chaîne andésitique de Bouillante	17
Tab.	nº	2	_	Echantillons datés par potassium-argon	35
Tab.	nº	3	-	Echantillons datés par thermoluminescence	36
Tab.	nº	4	-	Echantillons étudiés par microsonde	37
Tab.	nº	5	-	Influence d'une quantité d'argon héritée sur des roches	42
Tab.	~ O	G		d'âge croissant Erreurs absolues sur les âges en fonction du pourcentage	42
lab.	11	O	-		E2
Tab	~ 0	7		d'Ar*	53
Tab.	11 -	/	_	Comparaisons entre âge 14C, données historiques et âge	c 2
	•	-			63
Tab.	nº	8	-	Comparaisons entre âges obtenus par thermoluminescence et	
172500 18		2271			63
Tab.	nº	9	-		65
Tab.	n°	10	-		74
Tab.	nº	11	-		76
Tab.	п°	12	-	Concentration en U, Th, K des trois échantillons avec	
				leurs erreurs (%)	77
Tab.	n°	13		Doses annuelles reçues par les échantillons, exprimées	
					78
Tab.	nº	14	-	Doses annuelles dans l'hypothèse humide	82
					82
Tab.	nº	16	-	Ages dans l'hypothèse humide des ponces de la carrière	
					83
Tab.	n°	17	-	Résultats des mesures des âges des ponces de la carrière	
				Danoy et de l'anse des Pères par la méthode de la thermo-	
					83
Tab.	nº	18	-	Moyennes des analyses de plagioclases, d'orthopyroxènes et de	
0.0000000000000000000000000000000000000				magnétites deC 1501 (Morne à Jules)1	02
Tab.	no	19		Moyennes des analyses d'orthopyroxènes de F802a, et de	
	55.	. 5.50		F802a ₂ (nuée Saint-Vincent)	05
Tab.	no	20	_	Moyennes des analyses de plagioclases de F 802a, (nuée	00
140.	••			Saint-Vincent de la carrière Danoy	06
Tah	no	21	_	Moyennes des analyses de plagioclases de F 802a, (nuée	00
iab.	11			Saint-Vincent, carrière Danoy)	06
Tob	~0	22		Moyennes des analyses de clinopyroxènes de F 802a ₄ et	00
lab.	11-	22	_	F 2002 (russ Coint Vincent)	07
M - 1-	0	22		F 802a (nuée Saint-Vincent)	07
lab.	n°	23	=	Moyennes des analyses de magnétites de F 802a et F 802a	07
.		201		nuée Saint-Vincent)1	
				Nuée Saint-Vincent	08
Tab.	nº	25	_	Moyennes des analyses de clinopyroxènes des dacites à quartz	
222V 35	727	0.5		de l'anse des Pères et de la carrière Danoy	4.
Tab.	nº	26	-	V	11
				de la carrière Danoy 1	12

Tab.	nº	27	- Moyennes des analyses de plagioclases des dacites à quartz	
Tab.	n°	28	de l'anse des Pères	113
Tab.	n°	29	la carrière Danoy et de l'anse des Pères	113
Tab.	n°	30	de la carrière Danoy et de l'anse des Pères Moyennes des analyses d'olivines des dacites à quartz de la	114
Tab.	n°	31	carrière Danoy (F 802g) et de l'anse des Pères (P 301) - Moyennes des analyses des magnétites des dacites à quartz	114
Tab.			de la carrière Danoy et de l'anse des Pères Moyennes des analyses d'ilménites des dacites à quartz	115
			de la carrière Danoy et de l'anse des Pères	116
Tab.			- Ponces à quartz de la carrière Danoy	117
Tab.			- Ponces à quartz de l'anse des Pères	118
Tab:	n°	35	- Moyennes des analyses de plagioclases des ponces (E 1103 a, b, c,) et de la scorie (E 1103e) de Blanchette	122
Tab.	n°	36	- Moyennes des analyses d'orthopyroxènes des ponces (E 1103 a b, c,) de Blanchette	
Tab.	no	37	- Moyennes des analyses d'olivines des scories de Blanchette.	123
Tab.			- Moyennes des analyses de clinopyroxènes des ponces (E 1103	
100	•••	50	h a) at des session (E 1102 a) de Blanchette	Tarre H
Tab.	no	20	Analyses distribute des nonces (E 1103 a) de Planchetta	124
			- Moyenne des analyses de magnétites des ponces (E 1103 a, b,	124
Tab.	п	40		
m 1	•	202	c,) et des scories (E 1103 e) de Blanchette	125
Tab.			- Carrière Blanchette	126
Tab.			- Carrière Blanchette	127
Tab.	nº	43	- Moyennes des analyses de plagioclases de F 901 (carrière	
			Danoy) et de H 901 (rivière des Pères).	132
Tab.	nº	44	- Moyennes des analyses des plagioclases de J 1007 (rivière	
Tab.	nº	45	Noire), de D 1204 (Rocroy) et de 7 A (Calbassiers) - Moyennes des analyses de plagioclases de X 901 (anse à la	133
			Fontaine) et de P 401 (anse du Morne Rouge)	134
Tab.	n۰	46	- Moyennes des analyses d'orthopyroxènes du F 901 b (carrière Danoy), de H 901 (rivière des Pères), de J 1007 (rivière	
			Noire) et de 7A (Calbassiers)	135
Tab.	n°	47	- Moyennes des analyses d'orthopyroxènes de D 1204 (Rocroy), de X 901 (anse à la Fontaine), et de P 401 (anse du Morne	133
			7	136
Tab.	n°	48	- Moyennes des analyses de clinopyroxènes de D 1204 (Rocroy), de 7A (Calbassiers), de P 401 (anse du Morne rouge), de	100
			F 001 (compière Denou) et de H 001 (nivière des Bères)	1.37
Tab.	nº	4 ,5	-Moyennes des analyses de clinopyroxènes de J 1007 (rivière	
Tab.	n°	50	Noire) -Moyennes des analyses de magnétites de P 401 (anse du	138
		50	w \	120
Tab.	nº	51	-Moyennes des analyses de magnétites de H 901 (rivière	138
		JI	des Pères) ,de F 901 (carrière Danoy) , de J 1007 (rivi-	
			ère Noire), de 7A (Calbassiers) et de X 901 (anse à la	
			F (: -)	10-
			rontarne/	139

Tab.	n° 52	_	Evénement ponceux de Pintade (F 901)	140
			Evénement ponceux de Pintade (H 901)	143
			Evénement ponceux de Pintade (J 1007)	14
			Evénement ponceux de Pintade (7A et D1204)	143
			Evénement ponceux de Pintade (P 401)	14
			Evénement ponceux de Pintade (X901)	14
Tab.	n° 58	-	Teneurs en SiO, des faciès clairs et sombres des ponces	16
Tab.	n° 59	-	Chronologie des différents épisodes éruptifs du Sud de la	
			Basse-Terre de Guadeloupe	16

INTRODUCTION

Après la crise volcanique de la Soufrière de Guadeloupe en 1976-1977, de nombreux travaux de recherche furent entrepris par des scientifiques français (VINCENT et al.,1979, WESTERCAMP, 1980/81, BOUDON,1981, DAGAIN, 1981, SEMET et al., à paraître), notamment sur le cycle récent de ce volcan (1 Ma, 0,5 Ma (?)-Actuel).

L'absence de coupes naturelles continues, l'érosion et l'altération rapides des produits volcaniques à l'affleurement, le couvert végétal important, la relative monotonie pétrographique des laves, ont largement contribué aux hypothèses divergentes proposées par les auteurs pour la chronologie relative des événements.

De plus, mis à part la période 35 000 ans-Actuel, qui peut être datée par ¹⁴C, aucun âge n'a été obtenu sur les produits du cycle récent Madeleine-Soufrière (1 Ma, 0,5 Ma (?)-Actuel), estimés trop jeunes pour être valablement datés par les méthodes classiques de la géochronologie. Or, sans données chronologiques, il est pratiquement impossible de corréler certains niveaux, donc d'avoir une idée de la stratigraphie, d'apprécier la durée des cycles volcaniques et de détecter les périodes d'accalmie.

Nous nous sommes donc proposé de synthétiser les travaux effectués précédemment, en apportant notre propre contribution sous forme d'une étude géochronologique et géochimique des produits.

Pour ce faire, nous avons utilisé pour la datation (1) le potassium argon pour les laves massives et fraîches, et (2) la thermoluminescence pour les niveaux ponceux à quartz; pour l'étude géochimique (1) les éléments majeurs et les éléments en traces, et (2) l'étude chimique des minéraux. Cela a permis de mettre en évidence des corrélations jusqu'ici difficiles à établir sur le terrain.




Fig. 1 .Unités morphologiques de la plaque carafbe et ses limites.

(WESTERCAMP 1980)

1:direction de mouvement des plaques NOAM, SOAM et Cocos par rapport à la plaque caraibe.

2:mouvement le long des failles et failles transformantes.

CHAPITRE 1

PRESENTATION DE LA GUADELOUPE - PROBLEMES POSES

1. CADRE STRUCTURAL REGIONAL

1.1. Contexte structural

A l'Est de l'océan Atlantique, coincée entre les plaques nord-américaine (NOAM) et sud-américaine (SOAM) d'un côté et la plaque Cocos de l'autre, se place la plaque caraïbe (fig.1). Ses limites ouest et est (Amérique Centrale et sa fosse, arc insulaire des Petites Antilles) ont été vite reconnues comme des zones de subduction. La limite nord-est est constituée de la fosse de Porto Rico et du fossé Muertos reliés à l'Ouest par le Chenal de Cayman et sa dorsale, puis par la faille de Motagua. Les failles El Pilar et Oca limitent la plaque au Sud (fig. 1)

Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'arc des Petites Antilles. (fig. 2)

- * Côté océan Atlantique; les structures se différencient de part et d'autre du 14è parallèle. Au Sud, le bassin de Tobago, profond de 2 000 m, sépare la ride de Barbade de l'arc lui-même. Au Nord, la fosse des Petites Antilles, plus profonde de 1 000 mètres, fait suite à la dépression de Tobago (KEARY et al., 1975 BOUYSSE, 1979). Les données géophysiques (magnétisme, gravimétrie, sismique)s'accordent pour montrer la présence d'une zone de subduction sous la ride de Barbade (KEARY et al., 1975). La grande épaisseur de sédiments sous celle-ci, ainsi que leur tectonisation, ont conduit à interpréter cette structure comme un prisme d'accrétion (WESBROOK, 1975, BIJU-DUVAL et al., 1978).
- * L'arc des Petites Antilles montre une activité sismique importante (MOLNAR et SYKES, 1969; MURPHY et al., 1970; DOREL et al., 1972) (fig. 3). L'étude des cartes sismiques permet de visualiser les angles de plongement de la plaque SOAM sous la plaque caraïbe. Aux extrémités de l'arc, le pendage du plan de subduction est de 30°, et il atteint 65° au centre de l'arc (fig. 3 coupes AA' et BB'). La profondeur à laquelle se situe la plaque plongeante sous les volcans varie : de 130 km sous la Martinique, elle est inférieure à 100 km au Nord de la Guadeloupe.

L'arc des Petites Antilles s'est formé en trois étapes (MARTIN-KAY, 1969, WESTERCAMP et al., 1980); (fig.4.) :




Fig. 2 . Arc des Petites Antilles(. (BOUYSSE , 1979)

1:arc externe

2:arc interne

SE:SAINT-EUSTACHE ; SK:SAINT KITTS ; Red:REDONDA

Mon : MONTSERRAT ; SM: SAINT MARTIN .; SB :SAINT BARTHELEMY

Ang : ANGUILLA ; Ant : ANTIGUA ; Des : LA DESIRADE

Bar : BARBUDA

Grenadines (Canouan, Bequia)




Fig. 3 . Carte sismique de l'archipel des Petites Antilles.

Coupes selon les profils AA' et BB';

(WESTERCAMP, 1980, d'après DOREL, 1978)




Fig. 4 .Bloc-diagramme schématique le l'arc des Petites Antilles (WESTERCAMP, 1980

- Avant le Miocène (> 20 Ma) s'est constitué l'arc externe ou ancien (de Saint Barthelemy à Grenade)
- Durant le Miocène moyen, (20 Ma > âge > δ ,5 Ma), des mouvements tectoniques sont responsables de la fragmentation de la partie est de la plaque caraïbe.
- Les fractures NW/SE contrôlent la mise en place du volcanisme et l'injection de dykes qui contribuent à agrandir la surface de la plaque vers le Nord-Est.
- A partir de la fin du Miocène (depuis 6,5 Ma), l'arc interne ou récent se constitue, avec son chapelet de jeunes volcans. La fracturation actuelle est un héritage de la période miocène (fig 4).
- * Côté mer des Caraïbes, le bassin de Grenade sépare l'arc de la dorsale d'Aves. Celle-ci serait considérée comme un ancien arc volcanique à la fin du Crétacé, début du Paléocène (BUNCE et al., 1970, MALFAIT, DINKELMAN, 1972; CLARK, 1978). Le bassin de Grenade serait alors un reliquat de l'ancienne plaque océanique faisant face à la dorsale d'Aves.active.

Remarque: Les caractéristiques géophysiques de l'arc des Petites Antilles en font un arc de taille intermédiaire entre les grands arcs (Aléoutiennes) et les petits arcs (Hébrides). Son âge, 50 Ma environ, est également intermédiaire entre celui des Hébrides (10 Ma) et celui des Aléoutiennes (100 Ma). Son taux de subduction lent (2,2 cm/an), est lié à une activité volcanique et sismique faible (BOUYSSE.1979).

La lithosphère caraïbe a une croûte différente d'une croûte océanique ou continentale typique. Elle se compose d'une couche inférieure et d'une couche supérieure où la vitesse respective des ondes P est de 7,2 km/s et 6,2 km/s. Elles s'épaississent au niveau des rides (arc des Petites Antilles , ride d'Aves).

L'origine de la plaque caraïbe reste encore dans le domaine des hypothèses. Il est cependant admis que son histoire, en tant que bassin océanique, ne commence pas avant le Jurassique. Elle serait issue d'un mouvement vers l'Est de la plaque pacifique et considérée alors comme une protubérance nord orientale de cette plaque (MALFAIT et DINKELMAN, 1972). Mais elle pourrait s'être formée in situ grâce à une ride d'accrétion, profitant du mouvement divergent des deux Amériques (LADD, 1976, SAUNDERS, 1980).

1.2. Contexte géologique régional

Bien que 42 % des roches affleurant soient de type andésitique (Brown et al.,1977), les volcans des Petites Antilles ont fourni des laves et des pyroclastites de composition chimique variée (43 à 69 % SiO₂)

1.2.1. Caractéristiques pétrographiques

Les laves sont comparables aux laves des autres arcs insulaires. La dominance des roches porphyriques (phénocristaux d'olivine, d'augite, d'hypersthène, de plagioclase et d'amphibole), la nature très calcique des plagioclases, la présence d'amphibole et de biotite dans les andésites et les dacites, sont caractéristiques des séries calco-alcalines.





Fig. 5 .Diagramme Ol-Di-Qtz. Les îles du Sud se distinguent nettement des autres îles par leur caractère sous-saturé.(BROWN et al.,1977)


G:Grenade
B:Bequia
C:Canouan
L:Sainte-Lucie
M:Montserrat

V:Saint-Vincent

S:Saba

Mr:Martinique Gu:Guadeloupe N:Nevis K:Saint-Kitts








Fig. 7 .Diagramme Ab+An+Or/ DI

(BROWN et al.,1977)

V:Saint-Vincent
D:Dominique
Même légende que pour le diagramme 5 .

1.2.2. Caractéristiques géochimiques

- * Le diagramme Ol-Di-Qtz met en évidence le caractère sous-saturé des laves du Sud de l'archipel (Grenade et les Grenadines), comparé aux laves des autres îles (figure 5). Saint-Vincent et Bequia ont des compositions intermédiaires entre le Sud et le reste de l'arc.
- * Quelle que soit la composition des laves, les teneurs en alcalins sont constantes et relativement basses (diagr. $\bf 6$) avec un maximum de 4,7 % (pour 68 % de SiO₂) dans les îles du Centre et du Nord de l'archipel, et de 5,7 % (pour 65 % de SiO₂) dans les îles du Sud (BROWN et al.,1977). Ces valeurs contrastent avec les teneurs en alcalins de la série calco-alcaline des Andes, où Na₂O + K₂O atteignent 7 % (pour 62 % de SiO₂) (ROOBOL et al.,1974).
- * Les teneurs en ${\rm Al_20_3}$ sont remarquablement constantes tout au long de l'arc des Petites Antilles, comme l'illustre le diagramme An + Ab+ Or / Di.(Fig.7)
- * En ce qui concerne les éléments en traces, seul l'Yttrium montre des valeurs constantes (18 23 ppm) tout le long de l'arc. Les éléments en traces K, Rb, Sr, Zr, Ni et Cr confirment la distinction des îles du Sud (Gre nade et les Grenadines), du centre (de Saint-Vincent à la Guadeloupe) et du Nord (de Montserrat à Saba,) ébauchée grâce aux éléments majeurs. (BROWN et al.,1977).

1.2.3. <u>Coexistence de plusieurs séries volcaniques dans l'arc des Petites Antilles</u>

- * LACROIX (1936) a considéré que les laves des Petites Antilles appartiennent à une même série calco-alcaline faiblement potassique.
- * A l'aide des données chimiques, BROWN et al. (1977) distinguent 3 séries:

une série alcaline au Sud de l'arc,

- -une série calco-alcaline au centre,
- -une série tholéiitique au Nord.
- * REA et BAKER (1980) distinguent un 4ème groupe d'îles (Saint-Vincent, Bequia, Canouan), où les laves sont de composition intermédiaire entre celles du Sud et du centre de l'archipel.
- * A l'exception des îles du Sud, SMITH et ROOBOL (1980) considèrent que l'arc des Petites Antilles est constitué de magmas appartenant à la même lignée calco-alcaline.

- * WESTERCAMP (1979) décrit cinq séries dans l'archipel.
 - une série alcaline au Sud (Grenade et les Grenadines) ;
 - une série tholéitique pouvant marquer le début de l'arc récent ;
 - une série calco-alcaline primaire, formant l'ossature des grandes îles, succède à la série tholéiltique ;
 - une série calco-alcaline secondaire, dont le principal critère d'identification est la présence de phénocristaux de quartz, reste modeste en volume. Sur le terrain, on observe l'association de la série calco-alcaline primaire avec la série calco-alcaline secondaire;
 - une série de basaltes subalcalins à olivine qui se remarque par la basicité de ses produits par rapport aux autres séries, se rapproche des high-alumina basaltès.

1.2.4. Genèse des laves des Petites Antilles :

La série alcaline des Grenadines et de Grenade provient de la fusion partielle, à des degrès variables (2 à 17 %), d'un manteau de composition lherzolithe à grenat, entre 90 et 100 km de profondeur (WESTERCAMP,1980, BROWN et al.,1977, SMITH et al.,1980), ceci dans un contexte peut-être affranchi du phénomène de subduction (WESTERCAMP,1979), ou tout simplement obscurci par la présence importante de sédiments dans la ride de Barbade (DOREL,1978, BOUYSSE,1979).

Du fait de leur pauvreté en Ni et Cr, les laves du centre et du Nord ne peuvent avoir la même origine que les laves du Sud de l'arc.

Les magmas primaires des séries tholéiltiques et calco-alcalines de l'arc des Petites Antilles pourraient dériver de la fusion partielle de la croûte hydratée subductée (PELLETIER, 1976, BROWN et al., 1977, ZIMMERMAN et KUDO, 1978). Les faibles teneurs en Ni suggèrent que l'olivine joue un rôle mineur dans la genèse des magmas parentaux. La cristallisation précoce de l'amphibole et du plagioclase, puis celle du plagioclase, des pyroxènes, des oxydes de fer-titane, sont à la base du mécanisme de différenciation des laves des Peties Antilles (ARCULUS, 1976, PELLETIER, 1976, WESTERCAMP et MERVOYER, 1976, BROWN et al., 1977).

1. 3. La Guadeloupe :

La Guadeloupe est formée de deux îles aux paysages opposés : la Grande-Terre et la Basse-Terre, séparées par la Rivière Salée, isthme marin très étroit (fig 8)

1.3.1. La Grande-Terre : (fig 8)


C'est une île plate et triangulaire, culminant à 135 mètres au Morne l'Escade dans les Grands Fonds. Le substratum n'affleure pas, mais des études sismiques (gravimétrie et magnétisme) menées par l'INAG confirment sa nature volcanique. Il appartiendrait pro parte à l'arc externe (la Pointe des Châteaux semble se rattacher à l'ensemble Désirade - Petite Terre) et pour le reste à l'arc intermédiaire miocène. Le recouvrement calcaire plio-pléistocène important de cette partie de l'île présente des intercalations volcano-sédimentaires.

1.3.2. La Basse-Terre ou Guadeloupe sensu stricto : (fig 8)

Avec ses 55 km de long et ses 25 km de large, elle est une des plus grandes îles de l'arc actuel. Exclusivement volcanique, elle est formée d'un massif montagneux quasiment ininterrompu de la Soufrière (point culminant des Petites Antilles avec ses 1467 mètres) au Nord de l'île ; largement recouvert par la végétation tropicale, abrupt et trapu , le massif volcanique n'offre que très peu de possibilités de pénétration. Seule à l'extrémité nord-est, une zone plate recouverte de marécages rappelle la morphologie de la Grande-Terre. Aucune formation antérieure au Pliocène moyen n'a été reconnue sur la Basse-Terre. Cinq ensembles volcaniques y sont recensés. Du Nord au Sud, on retrouve :

- -la chaîne septentrionale,
- -le massif des Pitons de Eouillante-Sans-Toucher en position centrale dans l'île; il est limité à l'Ouest sur la côte caraïbe par:
- -la chaîne andésitique de Bouillante.
- -le massif Madeleine-Soufrière,
- -les Monts Caraïbes.

Au Sud, les îles des Saintes se seraient mises en place en même temps que la chaîne septentrionale.



2 DESCRIPTION DES FORMATIONS GUADELOUPEENNES - PROBLEMES POSES.

2. 1. La chaîne septentrionale.

La Guadeloupe a commencé son édification au Pliocène moyen (de 2,5 à 3,5 Ma) par la chaîne septentrionale affleurant de la pointe Allégre au Nord, jusqu'à la région des Mamelles au Sud (fig. 9). Son orientation générale est NNW-SSE. Le volcanisme a été essentiellement effusif. Six épisodes majeurs ont été distingués (WESTERCAMP, 1980), dont l'un deux, particulièrement intéressant, correspond à la mise en place de coulées et de nuées ardentes dacitiques à quartz au niveau de la Tête Allègre et du Morne Goton. Les dépôts les plus méridionhaux, les Mamelles, ont pu être aussi accompagnés d'un épisode explosif à quartz (CLOCCHIATTI, MERVOYER, 1976). Leur fraîcheur morphologique a suggéré à DAGAIN (1981), de les rattacher à la phase des Pitons de Bouillante-Sans-Toucher, où même à la chaîne andésitique de Bouillante. L'altération des dômes ne permet pas de datations. Cependant, leur chimisme, relativement potassique par rapport aux autres formations de l'île, leur paragénèse, les rattachent plutôt à la chaîne septentrionale, dont ils constitueraient alors le dernier épisode. (GADALIA, 1983)

2.2. L'épisode des Pitons de Bouillante-Sans-Toucher :


Cet édifice massif occupe le centre de l'Île entre les Pitons de Bouillante et la montagne de Capesterre, avec de nombreux sommets dépassant mille mètres. A l'Est, il atteint l'océan Atlantique, à l'Ouest, il est limité par la Chaîne andésitique de Bouillante, plus récente.

Les Pitons de Bouillante se seraient mis en place le long d'un axe unique WNW-ESE (WESTERCAMP, 1980, DAGAIN, 1981), où selon un segment de même direction, relié par un segment NNW-SSE décalé par rapport au précédent (GADALIA, 1981) (fig. §). Le matériau émis est essentiellement lavique, andésitique à deux pyroxènes.

Les premières manifestations volcaniques sont phréatomagmatiques (GADALIA, 1983), puis aériennes et effusives. Elles s'articuleraient autour de deux, voire peut-être trois caldeiras, (WESTERCAMP, 1980, DAGAIN, 1981).

La caldeira de Vieux-Habitants, la plus importante, serait limitée par les sommets de Matéliane, Morne Moustique, Merwart. Elle serait prolongée au NE par la caldeira de la rivière Beaugendre, et plus au Sud par celle moins nette de la montagne de Capesterre (fig. 9).

Cependant, pour GADALIA (op. cit.), l'absence de dépôts et de structures liées aux caldeiras (pyroclastites associées, dômes intrusifs, figures tectoniques), ne militent pas en faveur de celle-ci. Pour cet auteur, les dépressions semi-circulaires sont dues à l'altération préférencielle des roches dans des zones de circulation hydrothermale, au croisement des directions tectoniques NNW-SSE/WNW-ESE. (fig. 9)



Enfin, plus au Sud, le volcanisme du Sans-Toucher marquerait le stade ultime de l'activité de la chaîne, avec les épaisses coulées andésitiques de la Crête des Icaques, du Trianon, du Morne Montval, et la coulée du Plessis. (fig. §) (GADALIA, 1983)

Les datations des différents laboratoires, bien que donnant des écarts importants, placent l'activité du massif Pitons de Bouillante-Sans-Toucher au Pléistocène : BELLON (1974) trouve des âges allant de 0,5 à 1,7 Ma et BAUBRON (1974) obtient des valeurs s'étalant de 1,9 à 2,5 Ma. Les datations faites sur le camp Maréchal, appartenant au Sans-Toucher, donnent des âges de2,5 Ma (BAUBRON, 1974) et 1,7 Ma (BELLON, 1974). Pour cette raison, et à cause de la présence de cristaux de quartz rappelant les nuées ardentes du Nord, DAGAIN (1981) verrait le Sans-Toucher comme un témoin très méridional de la chaîne septentrionale.

2.3. Les Monts Caraïbes : (fig. 10)

Ils constituent le massif le plus méridional de l'île de Basse-Terre; c'est un ensemble massif, trapu, très difficile d'accès, couronné par de nombreux dômes et présentant des particularités remarquables.

- au point de vue dynamisme, ils ont enregistré une longue activité sous-marine avant d'émerger. Leur évolution débute par des brêches pyroclastiques à alternances de niveaux fins et grossiers, de type maar, riches en enclaves de socle et de roches sédimentaires. Ils sont recouverts de cendres grossières basaltiques à la base desquelles s'intercalent quelques coulées de laves de même nature, peu épaisses. Puis, de sous-marine, l'activité devient aérienne, effusive ; cela se termine par la montée des dômes : Houel Mont et Boucanier. Le volcan de la Petite Montagne a un développement comparable aux Monts Caraïbes (WESTERCAMP, 1980, DAGAIN, 1981), et il est rattaché à ces derniers.
- . au point de vue structural, un axe tectonique ENE-WSW passe par les Monts Caraïbes, la Petite Montagne et probablement les Petites Mamelles, alors que l'orientation générale des volcans du reste de l'Île est NNW-SSE.
- . au point de vue géochimique, ce sont des laves plus basiques que celles du reste de l'île : basaltes à olivine , augite, et labrador, andésites à augite, hyperstène, pauvres en olivine et xénocristaux d'amphiboles. (WESTERCAMP, MERVOYER, 1976)
- . L'activité des Monts Caraïbes est postérieure à 1,9 Ma, datation de la microfaune des calcaires de la ravine Blondeau (BERGGREN, dans ANDREIFF, 1974). Les datations K Ar confirment en gros cette donnée. Cependant, elles varient selon les auteurs entre 1,4 Ma et 2,6 Ma (BELLON, 1974) et entre 1,37 et 1,77 Ma (BRIDEN, 1978); de plus la coulée datée à 1,37 Ma par BRIDEN est mesurée à 2,6 Ma par BELLON. Malgré ces divergences, DAGAIN (1981) estime que les datations sont représentatives de la période d'activité des Monts Caraïbes, qu'il place à 1,5 Ma environ.




Fig. 10 Carte géologique simplifiée des Monts Caraïbes (Westercamp 1980).

1. éboulis - 2. formations profondément remaniées et altérées (dépôts lacustres) - 3. dôme andésitique final - 4. coulées de lave (plus le figuréest ressémé, plus la coulée est récente) - 5a. dépôt direct des cendres grossières hyaloclastiques de Rivière - Sens - 5b. dépôt remanié des cendres hyaloclastiques - 6. lahar - 7. coulées basaltiques - 8. calcaires récifaux plio-pléistocènes.

Pour GADALIA (1983), il y aurait contemporaneité de l'activité de la chaîne andésitique de Bouillante et des Monts Caraïbes, car à Baillif des cendres des Monts Caraïbes sont posées sur des nuées ardentes attribuées à la chaîne andésitique de Bouillante, alors qu'à Belost, le contraire se produit.

Mais, les datations effectuées par DAGAIN (1981) sur la chaîne andésitique de Bouillante laissent à penser que ce dernier épisode serait récent (deux coulées sont datées à 460 000 ans et moins de 200 000 ans), et postérieur aux Monts Caraïbes datés à 1,5 Ma.

2.4. La Chaîne andésitique de Bouillante et le début du cycle récent Madeleine-Soufrière :

Pour une meilleure compréhension, ces deux épisodes seront présentés dans un même paragraphe, et sont illustrés par le tableau n° 1 et les cartes (fig.11,12,13,16,17).

Les différentes hypothèses exposées sont souvent assez différentes. Il faut préciser que les conditions de travail dans le Sud de la Basse-Terre, et surtout autour du massif de la Soufrière, sont rendues délicates par :

- les difficultés d'accès dues au couvert végétal très abondant,
- l'absence de corrélations en raison de la discontinuité des coupes,
- la multiplicité des centres éruptifs et la relative monotonie pétrographique des produits.

Le début du cycle récent Madeleine-Soufrière débute selon les auteurs :

- par un épisode de ponces dacitiques à quartz, unique sur tout le Sud de la Basse-Terre, visible dans la carrière Danoy et à l'anse des Pères (WESTERCAMP, 1980, DAGAIN, 1981),
- ou par l'épisode ponceux andésitique de Pintade, postérieur aux dacites à quartz de la carrière Danoy (BOUDON,1981). Pour cet auteur, il y a deux niveaux de dacites à quartz ; le premier, visible dans la carrière Danoy (épisode des ponces soyeuses), est rattaché aux premiers stades de l'édification de la Soufrière, tandis que le second niveau observé à l'anse des Pères, est attribué au volcanisme périphérique de la Madeleine.

Pour GADALIA (1983), il existe plusieurs niveaux de ponces dacitiques à quartz. Les premiers niveaux (ponces à quartz associées aux ponces soyeuses du Morne à Jules, ponces à quartz de la carrière Danoy) sont attribués au volcanisme andésitique de Bouillante. Le niveau de l'anse des Pères est rattaché au cycle récent Madeleine-Soufrière.

16i 101 (17)	86000N (1981) SEMET (1982)	DAGAIN (1981) SEMET (1982)	WESTERCAMP (1980)	GAOALIA (1981)	
	Les éruptions historiques de la Soufrière	Les druptions historiques de la Soufrière			
	Toutes a caractère phréatique 1975-1977 , 1956 ; 1796-1798.	loutes à caractère phréatique 1975-1977 ; 1956 ; 1796-1798.			
475 BP	Eruption de la Soufrière (XVIÈ) Dôme de la Soutrière	Eruption de la Soufrière (XVIè) Dôme de la Soufrière	Dôme de la Soufrière		
	Nuees ardentes péléennes	Build de 14 Justi 167	14-16-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-		
1350 2900	Citerne Echelle	Palmiste	Nuées Saint-Vincent		
300		Nuées péléennes	r*		
	Eruption de la Soufrière à 3100 BP	Eruption de la Soufrière à 3100 BP			
160	Episode type St Helens avec coulées de débris	Eruption type Mérapi	Eruption Lype Mérapi(avec lahars associés! Lahar du Galion		
350	Formation du cratère du	Citerne	Canar de darron		
34UU 3500	Carmichael	<u> </u>	Citerne 4ème phase Echelle		
400		Gros Fougas	ccierre	-4	
7500		Echelle			
3000	ACTIVITÉ PERIPHERIQUE Edification du Madeleine	Conerve	Boudoute	le .	
	Hassif de la Palmiste Fougas	Phase Madeleine supérieure	Lherminier 3ème phase Gros Fougas Palmiste		
	Soufrière Boudoute Lherminier L'Habituée	Lherminier L'Habituée Schoelcher	Talin Ac		
	Schoe Icher	Boudoute	i i		
			Phréatomagmatisme		
1560	Maar du Galium	Maar du Galion	:***************		
- 100					
7,00	.596	Cycle Madeleine inférieure st-effusif (habitation Grand-Maison)	Hadeleine 2nde phase		
	Episode explosit	st.explosif (coulées de ponces- scories-nuées ardentes	П		
	ponces à quartz (Anse des Peres)	Bananier-Capesterre)			
	30 H.D				
		************		~	
	Episode lavique	***************************************			
215:11	CARMICHAEL COULEES LAVIQUES	ARRET D'ACTIVITE COULEES LAVIQUES DE TROIS-RIVIERES			
	Nez Cossé Bains Jaunes	Frois-Rivières Parnasse			
	Parnasse La Hegrettée Morne Goyavier	Morne Goyavier Matouba Lia Regrettée		18	
	dassin Bleu Créte à Mangles	La neglettee			
	Début du cycle récent Episode ponceux de PINTADE (Calbessiers-	Episode ponceux andésitique (Pintade)	Episode ponceux de PINTADE	Cycle Madeleine-Soufrière	
35000? 35 000	Danny, Bouch & I Caldeira de la Grande Decouvertes	Episode basaltique	lère phase , chaine andésitique de	* Ponces andésitiques de Boucan-Mt d'Or	
	Volcanisme anté-Pintade	olcanisme anté-Pintade	Bouillante Sans Toucher Carmicnaël Episode ponceux à quartz (caldeira de		
	punces suyeuses (Danoy) (princes à quirtz)			* Dépôts des carrières Danoy et Blanchette (ponces à quartz, scories, ponces andésitiques) * (ahars chauds	
	2		7334 5 23 33	* Dépôts d'origine fissurale au niveau du :	
	Muées Saint-Vincent (Darwy)		Nuées Saint-Vincent (Danoy) attribuées à l'ensemble Matéliane -	Horne Claire- Morne à Jules Tufs	
		Pitons de Bouillante Sans Toucher	Pitons de Bouillante	Fontaine Tufs Habitation Joséphine	
		Jans Toucher		Ponces bicolores Ponces andésitiques du Bouchu	
	100 to a substitution of restrictive			Ponces soyeuses Ponces rhyo	
	Ponces soyeuses (Morne à Jules,attri- buées à l'épisode Bouillante-Sans (oucher)			litiques Brèches d' obsidiennes	
			Début du cycle Madeleine-		
			Seuls les événements soulignés	* Dépôts provenant du système à dominante fissurale	
	1 Inham conthutions	illustrant les différentes hypothèses	sont datés	(Anse de Melle Rose, Thomas, Muscade)	
	concernant l'édifica	e de Bouillante d'après	XXXXXXXXX Per foue de l'epvs	(Bouillante, Pointe à Sel, Pointe à Zombi)	
1	WESTERCAMP (1 BUUDON (1	980) 981) 981)		Chaine andésitique de Bouillante	
	SEVET (1	982)			
	L				

Pour WESTERCAMP(1980), et DAGAIN (1981), tous les niveaux de dacites à quartz du Sud de la Basse-Terre se seraient mis en place en une seule fois. Cet épisode cataclysmique serait responsable de la formation de la Caldeira de Vieux-Habitants (épisode des Pitons de Bouillante-Sans-Toucher). Il constituerait la base stratigraphique du cycle récent de la Soufrière et de la chaîne andésitique de Bouillante.

Remarque: Pour WESTERCAMP (1980), la Montagne de Capesterre, le massif du Sans-Toucher avec ses énormes coulées (crête des Icaques, Morne Montval), le volcan Carmichaël avec le Nez-Cassé, le morne du Col, feraient partie du cycle Sans-Toucher - Carmichaël, postérieur à la caldeira de Vieux-Habitants. (Fig.11 et 13).

2.4.1. La chaîne andésitique de Bouillante :

Elle est située en bordure de la mer caraïbe et limitée à l'Est par l'ensemble des Pitons de Bouillante-Sans-Toucher, sur lequel elle s'appuie. Elle s'arrête à la Pointe à Zombi au Nord, et au Sud selon les auteurs, vers la Grande Rivière des Vieux-Habitants, (DAGAIN, 1981) ou vers la rivière des Pères (GADALIA, 1983) (cartes n°11,12).

Sa direction générale d'allongement est NNW-SSE, parallèlement à l'axe tectonique central de l'Île.

La Chaîne andésitique de Bouillante se différencie dans d'autres épisodes éruptifs par :

- la multiplicité des centres éruptifs qui s'échelonnent le long de la côte caraïbe selon des fissures ENE-WSW, obliques à la direction générale de la chaîne ;
 - la taille relativement restreinte de ces centres ;
- l'abondance des produits subaquatiques. La présence de plusieurs appareils mi-aériens, mi-sous-marins, maintenant émergés et la mise en évidence d'une série de volcans au large de Bouillante (mission océanographique de l'I. P. G.) laissent à penser que le niveau de la mer a oscillé pendant cet épisode, de façon importante : un banc de calcaire lagunaire ayant été trouvé au lieu-dit Thomas, à 150 mètres d'altitude (GADALIA, 1983);
- la différenciation des produits émis des basaltes aux rhyolites, en passant par les dacites.

L'activité de cette chaîne commence par l'édification de petits volcans monogéniques (ex : Pointe à Zombi et Pointe à Sel), puis le volcanisme andésitique se généralise dans les centres précédents et plus en amont. D'abondantes coulées de laves assez fluides se mettent en place en alternance avec des émissions d'hyaloclastites et de ponces aériennes.




Fig. 11 .carte des ensembles volcaniques de la Basse-Terre.

D'après Westercamp(1980)



GADALIA (1983) reconnaît trois groupes parmi les différents édifices de la chaîne (tableau 1 et carte 11)

- Les systèmes à dominante ponctuelle : Pointe à Zombi, Pointe à Sel. Pointe à Lézard, dépression de Bouillante.

L'activité se manifeste sous plusieurs formes :

- dynamisme strombolien : abondance de scories soudées (Pointe à Zombi, Pointe à Négresse, Pointe à Sel, Pointe Marsolle).
- dynamisme subaquatique, hyaloclastites, brèches de maar (Caféière, Habitation Muscade, Malendure, Rivière de Bouillante). Les volcanites sont variées: cendres basaltiques, andésites à deux pyroxènes, ponces bicolores, andésites acides;
- dynamisme effusif moins exprimé, à la Pointe Lézard et à l'anse Marsolle. GADALIA (1983) considère la zone de Bouillante comme le résultat d'une explosion phréatomagmatique, type maar, hypothèse s'appuyant sur la morphologie des terrains et l'abondance des indices d'activité hydrothermale (fumerolles, sources chaudes qui ont donné lieu à des forages d'exploitation).

Les datations effectuées sur le volcanisme de la Pointe à Zombi d'une part (2,05 Ma BAUBRON, 1982), sur la Pointe à Sel d'autre part (0,84 Ma BAUBRON, 1982), sur la Pointe à Lézard (1,11 Ma BRIDEN, 1978), ne permettent pas d'émettre l'idée d'une migration d'activité du Nord vers le Sudí

- Les systèmes à dominante fissurale : (Muscade-Thomas, Matoneanse de Mademoiselle Rose, Morne Marigot-Pointe Dibuque)

Ils fonctionnent tous selon la direction ENE-WSW. L'activité se manifeste sous plusieurs formes :

- activité strombolienne (Thomas)
- dynamisme explosif : . nuées ardentes péléennes (Thomas),
 - . nuées ardentes type Saint-Vincent (Morne
 - Marigot),
 - . projections de hyaloclastites pliniens
 - ponceux (Thomas)
- dynamisme effusif :
- . andésites basaltiques (Muscade),
- . andésites (Morne Marigot),
- . andésites acides (Matone).

Les produits sont toujours les mêmes : andésites basiques, ponces bicolores, andésites acides. Vers le Sud, la gamme de roches présentes se restreint (andésite à deux pyroxènes, andésites acides).




Fig. 12 .carte des ensembles volcaniques de la Basse-Terre.
D'après Gadalia ,1983.



- Le complexe de Vieux-Habitants :

Cette région a les mêmes traits que les systèmes émissifs précédents ; cependant, ses caractéristiques propres lui attribuent une histoire volcanologique étalée dans le temps et l'espace.

Le premier épisode de cette région, attribué à la chaîne andésitique de Bouillante, est la coulée de ponces bicolores de Vieux-Habitants, issue soit d'une fissure ou d'un centre au niveau du Morne Clairefontaine, soit d'un appareil central de grande taille au Sans-Toucher. Cette dernière hypothèse souffre de l'absence de jalons entre les affleurements connus et le centre d'émission.

Les retombées ponceuses dacitiques : Plusieurs épisodes de retombées de ponces vont se succéder dans cette région sans qu'il soit possible de leur attribuer une origine unique.

Les premières retombées sont dacitiques, finement vésiculées (ponces soyeuses). Elles peuvent être attribuées à trois centres : le Morne à Jules, auquel on peut rattacher le dyke de Morandais, le volcan Getz et le volcan de Tuf. Puis des retombées de ponces quartzifères à hornblende associées à des hyaloclastites se mettent en place. Ces deux types de dépôts sont intimement liés sur le terrain.


Le volcanisme rhyolitique de Tuf : entre les épisodes pliniens de ponces dacitiques soyeuses et quartzifères, s'intercalent les formațions rhyolitiques dans la région du Morne Clairefontaine. Le volcan de Tuf a produit des brèches à éléments grossiers d'obsidienne, des hyaloclastites à lapilli d'obsidienne et des ponces satinées.

Parallèlement aux dépôts décrits précédemment, des produits se mettent en place de façon très localisée. Ce sont les dépôts des carrières Blanchette et Danoy. GADALIA (1983) les rattache au volcanisme de la chaîne andésitique de Bouillante en raison de leur position géographique et stratigraphique, et de leur pétrographie (fig. n° 14 et n° 15).

Enfin, des dépôts pliniens de ponces andésitiques d'épaisseur variable coiffent les ponces dacitiques à quartz du Sud de la chaîne andésitique de Bouillante. Ce sont les ponces andésitiques de Boucan Mont d'Or. La distribution des dépôts suggère une éruption importante à partir d'une zone proche de la Grande Découverte, et pouvant correspondre au début de l'activité du massif Madeleine-Soufrière. Mais, leur chimisme (étude des éléments majeurs) les rattacherait à la chaîne andésitique de Bouillante.

Les datations effectuées sur cet ensemble, mais sans précision sur les lieux de prélèvements, donnent des âges entre 0,9 et 1,24 Ma (BRIDEN, 1978). DAGAIN fournit trois datations dues à BOUDRON (1980) : le cône volcanique de Pointe à Sel (840 000 ans) et deux coulées: la Rivière Colas (460 000 ans) et l'Anse du Dépôt (moins de 200 000 ans). Ces derniers âges indiquent un volcanisme plus récent que ne le laissaient supposer les datations de BRIDEN. (1978)

A65	86000N (1981) SEMET (1982)	DAGAIN (1981) SEMET (1982)	WESTERCAMP (1980)	GADALIA (1983)
	Les éruptions historiques de la Soufrière	Les éruptions historiques de la Soufrière		
425 BP	Toutes à caractère phréatique 1975-1977 ; 1956 ; 1796-1798. Eruption de la Soufrière (XVIè) Dôme de la Soufrière	1975-1977 ; 1956 ; 1796-1798. Eruption de la Soufrière (XVIª) Dôme de la Soufrière	Dôme de la Soufrière	
1350 2900	Nuées ardentes peléennes Citerne Echelle	Palmiste	Nuées Saint-Vincent	
		Nuées péléennes		
3100	Eruption de la Soufrière à 3100 BP Episode type St Helens avec coulées de débris	Eruption de la Soufrière à 3100 BP Lruption type Mérapi	Eruption type Hérapi(avec lahars associés Lahar du Galion	
3350 3400 3500	Formation du cratère du Carmichael	Citerne	Citerne 4ème phase	
4400		Gros Fougas	Echelle	
7500 3000	ACTIVITE PERIPHERIQUE Edification du Hadeleine Massif de la Fougas Soufrière Boudoute L'Habituée Schoelcher	Echelle Phase Hadeleine supérieure Lherminier L'Habituée Schoelcher Boudoute	Boudoute Lherminier Jème phase Gros Fougas Palmiste	
1 1560	Maar du Galion	Haar du Galion	Phréatomagmatisme :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
17000	Episode explosif ponces à quartz (Anse des Peres)	Cycle Madeleine inférieure st-effusif (habitation Grand-Maison) st.explosif (coulées de ponces- scories-nuées ardentes Bananier-Capesterre)	Hadeleine 2nde phase	
	Episode lavique	*****************************		
215:0	CARMICHAEL COULEES LAVIQUES DE TROIS-RIVIERES Bains Jaunes Parnasse La Hegrettée Morne Goyavier dassin Bleu Crète à Mangles	ARRET D'ACTIVITE COULEES LAVIQUES DE TROIS-RIVIERES Frois-Rivières Parnasse Morne Goyavier Matouba La Regrettée	V	
350')0?		Episode ponceux andésitique (Pintade) Episode basaltique	Episade ponceux de PINTADE	Cycle Madeleine-Soufrière • Ponces andésitiques de Boucan-Mt d'Or
735 000	Volcanieme anté-Pintadu ponces soyeuses (Danoy) (ponces à quartz)	Chaine andésitique de Bouillante Episode des ponces à quartz (Blanchette, Danoy - Anse des Pères)	chaine andésitique de	 Uépôts des carrières Uanoy et Blanchette (ponces à quartz, scories, ponces andésitiques)
	Nuées Saint-Vincent (Darwy)	Pitons de Bouillante	Nuées Saint-Vincent (Danoy) attribuées à l'ensemble Matéliane - Pitons de Boulllante	Depots d'origine fissurale au niveau du : Depots d'origine fissurale au niveau du : Morne Claire- Morne à Jules Tufs Fontaine Habitation
	Ponces soyeuses (Morne à Jules,attri- buées à l'épisode Bouillante-Sans Toucher)	Sans Toucher		Ponces bicolores du Bouchu Ponces soyeuses Ponces rhyolitiques Bréches d'obsidiennes
	concernant l'édifical la chaine andesitique MESITRAMP (1) BOUDON (1) DAGALI (1)	illustrant les différentes hypothéses Lion du massif Madeleine-Soufrière et g de Bouillante d'après 1811 1811 1913 1913 1913	Début du cycle Madeleine- Soufrière Seuls les événements soulignés sont datés xxxxxxxxxx Période de repos	* Dépôts provenant du système à dominante fissurale, (Anse de Melle Rose, Ihomas, Muscade) * Dépôts provenant du système à dominante ponctuelle (Bouillante, Pointe à Sel, Pointe à Zombi) Chaîne andésitique de Bouillante
3				



2.4.2. Le cycle récent Madeleine-Soufrière:

2.4.2.1. Les événements anté-Pintade :

. Pour DAGAIN (1981), le niveau unique de ponces à quartz de la Basse-Terre constitue la base stratigraphique du cycle récent de la Soufrière. Il s'appuie pour cela sur la coupe de la carrière Blanchette, qui montre de bas en haut un épisode à quartz puis un épisode basaltique, suivi d'un épisode andésitique, assimilable aux ponces de Pintade (tableau 1 + coupe 14). L'absence de discordance entre les niveaux suggère une seule phase éruptive dont le centre serait situé dans la zone Carmicha-ël-Soufrière.

La succession dacite-basalte-andésite s'expliquerait par le modèle du magma mixing de SPARKS et al.(1979) et celui de refusion développé par WESTERCAMP (1979), dans lequel une chambre magmatique différenciée par cristallisation fractionnée recevrait l'apport d'un stock basaltique profond par le rejeu d'accidents tectoniques. A ce moment-là, seuls les stocks magmatiques qui sont à la température du solidus seraient mobilisables. Les dacites représenteraient le magma juvénile non contaminé par le basalte. Les ponces rubanées résulteraient du mélange mécanique entre magma acide et magma basaltique intrusif. Puis, la colonne de magma ferait éruption en expulsant les termes basaltiques, ensuite les termes andésitiques.

- . BOUDON (1981) observe sur la côte sous le vent (entre Basse-Terre et Vieux-Habitants), sous les ponces de Pintade, plusieurs niveaux éruptifs, sans chronologie précise :
- Les ponces soyeuses du Morne à Jules, qu'il attribuerait à l'épisode Bouillante-Sans-Toucher ;
- Les niveaux pyroclastiques scoriacés, observés uniquement dans la rivière des Pères, la rivière Noire, et la pointe de la Madeleine, sont recouverts dans la rivière Noire par des ponces liées à l'événement de Pintade. Ce sont des unités métriques à décamétriques, de couleur sombre, où les blocs décimétriques, grossièrement vésiculés, baignent dans une matrice cendreuse fine.
- Les nuées Saint-Vincent sont visibles dans la carrière Danoy (coupe15, carte13), dans la rivière Saint-Louis et près de Vieux-Habitants. La puissance des dépôts est de 8-9m, en une seule venue. Le point d'émission se situerait dans le secteur Soufrière-Carmichaël. Dans la rivière Saint-Louis, aucun repère stratigraphique n'a permis de déterminer leur position. Dans la carrière Danoy, elles sont recouvertes par les dacites à quartz par l'intermédiaire de retombées ponceuses et cendreuses (coupe 15).
- Les ponces dacitiques à quartz automorphes et bipyramidés, ou ponces soyeuses de la carrière Danoy, constituent trois unités métriques, séparées par des niveaux de retombées aériennes (coupe 15). La présence de ponces rubanées a été interprétée comme le résultat d'un mélange de magmas BOUDON (1981). Elles sont séparées des ponces de Pintade par des retombées aériennes et par un lahar à gros blocs.

CARRIERE BLANCHETTE

Alternance décimètrique de ponces et lapilli blancs

Scories de petite taille , jointives. E 1103 e niveau à lapilli noirs

Cendres fines noires, litées

Ponces blanches à noires de petite taille E 1103 c

Ponces de petite taille, pauvres en minéraux, blanches E 1103 b

Porces blanches de petite taille(4-5cm), de dacites à quartz .Présence d'individus rubané E 1103 a

Les dépots de la carrière Blanchette reposent sur la coulée du Plessis.

Fig. 14 . Coupe de la carrière Blanchette

Les numéros (E 1103 a à e) représentent les échantillor étudiés.

CARRIERE DANOY




Fig. 15 . Coupe de la carrière Danoy

Les numéros d'échantillons (F 901, F 802 g, F 802 a) représentent les échantillons étudiés.

Dans la rivière des Pères, leur position stratigraphique n'a pu être précisée.

. Quant à WESTERCAMP (1980) s'il place l'unique épisode à quartz à la base de la chaîne andésitique , de l'ensemble Matéliane-Sans-Toucher et du cycle récent Madeleine-Soufrière, il interprête les nuées Saint-Vincent comme les dernières manifestations de l'ensemble des Pitons de Bouillante.

2.4.2.2. : L'évènement ponceux de Pintade

Si pour tous les auteurs, cet événement ne constitue pas la base du cycle récent en Guadeloupe (WESTERCAMP, 1980, DAGAIN, 1981), tous le reconnaissent comme un événement majeur.

En effet, on trouve des ponces de Pintade depuis Vieux-Habitants jusqu'à Basse-Terre, et de Trois-Rivières à Capesterre, et jusqu'à l'altitude de 440 mètres dans la rivière Noire (BOUDON. 1981)(fig.16).


Deux types de dépôts ont été rattachés à l'épisode de Pintade :

- Les retombées aériennes, cendreuses et ponceuses, situées sur le versant ouest du massif. La coupe de Boucan Mont-d'Or illustre cet épisode avec une succession de strates d'épaisseur métrique, montrant les alternances de dépôts cendreux et ponceux. (BOUDON, 1981, DAGAIN, 1981)
- Les coulées de ponces ont en général une épaisseur d'une vingtaine de mètres, sauf dans la rivière Noire, et dans la rivière des Pères, où l'épaisseur peut atteindre 50 m. Elles reposent souvent sur des lahars anciens. Elles sont surmontées par des formations diverses. (BOUDON, 1981)
 - le tuf de maar de l'épisode Madeleine (distillerie Belost)
 - la coulée de débris de l'épisode 3 000 ans (Circonvallation, Rivière des Pères);
 - des nuées péléennes d'origine non précisée (rivière Noire) ;
 - les coulées de base du volcanisme de Madeleine (Trois-Rivières-Capesterre).

L'extension des ponces de Pintade est importante et leur volume aussi (plusieurs $\rm km^3)$. Le centre d'émission se situerait pour DAGAIN (1981) dans la zone Carmichaël-Soufrière. Le volume important des pyroclastites est lié à l'effondrement d'une caldeira dont il ne subsisterait plus que le mur nord : Grande Découverte, Morne du Col, et dénommée caldeira de la Grande Découverte. (BOUDON, 1981) (carte 13)

2.4.2.3. : Les événements post-Pintade

Ils sont caractéristiques du massif Madeleine-Soufrière.



Pour DAGAIN (1981) le volcanisme est d'origine fissurale et se place le long d'un axe majeur NNW-SSE (carte 17), matérialisé par l'alignement Soufrière-Echelle-Citerne-Madeleine.

Cette particularité est bien illustrée par la phase succédant à l'épisode Pintade, et responsable de la construction de l'ensemble des coulées de Trois-Rivières. Celles-ci affleurent uniquement à l'Est et au Sud du massif, et forment le substratum de nombreux dômes et coulées plus récents. Elles peuvent atteindre la mer aux alentours de la commune de Trois-Rivières (coulée de la Regrettée). Certaines d'entre elles se situent à des altitudes relativement élevées dans le massif (en contrebas de la Soufrière : Bains Jaunes, Parnasse, Morne Goyavier, Fond Bernard, Nez Cassé). Elles proviennent de plusieurs centres éruptifs échelonnés le long de l'axe volcanique NNW-SSE . (fig. 17)Entre ces coulées et la phase suivante (Madeleine), DAGAIN met en évidence un arrêt d'activité ponctué par des lahars.

BOUDON (1981) groupe ces coulées en deux ensembles :


- celles situées dans la partie haute du massif (Bains jaunes, Parnasse Goyavier...) appartiendraient à l'épisode de l'édification du Carmichaël, qui suit les ponces de Pintade, et seraient intracaldeiriques. Le dôme du Nez Cassé correspondrait à l'une des dernières phases ;


- celles situées aux alentours de Trois Rivières appartiendraient à un épisode volcanique périphérique (épisode Madeleine), dont elles constitueraient une partie du premier stade. En effet, parallèlement à l'activité du massif de la Soufrière, se déroulerait un volcanisme périphérique dans la région de Moscou-Madeleine. Le second stade serait représenté par les coulées de ponces dacitiques à quartz de l'anse des Pères, très différentes de celles de la carrière Danoy (taille plus grande des ponces, aspect moins soyeux, quartz non bipyramidés, rareté de l'amphibole, abondance de grands phénocristaux). Certains individus sont rubanés. La matrice est peu abondante. L'épaisseur du dépôt est d'une dizaine de mètres. Des argiles à quartz, visibles plus à l'Est, à l'anse à la Fontaine, sont attribués aux retombées aéri ennes ponceuses qui auraient précédé la mise en place des coulées pyroclastiques. Une dépression au niveau de la plaine de Moscou, remplie de dépôts lacustres, laisse supposer la présence d'une ancienne caldeira, liée aux ponces de l'anse des Pères.

Une phase phréatomagmatique (maar du Galion), sépare la phase explosive précédente de la dernière phase, effusive, pendant laquelle se mettent en place de puissantes coulées (Schoelcher-Montchappée, Habituée, Morne Boudoute, Lherminier, Palmiste, Gros Fougas) (fig. 13)

Pour DAGAIN, le cycle Madeleine est la suite des manifestations volcaniques du massif Madeleine-Soufrière, mais décalées vers l'Est sur l'axe NNW-SSE.

Le cycle Madeleine inférieure est un stade effusif, mal défini, commançant avec la coulée de l'Habitation Grandmaison. Le stade explosif touche principalement l'Est du massif entre Bananier et Capesterre (coulées de ponces et scories). Une phase éruptive de type maar sépare cet épisode de l'épisode Madeleine supérieur, essentiellement effusif.





Les formations attribuées aux épisodes post-Pintade par ces deux auteurs sont pour la plupart identiques, à quelques exceptions près: dacites à quartz de l'anse des Pères, Gros Fougas, Palmiste (tableau 1). Les dépôts de coulées de ponces visibles dans la rivière du Grand Carbet, interprétés par DAGAIN comme les témoins de l'épisode Madeleine inférieure, pourraient correspondre aux niveaux attribués (sous réserve) par BOUDON à l'édification du Carmichaël.

L'activité de la Soufrière s. str. succède au cycle Madeleine et ses différentes phases ont pu être datées par ¹⁴C (PATERNE, 1980). Le premier épisode est, soit l'édifice du volcanisme de l'Echelle (WESTERCAMP, 1980, DAGAIN, 1981), soit l'éruption à 3 100 ans BP. (BOUDON, 1981) (tableau 1). Quels que soient les auteurs, ceux-ci s'accordent pour reconnaître à cette dernière un caractère majeur de type Saint-Helens (BOUDON, 1981) ou de type Mérapi (WESTERCAMP, 1980, DAGAIN, 1981). L'éruption de la Soufrière du XVIè Siècle constitue actuellemnt le dernier épisode magmatique; les éruptions récentes et jusqu'en 1977 sont uniquement phréatiques.

2.4.2.4. <u>Les datations absolues disponibles sur ces</u> événements :

Hormis l'épisode récent de Madeleine pour lequel les datations au $^{14}\mathrm{C}$ sont possibles, les autres formations n'ont pas pu être datées directement.

Une limite inférieure pour le cycle récent pourrait être donnée pour la datation de la coulée du Plessis sur laquelle reposent les dépôts de Blanchette (hypothèse DAGAIN, 1981). Trois datations ont donné 1,1Ma (BAUBRON, 1974) 1,35 Ma (BELLON, 1974) 1,3 Ma (BRIDEN, 1978).

Selon WESTERCAMP (1980) , l'épisode cataclysmique des ponces à quartz se serait déroulé entre 1 Ma et 500 000 ans.

Les ponces de Pintade ont fait l'objet d'essais de datations au $^{14}\mathrm{C}$ (PATERNE, 1980). Les résultats donnent des âges supérieurs à 38 500 ans BP.

Aucune coulée pyroclastique ou lavique n'a été datée directement. Des bois pris dans des nuées ardentes et des coulées de cendres, attribuées sous réserve par BOUDON au Carmichaël, donnent des âges de 21 340 ans BP et 22 911 - 240 ans BP. Rappelons que l'édification du Carmicaël serait contemporaine des coulées de Trois-Rivières (BOUDON, 1981).

Les données ¹⁴C situent la phase Madeleine inférieure entre 29 800 ans et 17 800 ans, le maar du Galion aux alentours de 14 500 ans et la phase Madeleine supérieure entre 12 700 et 8 500 ans BP.

2.5. Problèmes posés par les formations guadeloupéennes - Solutions pour les résoudre.

De cette présentation, il ressort que la connaissance de la Guadeloupe souffre d'une absence de chronométrie qui permettrait de séparer les cycles d'activité et surtout de préciser la durée des temps de repos qui les séparent. Cette étude chronologique, jointe à l'étude minéralogique et géochimique devrait permettre de situer les épisodes explosifs dans le déroulement de chacun des cycles, et de faire des corrélations horizontales entre ces niveaux repères.

Déjà, plusieurs interrogations sur les niveaux ponceux sont posées :


- 1. A quoi rattacher les ponces soyeuses du Morne à Jules : à la chaîne andésitique de Bouillante ou aux Pitons de Bouillante-Sans-Toucher ?
- 2. A quoi attribuer les dépôts de Blanchette et de la carrière Danoy : à la chaîne andésitique de Bouillante, ou au cycle récent Madeleine-Soufrière ? Ont-ils une parenté ?
- 3. Existe-t-il un ou plusieurs niveaux de ponces à quartz dans le Sud de la Basse-Terre ?
- 4. Quelle est leur position stratigraphique et à qu∞i appartiennentils ? A la chaîne andésitique, à l'ensemble Sans-Toucher-Carmichaël, au cycle récent, ou à l'épisode périphérique Madeleine ?
- 5. En raison de la difficulté de corrélations des dépôts, les niveaux attribués à l'événement de Pintade et que l'on retrouve dans tout le Sud de la Basse-Terre, de Vieux-Habitants à Basse-Terre, et de Trois-Rivières à Capesterre, appartiennent-ils tous au même niveau ?

Pour pallier le manque de datations concernant ces épisodes, il était nécessaire de trouver une ou plusieurs méthodes de datations couvrant la fourchette de temps 1 Ma.-35 000 ans (limite supérieure du ¹⁴C.)

La méthode K-Ar a été utilisée. Les mesures ont été faites au Centre des Faibles Radioactivités (C.F.R.), où cette méthode, adaptée aux âges jeunes, a été mise au point. Elle ne concerne que les laves, fraîches et massives (cf. tableau 2 + Carte 18).

Les essais tentés sur les ponces par cette méthode ayant été infructueux, une autre méthode a été choisie : il s'agit de la thermoluminescence, retenue en raison de la présence de quartz dans certains niveaux ponceux dacitiques. Les mesures ont été faites au C. F. R. (cf. tableau 3 + carte 18).

Les niveaux ponceux ont par ailleurs fait l'objet d'une étude minéralogique fine (microsonde) et d'une étude géochimique complète (majeurs et traces), dont les résultats apportent de nombreuses réponses aux questions posées (cf. tableau 4 + carte 18).



N°	Localisation	Coordonnée U.T.M. X,Y;Altitude	Phase volcanique
1 A	L'habituée	650,75 E ; 1 771,4 N ; 100 m	coulée de lave de la Madeleine inférieure âge zéro pour K.Ar
1	Schoelcher	647.E ; 1 768,07 N ; 240 m	coulée de lave de la Madeleine inférieure âge zéro pour K.Ar
3 A	Carbet	652,8 E ; 1 772,20 N ; 20 m	22 000 BP (ponce) âge zéro pour .Ae
4	Calion	643,4 E ; 1 773,62 N ; 1 020 m	Eruption XVIe siècle (ponce) âge zéro pour K.Ar
N 1105	Morne Goyavier	642,45 E ; 1 773,70 N ; 1 040 m	cycle récent coulée Trois Rivières Carmicaël
K 1401	Fond Bernard	640,4 E ; 1 775,9 N ; 640 m	cycle récent coulée Trois Rivières
S 1201	3ème chute du Carbet	647,25 E ; 1 774,8 N ; 420 m	cycle récent ?
J 1201	Matouba	639,00 E ; 1 774,9 N ; 520 m	cycle récent ?
D 1301	Grande Rivière des Vieux Habitants	633,25 E ; 1 775,8 N ; 60 m	Pitons de Bouillante - Sans-Toucher
J 1401	Morne Montval	638,2 E·: 1 776,6 N ; 760 m	Pitons de Bouillante - Sans-Toucher dernière phase
G 1501	Habitation Grivelière	636,10 E ; 1 777,5 N ; 240 m	Pitons de Bouillante - Sans-Toucher
Н 1702	Morne Soldat	637,2 E ; 1 779,6 N ; 320 m	Pitons de Bouillante - Sans-Toucher substratum de chaîne andésitique
E 1101	Coulée de Plessis	634,25 E ; 1 773,8 N ; 60 m	Pitons de Bouillante - Sans-Toucher derniers épisodes
30 A	Le Tuf	635,7 € ; 1 775,35 N ; 300 m	Chaîne andésitique (zone de Vieux-Habitants)
D 1402a	Morne Davi	633 E ; 1 776,4 N ; 30 m	Pitons de Bouillante - Sans-Toucher
24	dyke de Tarare-Morandais	633,3 E ; 1 778,7 N ; 65 m	Chaîne andésitique de Bouillante Contemporain du volcan de Morne à Jules
J 101	Pointe du Vieux Fort	638,85 E ; 1 764 N ; 20 m	Base des Monts Caraïbes
J 301	Pointe Mazarin	638,65 E ; 1 765,20 N, 20 m	Base des monts Caraïbes

Tableau 2

Echantillons datés par potassium-argon

Phase volcanique	Dacite à quartz	Dacite à quartz	Dacite à quartz
	- base cycle récent ?	- base cycle récent ?	- chaîne andésitique de Bouillante ?
	- chaîne andésitique de Bouillante ?	- phase Madeleine ?	- base cycle récent ?
X Y (UTM) altitude	634,2 E	644,05 E	636,5 E
	1 770,9C N	1 765,5 N	1 775,75 N
	4C m	5 m	420 m
Localisation	Carrière Danoy	Anse des Pères	Montval.
o 22	F 862g ₁	P 301a	13

Tableau 3

Echantillons datés par thermoluminescence.

K.a	Localisation	X ; Y ; altitude	Episode volcanique	facies
F 901 b ₁	Carrière Danoy	636,2 E 1 771,07 N 60 m	Ponces andésitiques Pintade	gris blane
н 901 а н 901 b	Rivière des Pères	637,45 E 1 771,5 N 160 m	Pintade	noire
J 1007/A J 1007/B	Rivière Noire	638,4 E 1 772,5 N 340 m	Pintade	clair foncé
D 1204	Grand Croix - Rocroy	634 E 1 774,5 N 40 m	Pintade	clair
7 A	Calbassiers	635,35 E 1 770,1 N 20 m	Pintade	clair
Х ЭОТ	Anse à la Fontaine	652,40 E 1 771,85 N 10 m	Pintade	clair
P 401 a	Anse du Morne Rouge	645, E 1 766,35 N O m	Pintade	blanc mixte
F 802 g ₁ F 802 g ₂	Carrière Danoy	634,2 E 1 770,90 N 40 m	Dacite à quartz Base du cycle récent ? Chaîne andésitique de Bouillante ?	clair foncé
P 301a P 301b	Anse des Pères	644,05 E 1 765,5 N 5 m	Dacite à quart Base de cycle récent ? Cycle Madeleine ?	c}air mixte
E 1103 a E 1103 b E 1103 c E 1103 e	Carrière Blanchette	634,25 E 1 773,35 N 50 m	ponces andésitiques à daci- tiques base de Soufrière ? chaîne andésitique de Bouillante ?	clair clair noire clair
F 802 a ₁ F 802 a ₂	Currière Danoy	634,2 E 1 770,90 N 40 m	Nuée Sain-Vincent chaîne andésitique de Bouillante ? Cycle récent ?	scorie lave
C 1501	Morne à Jules	632,8 E 1 777,75 N 60 m	Pitons:de Bouillante ? Chaîne andésitique de Bouillante ?	ponce soyeuse

Tableau 4 échantillons étudiés par microsonde

CHAPITRE 2

I. METHODE DU POTASSIUM-ARGON

- 1. INTRODUCTION.
- 1.1. Nécessité d'une étude adaptée aux âges jeunes;
- Dans la fourchette de temps 500 000 35 000 ans (limite supérieure du c, peu de méthodes de datations sont disponibles ; les principales sont :
 - le déséquilibre radioactif²³⁴U/²³⁰Th,
 - les traces de fiscion,
 - la thermoluminescence.

Or, il est important d'utiliser une méthode de datation adaptée au Pléistocène. En effet, les données volcanologiques, paléoclimatiques, mais aussi les variations du champ magnétique terrestre correspondant à cette période offrent, par la proximité dans le temps, une meilleure conservation, et plus de détails qu'aucune autre période géologique.

En Guadeloupe, les éruptions ponceuses majeures semblent correspondre au début d'un nouveau cycle éruptif après un hiatus d'activité volcanique pouvant atteindre le million d'années. Elles sont suivies, en général, par une activité soutenue de type péléen ou effusif. L'âge de ces cycles est encore inconnu, ainsi que leur durée. De même, certaines corrélations stratigraphiques sont encore incertaines. L'exemple le plus typique est donné par la position du ou des niveaux de ponces à quartz, qui varie selon les auteurs (cf. tableau 1). Quant à la position des cycles les uns par rapport aux autres, elle n'est pas clairement définie.

De façon plus générale, la connaissance précise de la chronologie des événements éruptifs est indispensable pour une reconstitution des éruptions (étude de l'histoire volcanique d'un massif, des variations chimiques des produits émis au cours du temps, etc..., et pour l'évolution des structures volcaniques liées à ces éruptions, toutes données nécessaires à l'étude des champs géothermiques.

Il paraît nécessaire de développer pour le Pléistocène une méthode de datation offrant une précision meilleure que la dizaine de milliers d'années ; cela a été entrepris au laboratoire de géochronologie du Centre des Faibles Radioactivités (C. F. R.) de Gif/Yvette par MM CASSIGNOL, CORNETTE, DAVID et GILLOT.

Ce chapitre est consacré à la méthode K-Ar décrivant son principe, ses originalités, son champ d'application, et les résultats obtenus sur nos échantillons guadeloupéens.

1. 2. Principe.

La radiométrie utilise la transformation par radioactivité naturelle d'un isotope radioactif en un isotope stable (noyau radiogénique). La vitesse de désintégration est une caractéristique des noyaux radioactifs, indépendante des paramètres extérieurs tels que température, pression ou chimisme.

Le nombre d'atomes parents N, à l'instant t est fonction du nombre initial No d'atomes au temps t=o

No = Ne
$$-\lambda t$$
 (1)

D étant le nombre d'atomes radiogéniques, on peut écrire :

$$\frac{dD}{dt} = \frac{dN}{dt}$$
 (2) No = N + D (3)

En subsistant (3) dans (1), on a

$$D = N (e^{\lambda t} - 1)$$
 (4)

La relation donnant l'âge peut s'écrire :

$$t = \frac{1}{\lambda} - \ln\left(\frac{D}{N} + 1\right) \quad (5)$$

La vitesse de désintégration d'un isotope est définie par la constante λ ou par le temps de demi-vie (période T) qui est le temps nécessaire à la transformation de la moitié des atomes d'origine.

$$N = \frac{No}{2} \qquad \text{et } T = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

En connaissant le nombre d'atomes radiogéniques, et le nombre d'atomes radioactifs actuellement présents,on peut connaître l'âge de la roche, à condition que le système constitué par celle-ci soit resté fermé. Dans la méthode K-Ar, il s'agit de déterminer le nombre d'atomes d'argon radiogéniques (Ar) et le nombre d'atomes K dans la roche.

La méthode K-Ar est bien adaptée aux roches volcaniques : une coulée de lave, parce qu'elle est complétement dégazée lors de sa mise en place, et qu'elle se refroidit rapidement, déterminant un temps zéro précis, constitue un cas idéal.

On peut alors appliquer la relation donnant l'âge :

L'argon mesuré grâce au spectromètre de masse correspond à la somme de l'argon radiogénique et de l'argon de contamination.

L'argon de contamination provient des lignes d'extration, de purification et de mesure de l'argon, et de la roche elle-même. La composition isotopique de la contamination est celle de l'atmosphère.

L'argon radiogénique est déduit, après soustraction de l'argon de contamination, de l'argon total. Dans le cas des roches très jeunes, il est difficile de mesurer l'argon radiogénique dont le pourcentage est toujours très faible (1 % voir moins de l'argon total). Il faut donc pouvoir apprécier de très faibles différences entre la composition isotopique de l'argon extrait de l'échantillon et celle de l'argon atmosphérique.

D'autre part, les roches peuvent quelquefois contenir de l'argon hérité. Sa présence se traduit dans les mesures de laves d'âge zéro, par un âge apparent (excès d'argon) (DALRYMPLE, 1969, KRUMMENACKER, 1970, GILLOT et al.,1982). L'excès d'argon influe particulièrement sur les mesures d'âges jeunes. Dans le tableau 5 , le calcul montre l'influence qu'une même quantité d'argon hérité a sur des roches d'âge croissant.


Age de la : roche : (1% K) ans :	12 000	50 000	100 000	500 000	10 ⁶
Nombre d'atomes d'Ar dans 1 gramme de roche	1,2 10 ¹⁰	5,22 10 ¹⁰	10,45 10 ¹⁰	50,90 10 ¹⁰	104,5 10 ¹⁰
Nombre : d'atomes : d'argon : hérité :	1,8 10 ¹⁰	1,8 10 ¹⁰	1,8 10 ¹⁰	1,8 10 ¹⁰	1,8 10 ¹⁰
Nombre : total : d'argon : mesuré :	3 10 ¹⁰	7,02 10 ¹⁰	12,25 10 ¹⁰	52,70 10 ¹⁰	106,3 10 ¹⁰
% d'argon : hérité :	60 %	25,6 %	: : : 14,70 %	3,4 %	: : : 1,6 %

Tableau 5

Influence d'une quantité d'argon hérité (choisie arbitrairement dans la littérature : datation du Puy de la Vache, CASSIGNOL et al., 1982), sur des roches d'âges croissants.

1.3. Description succinte de la technique de datation K-Ar.

La méthode conventionnelle K-Ar peut être découpée comme suit :



- Prédégazage des échantillons : la roche totale est broyée, tamisée et lavée. La fraction choisie varie peu selon les laboratoires (0,315 mm - 0,400 mm au laboratoire de Grenoble ; 0,250 mm -0,500 mm au C. F. R.)
- 2. Le dosage du potassium et de l'argon se fait à l'aide de deux aliquotes de la même fraction.
- 3. Pour extraire et analyser l'argon de la roche, la procédure est la suivante :
 - prédégazage : il a pour but d'éliminer autant que possible l'argon de contamination provenant de l'installation et de la roche. Pour cela, on chauffe la rampe, les pièges (titane, cuivre, oxyde de cuivre éventuellement) et les charbons actifs sous pompage. L'échantillon est dégazé à une température pouvant aller de l'ambiante à 250°C;
 - la fusion de l'échantillon s'effectue au moyen d'un générateur haute fréquence apériodique, qui permet de chauffer le creuset métallique qui contient l'échantillon. Les gaz sont ainsi libérés et piégés dans le charbon actif réfrigéré par l'azote liquide;

- dans le cas de la dilution isotopique, l'échantillon ³⁸ Ar est introduit avant, pendant ou après la fusion :
- la purification consiste à éliminer par des moyens physiques (pièges froids servant à condenser l'eau ou le CO₂), ou des moyens chimiques (réaction des gaz actifs sur un métal:U, Ti, Cu, CuO chauffés). Après cette opération, seuls demeurent les gaz rares, l'argon étant le plus abondant.
- Ainsi purifié, l'argon peut alors être analysé au spectromètre de masse.

2. MESURE DU POTASSIUM.

Le potassium est dosé par la méthode absorption atomique, proposée par WALSCH,(1955), sur un appareil PERKIN-ELMER 303.

Dans cette méthode, la solution potassique est nébulisée dans une flamme chaude air-acéthylène. L'énergie de la flamme dissout les molécules en atomes. La flamme est traversée par un pinceau lumineux provenant d'une source qui émet la raie de résonance caractéristique du potassium. Les atomes absorbent, pour passer à l'état excité, l'énergie de leur raie de résonance. Cette absorption est corrélée à la concentration de l'élément par la relation :

$$I = I_0 e^{-klc}$$

- ou I = intensité recueillie après traversée de la flamme
 - I = intensité de la raie de résonmance émise par la source
 - k = facteur expérimental dépendant du réglage de l'appareil
 - c = concentration en atomes de l'élément à
 doser

La différence d'intensité enregistrée entre la source d'émission et le photomultiplicateur qui enregistre I correspond à l'intensité absorbée par les atomes de potassium passant à l'état excité. En pratique, il faut tout d'abord mettre en solution l'échantillon. Cela se fait par :

- 1. attaque d'une prise de 100 à 500 mg (selon la teneur en potassium de l'échantillon), de la fraction servant au dosage de l'argon, par un mélange d'acides fluorhydrique, perchlorique et nitrique en solution aqueuse, dans un creuset en téflon placé sur une plaque chauffante, jusqu'à évaporation;
- 2. mise en solution en milieu chlorhydrique, après rinçage, du résidu sec.

A la fin de cette opération, nous obtenons 100 ml de solution chlorhydrique 0,6N. La même opération est effectuée dans un creuset vide afin de réaliser un blanc d'analyse (les blancs, pour des séries successives effectuées dans les mêmes conditions, sont comparés entre eux et permettent de fixer un zéro de mesure). Puis 2 ml de cette solution sont dilués en présence d'une solution de césium concentré à 10 000 ppm. En effet, les éléments qui accompagnent le potassium dans l'échantillon provoquent des perturbations dans les mesures (nommées effet de matrice). Les interférences les plus importantes sont dues aux éléments Fe, Al et Ca qui réduisent l'absorption et Na qui l'augmente. Elles sont corrigées par l'addition dans la solution, d'un tampon d'ionisation (solution de césium dans notre cas) qui sert à augmenter l'absorption en diminuant l'effet d'ionisation de l'élément à doser.

A la fin de la préparation, une solution ayant un taux de K compris entre 0 et $5\,\mu\mathrm{g/ml}$ est obtenue. Elle sera nébulisée dans la flamme. La valeur d'absorption mesurée est comparée à celles obtenues par des solutions de concentration connues en K, mesurées dans les mêmes conditions, pour déduire la concentration en K de la solution. En tenant compte des facteurs de dilution et du poids de la prise d'attaque, on déduit la teneur en K_0 de l'échantillon.

3. MESURE DE L'ARGON.

3.1. Conditions de mesures.

Les mesures sont faites au spectromètre de masse (180°C, 6 cm de rayon, 3 500 Gauss), utilisé selon le mode statique.

3.1.1. <u>Maintien du vide résiduel à un niveau minimum et constant -</u> Purification des échantillons.

La présence de getters tout le long de la ligne d'introduction dans le spectromètre, et dans la cellule elle-même est une des originalités de la méthode. Constitués d'un alliage aluminium-zirconium, ils entretiennent la qualité du vide pour tous les gaz actifs.

La présence de getters dans la cellule du spectromètre de masse maintient le vide résiduel à un niveau minimum et constant (inférieur au 1/10 000 du pic d'argon 40 dans un remplissage moyen, 10⁻⁶ cc d'argon dans les conditions normales). Quand les getters ne sont pas alimentés, la résiduelle du spectromètre (masses autres que l'argon, désorbées par les structures métalliques : 16 - 28 - 44) croît, et constitue une fraction importante de la pression du gaz dans la cellule, 30 % parfois (CASSIGNOL et al., 1978).

3.1.2. Stabilité et reproductibilité des conditions de mesures d'argon.

3.1.2.1. : Stabilité des paramètres de source.

Pour que le niveau des signaux soit constant et reproductible, les paramètres de source doivent rester identiques durant toute la durée des mesures. Leur stabilité est assurée à mieux que le 1/1 000.

Le courant électronique, la tension d'accélération des ions et des électrons sont à tout instant régulés et surveillés. Grâce à des voltmètres digitaux, chacun des paramètres peut être réglé manuellement et rétabli dans sa position initiale en cas de variation intempestive. Par ces moyens, toutes les mesures sont faites dans les mêmes conditions.

De plus, l'alimentation électrique du spectromètre est régulée par un groupe alternateur qui assure à l'ensemble des appareils une tension régulière. Enfin, la pièce est climatisée dans les limites de variation de plus ou moins 1°C durant la journée.

Grâce à la constance des signaux d'argon, il est possible d'utiliser pour les mesures des circuits d'amplification à constante de temps élevée, plus précis.

3.1.2.2. Mesures en double collection.

La mesure en collection simultanée assure une permanence dans les conditions de déflection du faisceau qui n'implique ni balayage ni division de la tension ou de l'intensité du champ magnétique.

La précision devient au moins deux fois meilleure que dans le cas du peak-switching (CASSIGNOL et al., 1982). Actuellement, seules les masses 40 et 36 sont mesurées ; ces signaux sont échantillonnés toutes les secondes : les amplificateurs des deux voies 40 et 36 sont reliés à un ordinateur qui traite les données.

3.1.2.3. Diminution des effets de mémoire.

Pour diminuer l'effet de mémoire, le spectromètre de masse n'est jamais éteint, et la cellule du spectromètre jamais vide : on y introduit , entre chaque mesure, une quantité d'argon atmosphérique comparable aux échantillons mesurés. Il s'établit alors un équilibre entre l'implantation et la désorption d'ions des parois du spectromètre de masse. En effet, si l'on vide le spectromètre de masse et qu'ensuite on le maintient isolé, on assiste à une remontée des signaux d'argon due à la désorption des ions implantés dans les structures métalliques bombardées par les faisceaux d'ions (phénomène de mémoire). Si l'on remplit à nouveau le spectromètre à une forte pression d'argon, les signaux d'argon vont décroître (implantation des ions) jusqu'à atteindre un nouvel équilibre implantation/désorption. Ainsi, les signaux n'évoluent pas. Cela est illustré


par la figure 19 , qui représente les signaux de 36 d'un échantillon et du minéral-étalon Gl-0 (glauconite). Celui-ci est très peu contaminé. Il contient à peu près 10 fois moins de 36 que l'argon atmosphérique ayant servi au remplissage de la cellule. L'équilibre dans celle-ci est en partie détruit, et on observe la variation des signaux de 36.

Sous ces conditions, le signal d'argon est constant, reproductible, et représentatif de la quantité d'argon introduite. L'utilisation de l'étalon interne d'argon 38 est alors inutile. En effet, dans la méthode classique, du fait de l'évolution des signaux (variation de 10 % en une heure, DALRNYMPLE et LANPHERE, 1969), il n'y a pas de relation entre les pressions partielles des isotopes, et la hauteur des pics obtenus. L'argon 38 calibré, en introduisant une quantité connue dans le calcul, permet de déduire la quantité d'argon radiogénique. Dans notre cas, les signaux étant constants, reproductibles et représentatifs de la quantité d'argon, le spectromètre de masse est utilisé à la manière d'un instrument de mesure directe : les signaux de Ar et de Ar sont comparés, lors de mesures indépendantes, aux signaux d'une prise d'argon atmosphérique, puis d'une prise d'argon connue.

Remarque: Ne pas utiliser l'étalon ³⁸ Ar présente l'avantage de ne pas modifier la réponse du spectromètre de masse en introduisant un gaz étranger non isobare de l'argon (CASSIGNOL et al., 1982); en effet, si dans la cellule d'un spectromètre travaillant sur de l'argon atmosphérique et aligné sur le ⁴ Ar on introduit de l'argon 38, on constate une baisse sensible du pic ⁴ Ar (10 % environ). De plus, la présence d'hélium modifie également la réponse du spectromètre: 20 % d'excès apparent d'argon 40 dans la mesure d'un gaz provenant d'une roche d'âge nul, ne pouvant apporter aucun artefact succeptible de vieillir l'âge (il s'agit d'un calcul biliaire). L'élimination de l'hélium rétablit le rapport isotopique de l'argon atmosphérique. L'hélium s'introduit dans la rampe par perméation à travers la paroi du doigt de quartz contenant la mousse de titane: le quartz est perméable à l'hélium lorsqu'il est chauffé à température élevée (900°C dans notre cas).

3. 2. Principes des mesures.

Le principe des mesures est basé sur le fait que les signaux d'argon n'évoluent pas, qu'ils sont reproductibles et qu'ils sont représentatifs de la pression partielle de l'isotope considéré. La quantité d'argon radiogénique est connue par comparaison des signaux d'argon de l'échantillon à une quantité d'argon atmosphérique mesurée dans les mêmes conditions de pression. Ceci n'est valable que si l'argon de contamination a une composition atmosphérique.



9

3.2.1. Composition de l'argon de contamination.

Pour étudier la composition de l'argon de contamination et les problèmes liés au chronomètre potassium—argon (héritage d'argon...), on utilise des roches d'âge zéro (coulées de laves historiques par exemple).

Les premières études ont été faites avec un spectromètre de masse ayant une mémoire en argon 38 du fait de l'utilisation du spike (DALRYMPLE,1969). Cet auteur mesure le rapport isotopique 40ar/30ar dans la fourchette d'erreur du rapport isotopique atmosphérique instrumental. Les seules exceptions à cette loi correspondent à des datations sur des roches porphyriques ou sur des roches contenant des xénolithes. Ces roches contiennent de l'argon hérité.

Les travaux de KRUMMENACKER (1970), à l'aide du rapport 38 Ar confirment la composition de l'argon de contamination.

CASSIGNOL et al. (1978, 1982), à l'aide d'un spectromètre de masse n'ayant jamais vu d'étalon d'argon 38, vérifient que le rapport 38 Ar/ 36 Ar des roches d'âge zéro est identique au rapport atmosphérique, aux erreurs instrumentales près.

3.2.2. Mesures au spectromètre de masse.

La cellule du spectromètre de masse est vidée. On y introduit l'échantillon. L'argon 40 et l'argon 36 sont mesurés (100 mesures de chaque en général).

L'argon de l'échantillon est remplacé par de l'argon atmosphérique introduit dans les mêmes conditions de pression : on peut en effet, grâce à un volume variable, obtenir le même signal que celui de l'échantillon. Le taux d'argon radiogénique est déduit de la comparaison des rapports isotopiques.

T % =
$$\frac{\text{Re} - \text{Ra}}{\text{Ra}}$$
 X 100 Re = Rapport isotopique de l'échantillon

Ra = Rapport isotopique de l'argon atmosphérique

On mesure ensuite une dose d'argon calibrée grâce à l'étalon Gl-O. Sa comparaison avec l'échantillon permet de connaître le nombre d'atomes 40 dans celui-ci. Avec le taux d'Ar*, on connaîtra le nombre d'atomes d'argon radiogénique.

L'isotope 40 étant environ 300 fois plus important que l'isotope 36, il est important de connaître son influence sur la forme du signal de ce dernier. En effet, il peut provoquer des artefacts positifs ou négatifs

sur la ligne de base de l'isotope 36. Pour connaître la valeur de la ligne de base du Ar, on envoie de l'argon 40 dans la cellule du spectromètre de masse, sous pompage dynamique. Grâce à une vanne-fuite réglable, le signal de l'argon 40 est choisi identique à celui de l'échantillon. Le peu d'argon 36 restant dans la cellule ou la ligne est préférentiellement pompé. Ainsi, on a le niveau de la ligne de base du Ar en présence du signal du Ar.

La relation entre hauteur du signal et nombre d'atomes introduits n'est pas une simple proportionnalité : la réponse du spectromètre varie avec la pression régnant dans la cellule. On y introduit des doses d'argon atmosphérique. On construit ainsi le diagramme de linéarité (fig. 20). Les valeurs de l'échantillon et de la dose calibrée sont portées sur cette courbe. Le nombre d'atomes de l'échantillon sera connu par extrapolation parabolique. La précision obtenue sera meilleure que le pour cent.

Toutes les données sont directement traitées par ordinateur.

Remarque : puisque la réponse du spectromètre de masse varie en fonction de la pression dans la cellule, la mesure de l'échantillon s'accompagne obligatoirement de la mesure de l'argon atmosphérique.

3.3. Précision de l'analyse d'argon.

Trois sources d'erreurs sont possibles :

- sur la mesure du potassium (K);
- sur la calibration (Cal) :
- sur le taux d'Ar* (T).

on peut écrire :

$$\frac{\sigma^2 \hat{a}ge}{\hat{a}ge^2} = \left(\frac{1-T}{T}\right)^2 \frac{\sigma^2 Ar}{Ar^2} + \frac{\sigma^2 Cal}{Cal^2} + \frac{\sigma^2 K}{K^2}$$
(1)

L'erreur sur la calibration est de 0,5 % (erreurs sur les mesures de G1-0, CASSIGN.OL et al., 1977).

L'erreur sur la mesure du potassium est de 2 % .

L'erreur sur le pourcentage d'Ar* est calculée :

$$\left(\frac{1-T}{T}\right)^2 \cdot \left(\frac{r^2 Re}{Re^2} + \frac{r^2 Ra}{Ra^2}\right) \tag{2}$$




Fig. 20 . Réponse du spectromètre de masse en fonction de la pression régnant dans la cellule (linéarité).

Re = Rapport isotopique de l'échantillon

Ra = Rapport isotopique atmosphérique

Grâce à la régularité des mesures, et à la collection simultanée, l'erreur sur le taux de Ar* correspond à l'erreur sur les rapports isotopiques, et essentiellement sur le ³⁶ Ar. La précision sur le 36 Ar est moins bonne que sur le Ar, puisqu'il est au moins 300 fois moins abondant. Le rapport signal/bruit de fond est pour le 36 de 1 000 ; le bruit de fond est d'environ 0,03 mV, le Ar se mesure sur 30 mV (le Ar sur 10 V).

La précision sur le signal de ⁴⁰Ar est de quelques dix millièmes, celle sur le ³⁶Ar reste meilleure que le millième.

De plus, $\frac{40_{Ar}}{36_{Ar}}$ ech $\frac{20_{Ar}}{36_{Ar}}$ atm. dans le cas des roches jeunes

(2) devient
$$\sqrt{2\left(\frac{100 - Ar*\%}{Ar*\%}\right)} \times \% \text{ erreur } \frac{40}{36}$$
 (3)

Des mesures d'argon faites à la même pression montrent une précision à 0,11 % près sur le rapport isotopique (2 °) (260 $^+$ 0,5 par exemple). L'erreur sur la mesure du taux d'Ar* correspondant à l'erreur faite sur la correction de la contamination : (Re – Ra)/ Re x 100, celle-ci est égale à 0,15 % ($\sqrt{2}~(\mbox{Ra})^2$) , ce qui correspond à une limite de détectabilité à 0,15 % d'Ar*.

Cette erreur est l'erreur principale dans le cas de laves très jeunes, et donc très contaminées.

Le tableau (n° 6) exprime l'erreur absolue faite sur l'âge en fonction du taux d'Ar*. Sur le diagramme (fig. 21) en abcisse l'erreur sur l'âge et en ordonnée le taux d'Ar*, on constate que l'erreur absolue tend vers $\stackrel{+}{-}$ 2,06 %, quand le taux d'argon radiogénique devient \gg à 10 %. (composition de l'erreur absolue sur le potassium ($\stackrel{+}{-}$ 2 %) et sur la calibration ($\stackrel{+}{-}$ 0,5 %).

La limite de détectabilité de 0,15 % d'argon radiogénique correspond typiquement à un âge de 5 000 ans d'un basalte à 1 % de potassium normalement contaminé (c'est-à-dire quelques 10 atomes d'argon/g d'échantillon). Dans tous les cas, le blanc d'analyse (manipulation effectuée avec un creuset vide) est de 1 X 10 atomes d'argon, c'est-à-dire que même pour un échantillon non contaminé, la limite de détectabilité sera d'environ 10 atomes d'argon radiogénique.

% Ar*	1 %	: : : 2 %	: : 5 %	: : 10 % :	: : 15 % : : :	20 %
Sur calibration : (%) (1) :	0,5	: : : 0,5 :	: : : 0,5 :	: : : 0,5	0,5	0,5
Sur potassium : (%) (2) :	2	: : : 2 :	: : : 2 :	: : : 2	2	2
Total (1)+(2) : (%) :	2,06	: 2,06 :	: 2,06 :	: 2,06 :	2,06	2,06
Sur % Ar* (3) : (%) :	20	: : : : 10	: : : 4	: : : 2,00	1,33	1
Sur âge : $\sqrt{(1)^2 + (2)^2 + (3)^2}$: (%)	20,10	10,21	: : : 4,5 :	2,87	2,45	2,29

Tableau 6

Erreurs absolues sur les âges en fonction du pourcentage d'Ar*.




Fig. 21 . Erreur sur l'age en fonction du taux d'argon radiogénique.

3.4. Traitements des échantillons.

A partir des données décrites dans les paragraphes précédents , on peut affirmer que toute dispersion supérieure à 0,15 % dans les mesures des rapports isotopiques d'un échantillon doit être recherchée dans la roche elle-même, ou dans sa préparation.

3.4.1. Excès d'argon - Préparation des échantillons.

Les problèmes dus à l'excès d'argon peuvent être résolus en enlevant les phénocristaux et les xénolithes des échantillons. Seule la mésostase est conservée (CASSIGNOL et GILLOT, 1982).

Le basalte de la coulée du Puy de la Vache (Massif Central), prélevé à Saint-Saturnin, a donné 30 000 $^{\pm}$ 6 000 ans sur roche totale. Une fois les phénocristaux d'augite enlevés (5%), il donne 12 000 $^{\pm}$ 6 000 ans.Un âge obtenu sur bois brûlé par 1 C donne 7 800 ans $^{\pm}$ 300 . (CASSIGNOL et al., 1982).

De même, sur une vieille coulée de la Chaîne des Puys, prélevée à Egaules, la roche totale donne un âge variant de 110 000 à 380 000 ans. La mésostase donne un âge de 75 000 $\frac{1}{2}$ 8 000 ans, avec une dispersion des mesures ne dépassant pas la fourchette d'erreur (CASSIGNOL et al., 1982).

L'argon hérité se trouve dans les phénocristaux et dans les enclaves (CURTIS, 1966, DAMON, 1967, DALRYMPLE, 1969, MAC DOUGALL, 1969, KRUMMENCHER, 1970, GILLOT et al., 1982, CASSIGNOL et al., 1982). La mésostase et les minéraux formés tardivement, (sænidine) ne contiennent pas d'argon hérité. Dans le cas des xénolithes, l'argon provient de la désintégration du K de la roche d'où est tirée l'enclave. L'argon hérité des phénocristaux proviendrait de la désintégration K dans les chambres magmatiques. Il régnerait ainsi dans ces chambres de fortes pressions partielles d'argon, favorisant son piégeage dans les minéraux.

Le tri de la mésostase s'effectue sur la fraction 250 -500 de la roche totale, à l'aide de liqueurs denses (bromoforme ou di-iodométhane). Leur emploi n'influe pas les mesures (cf. paragraphe 3-6).

3.4.2. Conditions de prédégazage.

Le but du prédégazage est d'obtenir un échantillon le moins contaminé possible. L'argon de contamination est plus rapidement mobilisable que l'argon radiogénique lors d'un étuvage. Les températures de chauffage pratiquées peuvent atteindre 250°C. Deux phénomènes peuvent se produire lors d'un étuvage.

3.4.2.1. Fractionnement isotopique de l'argon de contamination.

MAC DOUGALL (1976) étuve les mêmes roches (laves mio-pliocènes d'Islande) à 100 et 250°C. Les échantillons étuvés à cette dernière température donnent des âges trop élevés, non reproductibles, avec des écarts de 10 % entre les taux d'Ar*. Les mêmes échantillons, étuvés à 100°C. donnent des résultats reproductibles. L'étuvage est donc responsable de la dispersion des résultats.

En effet, l'argon 40 et l'argon 36 n'ont pas le même comportement vis-à-vis de la température de prédégazage. Il y a départ préférentiel d'argon 36 lors du chauffage de l'échantillon. Ce phénomène tend à enrichir préférentiellement le milieu en isotope 40, et donc à le vieillir artificiellement (MAC DOUGALL, 1976, BAKSI, 1974, GOURINARD, 1975).

3.4.2.2. Départ de l'argon radiogénique.

ODIN et al. (1976) observemque le minéral-étalon Gl-0, chauffé à 250 - 300°C pendant 15 heures, perd de l'argon radiogénique : 20,9 10 cc/g de roche au lieu de 24,8 10 cc/g normalement.

CASSIGNOL et GILLOT (1982) observent qu'un départ d'argon radiogénique peut se produire lors d'un étuvage : le même échantillon (basalte microlitique), chauffé à 200°C, ou laissé à la température ambiante, donnera des âges différents : 1,7 Ma et 2,3 Ma, alors que le rapport isotopique 38Ar/36 Ar est dans les deux cas de composition atmosphérique.

Au C. F. R., le spectromètre de masse est capable de détecter des taux d'argon radiogénique très faibles (0,15 %). Le choix s'est alors porté sur un prédégazage à la température ambiante .Ainsi la composition isotopique de l'argon de contamination est-elle moins sujette à caution.

3.5. Manipulations mode opératoire.

Huit modules peuvent être fixés sur la ligne de prédégazage.

Un module est constitué par (fig.22)

- un four cylindrique en verre, contenant le creuset en molybdène dans lequel l'échantillon sera placé (poids maximal : 20 grammes).
 Un creuset ne sert qu'une fois ;
- un doigt de silice contenant des grains de charbon actif et un autre du titane
- un dispositif nommé "queue de cochon", qui servira lors de la mesure du spectromètre de masse ;





Fig. 22 . Schéma d'un module. Stade du prédégazage. (d'après CASSIGNOL et al. 1978)

Fig. 23 . Schéma d'un module.

Stade de la fusion de l'échantillon. (d'après CASSIGNOL et al., 1978)



- une tubulure en verre assemblant le tout, et pourvue de rétrécissements servant à séparer les différentes parties du module après leur utilisation.

3.5.1. Prédégazage. (fig. 22)

Les modules sont montés sur la rampe de prédégazage. Les charbons sont portés à 500°C pendant 24 heures, puis les titanes sont portés à 900°C. Ceci ne se fait pas simultanément pour éviter de contaminer les titanes par ce qui sort des charbons. L'échantillon est prédégazé à la température ambiante. La ligne elle-même est étuvée pendant toute l'opération.

Quand le prédégazage est terminé, avant de séparer les modules de la ligne (soudure 1), le pompage par diffusion est isolé, le vide est parachevé par cryopompage sur charbon actif. Il permet d'assurer un vide propre puisqu'il n'utilise pas de fluide moteur. Il consiste en un doigt de silice dans lequel est placé du charbon actif, porté à la température de l'azote liquide.

3.5.2. La fusion. (fig. 23)

Le four en verre contenant le creuset est placé à l'intérieur d'une boucle d'induction reliée à un générateur haute-fréquence. Le charbon actif est plongé dans l'azote liquide. Il recueillera les gaz relâchés par l'échantillon pendant sa fusion. Le titane reste à la température ambiante. A la fin de l'opération, on sépare le four du reste du module (soudure 2).

3.5.3 Purification (fig. 24)

Le titane est placé dans le four à 850°C, le charbon est porté à la température de 350°C et relâche tous ses gaz. Les gaz actifs vont être piégés par le titane à 850°C; en se refroidissant, celui-ci piège l'hydrogène. Cette opération dure une heure en général.

A la fin de la purification, on sépare le doigt de titane du reste du module (soudure 3), alors que le charbon actif est placé dans l'azote liquide.

3.5.4. Mesures au spectromètre de masse. (fig. 25)

Les modules sont rassemblés par peigne de 8 unités. Celui-ci sera monté sur la rampe d'introduction au spectromètre de masse. La portion de rampe où sont montés les peignes est étuvée pendant une nuit sur getters.





Fig. 24 . Schéma d'un module.

Stade de la purification. (d'après CASSIGNOL et al., 1978)

Fig. 25 . Schéma d'un module.

Stade de la mesure
(d' après CASSIGNOL et al., 1978)



Le résidu d'argon est ensuite éliminé par pompage à diffusion, et parachevé par cryopompage.

3.5.4.1. Description de la rampe d'introduction. (fig. 26)

Derrière la vanne 10 (V10), se trouve la portion de rampe où sont montés les peignes (M).

La vanne 12 donne accès au système de pompage dynamique (pompe à diffusion d'huile : DP, pompe à palettes : MP. La vanne V2 donne accès au spectromètre de masse MS, avec sa pompe cryogénique (FACT), et la vanne V3 au volume variable (VV).

Derrière V4 et V5, deux doigts de silice contiennent des charbons actifs (C1 et C2), et derrière V11, la pompe cryogénique C3.

Enfin, derrière V8, V9 et W sont placées diverses bonbonnes.

- Blet B2 sont les bonbonnes d'argon atmosphérique, pipetté en quantité donnée, mais différente pour chacune d'elles grâce aux doubles vannes W1 et W2;
- le dispositif de la bonbonne Elpermet de prélever l'atmosphère du laboratoire et de purifier des quantités constantes d'argon. La bonbonne E2, qui contient de l'argon atmosphérique, permet d'introduire directement dans la rampe d'introduction une quantité connue d'argon. La bonbonne E2 est remplie grâce au dispositif de E1;
- la bonbonne A contient l'argon 40 qui servira lors de l'établissement du niveau de la ligne de base de l'argon 36.

 $\frac{\text{Remarque}}{\text{de lignes}}: \text{Des getters, } (\textbf{g}_1 \text{ à } \textbf{g}_{13}), \text{ sont placés dans toutes les portions} \\ \frac{\text{de lignes}}{\text{de plus bas possible.}}$

Le pompage final de la ligne d'introduction est toujours terminé par un pompage cryogénique, pour les raisons invoquées au paragraphe 3.5.1. La cellule du spectromètre est elle aussi équipée d'un dispositif de cryopompage (fig. 27). Il permet de vider complètement la cellule du spectromètre en vingt secondes. On introduit le gaz à mesurer immédiatement après, par une vanne à voie de 20 mm (V2). Cette vitesse de manoeuvre permet de laisser vide le spectromètre de masse le moins longtemps possible, et de limiter l'évolution de la mémoire. (cf. paragraphe 3.1.2.3) Les pompes cryogéniques sont régénérées en les réchauffant sous pompage à diffusion. Cela se fait à chaque changement de peigne.




Fig. 26 . Schéma de la rampe d'introduction. (CASSIG NOL et GILLOT, 1982)

Légende:

MS spectromètre de masse ; FACT:pompe cryogénique ; VV:volume variable . B et E : bonbonnes ;C: doigts de silice contenant du charbon actif ;


A: bonbonne d'argon 40;

V:vannes ; W:doubles .vannes ;TV : vanne-fuite réglable; DP:pompe à diffusion d'huile; MP:pompe à palettes;

M: modules;

g:getters -

Fig. 27 . Dispositif de cryopompage de la cellule du spectromètre de masse. (d'après CASSIGNOL et al., 1978)



3.5.4.2. Mesures.

La portion de rampe où se situent les peignes est isolée (V10), la queue de cochon cassée, et les gaz libérés continuent d'être purifiés par les getters. Le reste de la rampe d'introduction est soumise à un cryopompage.

Puis, on isole les parties de rampe ne servant pas (V9, V3, V2, V8, V11, V12, V5) pendant le temps que les gaz vont être attirés sur charbon actif. Pour ce faire, on ouvre V10. Le gaz va être attiré par le charbon actif C1 placé dans l'azote liquide (99 % des gaz sont attirés). Le reste du gaz va être attiré par le second charbon actif C2 mis en service cinq minutes après le premier.

L'hélium est alors éliminé (cf. paragraphe 2.2). Les charbons actifs C1 et C2 restent dans l'azote liquide. On ouvre alors la vanne V12 (pompage dynamique), pendant 5 minutes. L'hélium est pompé. Comme d'habitude, on finira sur le pompage cryogénique. On répète cette opération deux fois.

Le gaz est alors prêt pour la mesure. On a vérifié auparavant que toutes les parties de la rampe avaient été soumises au cryopompage.

On introduit en général le gaz dans le spectromètre de masse en utilisant le petit volume, (V6, W, V9, V2) en se réservant la possibilité d'une introduction dans un volume plus grand, en ouvrant V6 vers le volume compris entre V9, V10, V11, V12, ou voire de procéder par détentes successives. Ces manoeuvres ne provoquent pas de fractionnement isotopique.

L'introduction des gaz dans la cellule se fait par la vanne V 2, et l'équilibre est immédiat. La mesure commence après celle-ci, la cellule est vidée par cryopompage (FACT). L'argon atmosphérique est pipetté de B1 ou B2 par les doubles vannes. La hauteur du signal de l'argon 40 est alignée sur la valeur de l'argon 40 de l'échantillon grâce au volume variable.

La dose calibrée pipettée de E2 et étalonnée grâce au minéralétalon gl-O, est introduite dans le même volume que l'échantillon, ce qui permet la comparaison directe de signaux d'argon 40. Pour cette comparaison on tient compte de la réponse du spectromètre de masse pour des doses pipettées de B1 ou B2 et introduites successivement (linéarité).

3.6. Exemples comparant deux méthodes géochronologiques appliquées aux âges jeunes : le ¹⁴C et la thermoluminescence.

3.6.1. Comparaison avec le 14 C. âges zéro.

Des datations sont faites sur mésostase ou sur minéraux (sanidine ou leucite) de roches d'âge historique ou datées par ¹⁴C. (GILLOT et al., 1982. tableau 7)

Les résultats révèlent la bonne concordance entre les deux méthodes. La validité des procédures employées (prédégazage de l'échantillon à la température ambiante, tri de la mésostase...) est mise en évidence par les résultats sur les âges zéro.

3.6.2. Comparaison avec la thermoluminescence. (tableau 8).

GUERIN et al. (1981) ont comparé les âges obtenus grâce à la thermoluminescence et au potassium-argon, sur les laves du Mont Dore et du Cézallier. Les résultats sont résumés sur le tableau 8. Les coulées 30 R et 30N, datées par les deux méthodes, ont donné des âges très concordants, ce qui a permis aux auteurs d'utiliser la moyenne des deux résultats.

4. RESULTATS

4.1. Mesures des âges zéro.

Avant de commencer l'étude chronométrique d'une province volcanique, il est nécessaire de déterminer la précision que l'on peut espérer obtenir des matériaux échantillonnés.

Dans le Sud de la Basse-Terre, l'abondance des pyroclastites marquant la chaîne andésitique de Bouillante et le début du cycle éruptif récent, et l'absence de repères chronologiques nous ont conduit à savoir s'il était possible de dater les ponces.

Des mesures ont été faites sur des échantillons d'âge zéro ou datés par ¹⁴C par l'intermédiaire de bois brûlés (ponces du XVIe siècle, ponces du Carbet datées à 20 000 ans). L'argon analysé dans les ponces du XVIe siècle est de moins de 0,15 % (limite de détectabilité). Toutefois, la grande quantité d'argon total que contiennent ces ponces ne permet pas d'espérer une grande précision sur l'âge : la limite d'analyse est de ¹/₂ 65 000 ans pour le taux limite de 0,15 % d'argon radiogénique. De plus, dans ce cas de ces échantillons contaminés et vésiculaires, de petits effets de fractionnement sont toujours à craindre lors du prédégazage, l'argon 36 étant plus labile que l'argon 40. Cela rend les mesures illusoires, surtout dans la période de temps où elles sont supposées s'être mises en place (500 000 - 35 000 ans).

V	Matériel (% K)	40 Ar* (%) (± 0,2)	10 ¹⁰ at.g-1	Age K.Ar Milliers d'années	Age connu (années)
Α	Mésostase (6,00)	0,04	< 3,2	<5,1	1302 AD
	1100000000 (0,00)	0,00	< 2,5	<4,0	1302 AD
	Sanidine (9,00)	0,18	1,1	1,2 + 1,3	
		0,00	< 1,3	<1.5	
В	Sanidine (10,55)	0,90	3,6	3,3 + 0,8	$3,700 \pm 200^{14}$ c
		1,18	4,7	4,2 ± 0,8	
C	Sanidine (10,54)	10,43	17,0	15,4 + 0,7	entre 11 000 et
		8,80	15,5	14.1 ± 0.7	12 000 a (¹⁴ C)
		3,55	16,7	15,1 + 0,9	12 333 4 (3)
D	Sanidine (11,19)	8,90	40,7	34,8 + 0,9	entre 28 000 et
	2 2	9,70	39,8	$34,0 \pm 0,9$	35 000 a ¹⁴ C
E	Mésostase (5,00)	0,05	<2,1	<4.0	1944 AD
	Leucite (15,00)	0,00	<7,9	<5,0	
F	verre (5,00)	0,00	<1,1	<2,0	autour de 1,400a BP
		0,08	<1,6	<3,0	
G	Mésostase (5,00)	0,25	0,8	$1,5 \pm 1,2$	flanc du Volcano
		0.29	0.9	1,7 + 1,2	moderne
	Sanidine (10,00)	0,00	<1,6	<1,5	
H	Mésostase (4,03)	0,20	2,1	$5,0 \pm 5,0$	Base du Stromboli
	2 6 A	0,25	2,7	6.5 ± 5.0	moderne
I	Mésostase	0,00	<1,1	<7,0	1971 AD
J	Mésostase	0,00	<0,8	<5,0	XVe siècle AD.
K	Mésostase	0,60	1,9	13.0 ± 4.3	7 800 ± 300 ¹⁴ c
		0.35	1.3	9.5 + 5.4	, 1000 P

A:coulée d'Arso(Ischia).B:dôme trachitique de Caprara, Champs Phlégréens. C:niveau de ponces corrélé avec le Tuf Jaune Napolitain, Champs Phlégréens. D:ignimbrite campanienne.E:coulée de 1944 du Vésuve.F:Obsidienne, Lipari. G:coulée trachitique du flanc sud du Volcano moderne, îles éoliennes. H:coulée de shoshonite de la base du Stromboli moderne.I:coulée de l'Etna de 1971.J:coulée du VI°siècle de l'Etna.K:coulée du Puy de la Vache Massif Central.

Tableau 7 .Comparaisons entre âges ¹⁴c , données historiques et âges potassium-argon.(GILLOT et al.,1982)

Analyses par spectrométrie y

	U (10-6)	Th (10 ⁻⁶)	K (%)
30 R	2,03±0,10	7,38±0,40	1,54±0,06
30 N	$2,19 \pm 0,10$	7,71+0.42	1.58 ± 0.06

Ages « thermoluninescents :

Paléodose (krad)	D _e . (mrad/an)	D _g (mrad/an)	D ₇ (mrad/an)	Age B.P (10 ³ ans)
30 R 19,71 ± 1,28	134,8 ± 22,5	7 178,6±5,3	100,0±2,8	46,0± 3,9
30 N 23,40± 1,25	152,7 ± 23,5	184,5±5,3	104,0±2,9	51,3 ± 4,1
	Ages « potas	sium-argon »	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1	2	3	4
K(%)	40Ar(%)	40Ar (10 ¹⁰ at.g ⁻¹)	Ages (10 ³ ans)	Ages moyens
30R* 1,65±0,10	{ 1,7	7,98	46,3 ± 5,4	45,8± 4,5
1,00 ±0,10	2,0	7,82	45,4± 4,5	8
30 N* 1,65 ± 0,06	§ 1,7	9,05	52,8 ± 6,1	$51,9 \pm 4,4$
30	1,6	8,74	51,0± 6,3	

Tableau 8 .Comparaisons entre âges obtenus par thermoluminescence et âges obtenus par potassium-argon.(GUERIN et al.,1981).
30 R,30 N : deux couleés superposées dans la vallée de la Rhue.

Le même test a été effectué sur des coulées de laves d'âge connu par ¹⁴C (PATERNE, 1980). Il s'agit des coulées de SCHOELCHER (n° 1), L'Habituée (n° 1A), appartenant à l'épisode Madeleine supérieure, daté entre 12 700 et 8 500 BP. Les résultats obtenus sont résumés sur le tableau, ci-après :

N°	: : :Localisation: : :		nombre d'atomes ⁴⁰ Ar*/g	: : Limite de : :détectabilité: : 0,15 % Ar* : :	
1	: SCHOELCHER :	12 700 - : 8 500 ans:	2,27 10 ¹³ at.	: <0,15 % :	<35 000 ans
1A	: HABITUEE :	12 700 - : 8 500 ans :	7,38 10 ¹² at	:	<10 000 ans

La coulée de Schoelcher, très vacualaire, présente un taux de contamination plus important que la coulée de L'Habituée, massive.

Les résultats obtenus nous ont incité à ne travailler que sur des coulées de laves les plus massives possible.

4.2. Résultats.

Les \hat{a} ges des échantillons que nous avons datés sont inscrits dans le tableau 9 .

Echan- tillon	Localisation	Formation	Phase analysée	% К	% ⁴⁰ Ar*	âges (ans)
N 1105	Morne Goyavier	Cycle récent	Mésostase	1,214 %	1,345	108 000 ± 11 000 93 000 ± 9 000 100 000 ± 10 000 ans
S 1201	Carbet (3ème chute)	Pitons de Bouillante- Sans-Toucher	Mésostase	1,006 %	3,76 5,55	132 000 ± 6 000 127 000 ± 4 500 129 000 ± 5 000 ans
K 1401	Coulée du Fond Bernard	Cycle récent	Mésostase	0,926 %	4,151 3,54	149 000 ± 6 000 137 000 ± 6 000 138 000 ± 6 000
30 A	Tuf	Chaîne andésitique : de Bouillante	verre	1,624 %	11,07	334 000 ± 8 000 316 000 ± 8 000 316 000 ± 8 000 316 000 ± 8 000
24 '	Tarare- Morandais	Chaîne andésitique de Bouillante	Mésostas e	0,711 %	2,74	855 000 ± 50 000 872 000 ± 50 000 863 000 ± 50 000 ans
J 101	Pointe Vieux Fort	Monts Caraïbes	Mésostase	0,644 %	5,61 5,46	469 000 [±] 16 000 475 000 [±] 16 000 475 000 [±] 16 000 475 000 [±] 16 000
J 301	Pointe Mazarin	Monts Caraïbes	Mésostase	0,408 %	3,485	555 000 ± 26 000
E 1101	Coulée du Plessis	Pitons de Bouillante- Sans-Toucher	Mésostase	0,745 %	7,22	600 000 ± 17 000
J 1401	Morne Montval	Pitons de Bouillante Sans-Toucher	Mésostase	0,735 %	11,5 14,8	630 000 [±] 15 000 613 000 [±] 15 000 620 000 [±] 15 000 ans
J 1201	Saut d'eau du Matouba	Pitons de Bouillante Sans-Toucher	Mésostase	0,488 %	12,4 17,10	642 000 [±] 13 000 616 000 [±] 14 000 629 000 [±] 13 000 ans
D 1402a	Morne Dayi	Pitons de Bouillante Sans-Toucher	Mésostase	0,866 %	2,24	721 000 [±] 47 000 750 000 [±] 48 000 [±] 47 000 ans
D 1301	Grande Rivière des Vieux- Habitants	Pitons de Bouillante Sans-Toucher	Mésostase	0,733 %	12,92 10,72	777 000 ± 18 000 784 000 ± 19 000 792 000 ± 20 000
G 1501	Hab ita tion Grivelière	Pitons de Bouillante Sans-Toucher	Mésostase	0,583 %	22,51	955 000 ⁺ 20 000 949 000 ⁺ 20 000 944 000 ⁺ 20 000
H 1702	Morne Soldat	Pitons de Bouillante Sans-Toucher	Mésostase	0,516 %	7,14 8,36	1 030 000 ± 30 000 1 023 000 ± 25 000 1 017 000 ± 20 000 ans

Tableau 9 Ages obtenus par la méthode K.Ar

II LA THERMOLUMINESCENCE

1. INTRODUCTION

Dans l'histoire récente de la Guadeloupe, les ponces représentent une fraction très importante des produits émis et la chronologie des événements éruptifs passe par la connaissance de l'âge de ces ponces, ce qui permettrait leur corrélation.

La méthode potassium-argon ne permettant pas, dans la fourchette de temps qui nous intéresse (35 000 - 500 000 ans), de dater ces ponces, nous avons utilisé la thermoluminescence, développée au Centre des Faibles Radioactivités (C.F.R.), où des études sur des quartz ont permis des datations de coulées de laves (VALLADAS et GILLOT 1978, GILLOT et al.1978).

2. LE PRINCIPE DE LA THERMOLUMINESCENCE.

2.1. Le principe de base.

Certains minéraux, le quartz, la fluorine, le feldspath par exemple, émettent de la lumière quand on les chauffe, et quand ils ont été préalablement soumis à un rayonnement nucléaire. Au cours d'une seconde chauffe, ils n'émettent plus de lumière, mais en émettent à nouveau, après une nouvelle irradiation. Ce phénomène est appelé thermoluminescence.

Dans la nature, les roches sont continuellement irradiées par les radioéléments qu'elles contiennent, l'uranium, le thorium et leurs descendants, et le potassium 40. Ces radioéléments ionisent les atomes, et les électrons libérés se fixent dans des défauts du système cristallin des minéraux (appelés pièges), d'où ils ne peuvent sortir sans apport d'énergie. Le nombre d'électrons piégés croît avec le temps, puisque le rayonnement ne cesse d'agir. Lors d'une chauffe, les électrons libérés de leur piège retrouvent les atomes qui les avaient perdus. Au cours de cette réorganisation, ils excitent des centres luminogènes. La quantité de lumière émise est d'autant plus grande que la quantité de rayonnement a été plus importante, et donc que le temps d'irradiation a été plus longe

La quantité de rayonnement reçue par le cristal est exprimée par la dose d'irradiation. Lorsque le rayonnement a perdu 100 ergs/gramme de matière traversée, celle-ci a reçu par définition un rad.

Les familles de l'uranium et du thorium émettent des rayonnements α , β et γ , et le potassium 40 des rayonnements β et γ . A cela, il convient d'ajouter les rayonnements cosmiques. Si l'on utilise les doses spécifiques délivrées par les différents rayonnements des familles radioactives et du potassium (BELL, 1979) pour calculer la dose annuelle reçue par la lave, on constate que 70 % environ de la dose reçue provient des α . Cependant, l'expérience a montré (AITKEN,1975) que ceux-ci produisent moins de thermoluminescence que les β (dix fois moins environ à dose égale). Il en résulte que la contribution des α à la dose annuelle totale ne représente que 30 %, le reste étant dû aux β , aux γ et aux rayonnements cosmiques. De plus, les α ont un parcours moyen de l'ordre de 10 β , celui des β et des γ atteignent respectivement 1 mm et 30 cm, dans des corps de densité 2,8. Les α pénétrent donc peu les gros minéraux et n'y laissent qu'une faible dose moyenne.

En évaluant par l'intensité de la thermoluminescence la dose reçue par le minéral depuis la dernière chauffe (appelée paléodose D), et en calculant la dose reçue annuellement (dose annuelle d), on peut déterminer l'âge du minéral :

$$Age = \frac{D}{d}$$

Pour les roches volcaniques, la paléodose D correspond à la dose reçue depuis leur mise en place.

La datation par thermoluminescence met en oeuvre :

- un tri du minéral et sa préparation,
- la mesure de la paléodose et le calcul de la dose annuelle.

2.2. Mesure de la thermoluminescence (TL) (fig. 28)




Fig. 28 . Schéma de l'appareil de mesure de thermoluminescence. (VALLADAS 1979)

L'échantillon est placé sur une plaque chauffante, dans une enceinte obscure. La montée en température se fait en présence d'un gaz inerte, afin d'éviter l'action de l'oxygène qui favorise la triboluminescence, laquelle résulte du traitement mécanique subi par le minéral. Un photomultiplicateur détecte les photons émis par l'échantillon, et les transforme en impulsions électriques. Les courbes de TL sont obtenues sur une table traçante XY, dont l'axe des X est associé à la température et l'axe des Y à l'émission lumineuse. La vitesse de montée en température est ordinairement voisine de 10° C/ seconde.

Seule la thermoluminescence développée à température élevée (>300°C) peut être reliée à la dose totale. En dessous de cette température, la thermoluminescence enregistrée ne correspond qu'à une fraction de la dose reçue, une partie des électrons piégés ayant été libérée spontanément au cours du temps. Ce phénomène est appelé fading thermique.

Un exemple de courbe de thermoluminescence est donné en figure 30. La courbe 1 représente la thermoluminescence naturelle (TLN) d'un échantillon de quartz. Elle présente un pic marqué vers 400°C, puis l'émission thermique du support croît rapidement au-delà de cette température ("corps noir"). Une deuxième chauffe de l'échantillon ne montre plus de thermoluminescence, et seule l'émission thermique du support se répète (courbe 2). Après une irradiation artificielle au laboratoire du même échantillon, suivie d'une nouvelle chauffe, on enregistre la courbe 3 qui montre le même pic vers 400° C que la courbe de TLN.

Le test du plateau permet de vérifier, comme on le verra plus loin, que la paléodose D est indépendante de la température à laquelle la thermoluminescence a été mesurée. Cela revient à contrôler que la thermoluminescence naturelle a bien pour origine l'action du rayonnement : la TLN a alors le même profil en fonction de la température que la thermoluminescence artificielle (TLA). Le rapport TLN/TLA est alors constant en fonction de la température. (fig 29)




Fig. 29 . Test du plateau




Fig. 30 . Courbes de thermoluminescence .

L'étude des variations de la TL avec la dose montre en général, aux faibles doses, une variation de la thermoluminescence de type parabolique, montrée par la figure $\bf 31$.




Fig. 31

Comportement supralinéaire aux faibles doses.

Ce comportement est dit supralinéaire et oblige d'ajouter à la paléodose la dose δ obtenue par extrapolation de la partie linéaire de la courbe. (FLEMMING, 1970).

3. PREPARATION DES ECHANTILLONS, MESURE DE LA PALEODOSE - CALCUL DE LA DOSE ANNUELLE.

3. 1. Choix des échantillons.

Une étude menée sur les plagioclases extraits des laves de Guadeloupe (GUERIN, PETIT,1983), a montré qu'ils ont une faible sensibilité au rayonnement, et que la TL cesse de croître à des niveaux de doses faibles (phénomène appelé saturation de la TL). Dans ces conditions, la précision d'un âge est limitée à 20 % entre 100 000 et 700 000 ans B.P. En dessous de 100 000 ans, la TL ne représente qu'un ordre de grandeur. Le choix de l'échantillonnage s'est porté sur les quartz des ponces dacitiques (cf. chapitre 1). Les trois quartz sélectionnés sont extraits des échantillons suivants :

- ponces soyeuses de la carrière Danoy (F 802 g1),
- ponces dacitiques à quartz de l'Anse des Pères (P 301a),
- ponces à quartz de Montval .

La ponce soyeuse de la carrière Danoy contient des quartz automorphes, bipyramidés, assez limpides, de dimension supérieure au millimètre. Dans les autres échantillons, les quartz sont brisés, plurimillimétriques, limpides. Les ponces présentent un aspect frais, à part celle de Montval.

3.2. Préparation des échantillons.

Pour obtenir une population suffisamment homogène, nous avons trié les quartz de dimension comprise entre 1 et 2 mm. Il en résulte un rapport assez bien défini entre la dose eta moyenne reçue par les grains, et celle régnant dans la ponce. Rappelons qu'une partie du rayonnement ne pénètre pas entièrement le grain. De plus , la contribution des ≪ est négligeable en raison de leur faible parcours.

Après un broyage doux au mortier d'agate, pour rendre négligeable la triboluminescence, seule la population 125-80 a été conservée.

3.3. Mesure de la paléodose.

3.3.1. Mesure de la thermoluminescence

- . Conditions de mesure :
 - masse de l'échantillon par mesure : 3 mg
 - vitesse de chauffe : 10 º/s
 - filtre optique : vert (λ 2550 nm)


Celui-ci permet de sélectionner un pic de thermoluminescence vers 400° C, bien défini, libre de l'interférence des pics voisins (VALLADAS, 1980). De plus, le débit de dose de la source artificielle utilisée au laboratoire (200 rad/mn) est environ 10 fois plus intense que celui de la source naturelle de l'environnement du minéral. Il a été constaté cependant qu'à dose totale égale, les thermoluminescences engendrées par la source naturelle ou artificielle sont en général égales, en particulier dans le cas où un filtre vert est utilisé.

. On effectue d'abord les mesures de thermoluminescence naturelle , puis celles de thermoluminescence de l'échantillon exposé à des doses artificielles connues qui s'ajoutent à la dose D déjà reçue (paléodose). La figure 32 montre ces courbes de thermoluminescence relatives au quartz de l'anse des Pères (P 301). Les doses artificielles ajoutées à la paléodose D sont résumées dans le tableau ci-dessous :

	İ	Carri	ère	Da	noy	:	Anse	des	Pě	ères	: -:	Morne	Mon	tval
doses	L- !					:					:			_
(krad)	-	7.6	; 1	5;	30	:	7,6	; 15	;	30	:	10	; 2	U
(KI dd)	ì	52 * 000		-		:					:			

.Ccurbes de thermoluminescence relatives au de l'anse des Pères.
.Test du plateau sur la mesure de thermolumi du quartz de l'anse des Pères.
.Mesure de la paléodose (anse des Pères). Fjg.

33 Fig.



. Le test du plateau étant positif, (figure 33), il est possible de construire le diagramme exprimant la TL en fonction de la dose (figure 34). On constate que l'intensité de la TL varie linéairement avec la dose, ce qui veut dire que le seuil de saturation n'est pas atteint ; donc une extrapolation linéaire est possible pour trouver la paléodose D.

3.3.2. Mesure de la supralinéarité.

A l'échantillon chauffé une fois sont appliquées des doses croissantes. Les courbes obtenues sont analogues à celles de la figure 32 . Le diagramme TL en fonction de la dose permet de connaître la dose δ . (figure 34)

3.3.3. Résultats

Les diagrammes 34,35 et 36 montrent respectivement les déterminations des 3 quartz étudiés, tenant compte de la correction δ . Les résultats sont rassemblés sur le tableau n° 10

	Ponces soyeuses de la Carrière Danoy F 802 g1	Ponces dacitiques: à quartz de 1'Anse des Pères P 301	Poncesà quartz de Montval 13
D	: 32 krad	: 11,2 krad	12,7 krad
8	4 krad	4 krad	: 3 krad
D +8	36 [‡] 2 krad	: 15,2 ⁺ 1 krad	: 15,7 ⁺ 1,0 krad

Tableau nº 10 - Paléodoses


3.4. Calcul de la dose annuelle .

Elle consiste en la détermination de

- d (dose interne), représentant l'action des rayons de faibles parcours (α et β)
- d (dose externe), représentant l'action des rayons y et des rayons cosmiques.

La dose totale est $d = d_i + d_e$.

Nous allons détailler le calcul pour l'échantillon de l'Anse des Pères.



3.4.1. Calcul de la dose interne di.

Elle va être calculée à partir des concentrations mesurées des radioéléments de la roche.

. La dose eta moyenne reçue par un grain s'exprime par :

$$d \rho = N_U \cdot d_U^{\beta} \cdot [U] + N_{Th} \cdot d_{Th}^{\beta} [Th] + N_K \cdot d_K^{\beta} \cdot [K]$$

N, N_{Th} et N_K sont les facteurs permettant de passer de la dose β moyenne dans la matrice à la dose β moyenne reçue par le grain de quartz. Par exemple, on a pour des grains supposés sphériques de diamètre moyen 1,93 mm, N_L = 0,456, N_{Th} = 0,447 et N_K = 0,429. Comme les grains ne s'éloignent pas d'une forme sphérique, l'erreur dépendant de l'hypothèse sphérique est pratiquement négligeable.

U, Th et 40 K. d $^{\beta}_{Th}$, d $^{\beta}_{K}$ sont les doses annuelles émises respectivement par

[U], [Th] et [K] sont les concentrations en U, Th et K de la roche.

Le bilan des doses annuelles spécifiques figure sur le tableau n° 11 , ci-après :

Tableau 11 Doses annuelles spécifiques (in BELL, 1979)

		Doses (mrad/an)	
	d ^d	: a/3 :	d X
U/ppm :	278,3	14,62	11,48
Th/ppm :	73,8	2,86	5,14
K/%		83,07 :	24,92

Les doses émises par U et Th ont été calculées dans le cas où le seul élément gazeux des deux chaînes radioactives, le radon, reste piégé dans la roche.

Pour vérifier cette hypothèse, U et Th ont été dosés selon deux méthodes différentes :l'activation neutronique et la gammamétrie.

En effet, comparer les résultats obtenus nous indique l'état de déséquilibre des deux chaînes, l'activation neutronique dosant directement ces éléments, tandis que la gammamétrie les dose par l'intermédiaire des éléments de fin de chaîne, qui représentent 95 % de la dose % totale dans le cas de l'uranium, et 65 % dans le cas du thorium. Le potassium a été dosé par absorption atomique et par gammamétrie. Les résultats obtenus sont donnés par le tableau 12.

- 5								
			_ 3			:		
	Gar	mmamétrie		Activit	té Absorption	: Moye	nnes pond	lérées
				neutroni	que atomique	:		
		: :		:	:	:	:	:
	U ppm	: Th ppm:	K % :	U ppm :	Th ppm: K %	: U ppm	: Th ppm	: K %
		:	:	:	:	:	<u> </u>	:
D 201		:	:	:	:	:	:	:
P 301a	:	:	:	0,78 :	3,00 : 1,15	:	:	:
	:	:	:	. :	· :	:	:	:
Anse des Pères	:	:	:	10 %:	10 % : 2 %	.		:
		:		:	:		:	:
E 000-1		:	:	:	:	:	:	:
F 802g1 :	1 :	3,2 :	1,2 :	0,88 :	2,85 : 1,33	: 0,96	: 3,12	: 1,3
Carrière :			:	:	* *	:	:	:
Danoy :	(7%):	(7 %):	(5 %):	(10 %):	(10 %):(2 %)	:(5,7 %)	:(5,7 %)	:(1,85 %)
	:	:	:	:		:	:	:
12	:	:	:	:		:	:	:
	1,13 :				: 1,13	:		: 1,137
Montval :	(8,4 %):	(6%):	(5 %):	:	:(2 %)	:		:(1,85 %)
	:	:	:	:		:	:	:

Tableau nº12

Concentrations de U, Th, K des trois échantillons avec leurs erreurs (%)

Le fait que la concentration obtenue par gammamétrie soit compatible avec celle obtenue par activation neutronique permet de conclure que le radon est resté piégé dans la roche.

La dose/3 moyenne pour le quartz de l'anse des Pères est égale à d = 14,62 X 0,78 + 2,86 X 3 + 83,07 X 1,15 = 115,5 mrad. A cause du diamètre moyen des grains de quartz égale à 1,93 mm, d $_{\beta}$ se réduit à 49,97 mrad.

. La dose émise par les particules α est négligeable en raison de leur parcours petit par rapport à la taille des grains.

3.4.2. Calcul de la dose externe d.

La dose reçue par les grains est

$$d_{\chi} = d_{U}^{\chi} \cdot [U] + d_{Th}^{\chi} \cdot [Th] + d_{K}^{\chi} \cdot [K]$$

où d $_U^\chi$, d $_{Th}^\chi$ et D $_K^\chi$ sont respectivement les doses annuelles émises par les radioéléments U, Th, K.

$$d_{\chi} = 11,48 \times 0.78 + 5,14 \times 3 + 24,92 \times 1,15 = 53,03 \text{ mrad}$$

La concentration des rayons cosmiques varie en fonction de la latitude, de l'altitude, de la profondeur du prélèvement (PRESCOTT et al., 1982). A la profondeur où ont été prélevés les échantillons (2 1m) et au niveau de la mer, les rayons cosmiques apportent une contribution de 13 mrad par

Le tableau 13 indique les valeurs des doses annuelles reçues par les échantillons.

		υ :	Th :	к :	dose totale mrad
P 301 a :	dose g	5,19		40,98	49,97
Ø = 1,93 :	dose y	8,95	15,42	28,66	53,03
:	rayons : cosmiques :		13		13
	Total		***************************************	2	116
F 802g ₁	dose g	8,25	: : 5,21	65,44	: 78,89 :
Ø = 1,27	dose y	11,02	: 16,03	32,39	59,44 :
mm	: rayons : cosmiques :		15		: : 15
	: Total				153,68
	: dose β	*** TENER TO SERVE	: : 5,96	: : 47,88	: : 62,35
13	:	12,97	: 21,07	28,33	: 62,37 :
Ø = 1,57 mm	: rayons :cosmiques		20		20
	Total	: :			: : 144,72

Doses annuelles reçues par les échantillons, exprimées en Tableau 13

*La variation en fonction de la latitude est négligeable dans cette région.

3.4.3. Effet de l'imprégnation en eau dans le calcul de la dose annuelle.

Jusqu'à présent, nous avons supposé les ponces sèches. Mais, si elles contiennent de l'eau, l'action des rayonnements est modifiée. Il faut alors appliquer la formule suivante : (ZIMMERMAN, 1971)

dose dans échantillon sec dose dans échantillon humide = $\left[\begin{array}{c} \underline{\text{poids humide}} \\ \underline{\text{poids sec}} \end{array} - 1 \right] \times Q + 1$

où $\alpha = \frac{M \text{ eau } (g/\text{cm}^2)}{M \text{ éch. sec } (g/\text{cm}^2)} = 1,14 \text{ dans le cas des rayonnements }$

M = coefficient moyen d'absorption

et où
$$\alpha = \frac{\begin{bmatrix} dT \\ dx \end{bmatrix}_{eau} (g/cm^2)}{\begin{bmatrix} dT \\ dx \end{bmatrix}_{ech. sec}} = 1,25 dans le cas des rayonnements (3)$$

 $\frac{dT}{dx} = \text{perte spécifique d'énergie moyen-}$

Les variations de la valeur « exprime, l'influence de l'hydrogène de l'eau. En effet, l'hydrogène a un rapport $\frac{Z}{\Lambda}$ = 1, sensiblement égal à la moitié de celui des éléments lourds contenus dans la roche.

Les ponces ont été prélevée; sèches. Cependant, au cours d'un essai de porosité dans un porosimètre à eau, leur masse a augmenté de la moitié de la masse sèche.

Leurs conditions de dépôts correspondent à une mise en place à l'air libre. Mais, elles ont pu être temporairement immergées au cours de période de transgression.

Ce phénomène est connu aux Petites Antilles. Il peut avoir deux origines :

- le niveau de la mer varie plus ou moins régulièrement avec des amplitudes plus ou moins fortes pour des raisons climatiques : à la Barbade, (fig. 37), BROECKER et al. (1968) ont étudié trois terrasses, datées à l'aide de coraux à 82 000,103 000 et 122 000 ans (mesure du rapport 230 Th/ 234 U). Ces données, comparées à une courbe de paléotempérature, montre une bonne coïncidence entre périodes chaudes et niveau de mer élevé (fig. 38). En HaIti, le niveau de la mer est

passé successivement de + 5m (130 000 ans) à - 10m (108 000 ans) et - 13m (80 000 ans, DODGE et al., 1983). En Guadeloupe, plusieurs terrasses ont été datées par Th/234U (HOANG C. T., BATTISTINI PETIT, communication personnelle) : à la Désirade, un niveau situé à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer a fourni un âge de 120 000 ans ± 10 000.

- En Dominique, des récifs pléistocènes affleurent entre 30 et 190 m au-dessus du niveau actuel de la mer (MARTIN-KAYE, 1960). A Saint-Eustache, des calcaires d'un âge compris entre 70 000 et 20 000 ans, affleurent à 20 mètres d'altitude. (D'ARCO, 1982). En Guadeloupe, un mince banc de calcaire affleure à plus de 150 mètres d'altitude à Thomas (carte n°11), dans la zone de la chaîne andésitique (ANDREIEFF, in GADALIA, 1983)
- Des pillows-lavas ont été trouvés sur les coulées de Trois-Rivières à l'altitude de 250 m (GADALIA, 1983).

 Ces soulèvements sont plutôt à rattacher à des mouvements dont l'origine est interne, magmatique, soit locale au niveau d'une île, soit régionale au niveau d'un ensemble volcanique. Il est alors délicat d'étendre les observations d'une île à l'autre. Cependant, les événements datés par BROECKER (1969), DODGE et al. (1983) et HOANG, d'origine climatique, et ressentis à l'échelle régionale, ont pu concerner la Basse-Terre. De plus, les pillows-lavas trouvés par GADALIA (1983) sur les coulées de Trois-Rivières attestent que l'île de la Basse-Terre a subi des mouvements eustatiques assez importants (altitude des pillows-lavas 250 m).

Nous considérons alors une immersion de l'ordre de 10 000 ans (variation du niveau de la mer d'origine climatique, fig.38); du fait de la tectonique locale, nous devons envisager une immersion de plus longue durée. Nous avons admis une période d'immersion totale de 15 000 ans ± 15 000, cette valeur couvrant l'hypothèse que la Basse-Terre n'a pas connu d'immersion, ou au contraire une immersion prolongée.

En raison de l'altitude de leur prélévement, 420 m, les ponces de Montval n'ont probablement pas été immergées. En revanche, il est plus que probable que celles de la carrière Danoy (prélevées à 40 m) et celle de l'anse des Pères (prélevées à 5 m) ont dû l'être. Dans ces deux derniers cas, les ponces auraient contenues de l'eau dont la quantité peut être évaluée par l'essai de porosité.

Les doses annuelles "humides" des ponces de l'anse des Pères et de la carrière Danoy sont données par le tableau n° 14 ci-après.




Fig. 37. Arc insulaire des Petites Antilles

1- volcans avec éruptions historiques

2-Kick'em Jenny, volcan sous marin en activité

3-Arc interne

4-Arc externe




Fig.38. Corrélations entre courbe d'ensoleillement pour l'hémisphère nord (1), température de la surface de Locéan atlantique (2), et courbe de fluctuations du niveau de l'océan.(3)

Dans Broecker et al (1968).

***	: hypothèse humide : :	: dose annuelle : (mrad) :
Ponces de l'anse des Pères	: d	: : : : 72,52
Ponces de l'anse des reres	d y 33,77	:
Ponces de la Carrière Danoy	: d	: : : : : 91,91
	: d	:

Tableau 14 Doses annuelles dans l'hypothèse humide

3.5. Résultats - discussion.

L'équation de l'âge est
$$t = \frac{b}{d}$$

Les ponces de Montval n'ayant pas été immergées, nous pouvons calculer leur âge avec la dose annuelle sèche. Nous obtenons le résultat suivant :

	D krad	:	d mrad	: : :	âge ans
Montval	: : 15,7 ⁺ 1 :	:	144,72 ⁺ 8,6	:	108 000 ⁺ 10 000 ans

Tableau.15 résultats de la mesure par TL des ponces de Montval

Dans le cas des ponces de l'anse des Pères et de la carrière Danoy, nous considérons une immersion de l'ordre de 15 000 ans \pm 15 000· Les âges obtenus sont alors les suivants :

	D krad	: d (sèche) : mrad :	: d (humide) mrad	Age dans hypothèse humide	
Anse des Pères :	15,2 [±] 1	: : 116 - 9	: 72,52	: : 140 000 ans	
: Carrière Danoy : :	36 [±] 2	: 153,7 ⁺ 7,6	91,01	24 4 000 ans	

Tableau 16 : Ages dans l'hypothèse humide

Deux sortes d'erreurs sont faites sur ces mesures :

- l'erreur systématique, que l'on fait en considérant ou non un temps d'immersion, qui est égale à la différence entre l'âge de la ponce dans l'hypothèse humide (140 000 ans) et l'âge de la ponce dans l'hypothèse sèche (131 000 ans), qui est égale à 9 000 ans.
- l'erreur statistique que l'on fait lors des mesures, qui est égale à
 14 000 ans.

Les résultats sont présentés sur le tableau 17:

	âge	: erreur : systématique :	: erreur : statistique :
Anse des Pères	: : 140 000 ans :	: : + 9 000 ans :	: + 14 000 ans
Carrière Danoy	: 244 000 ans	: + 10 000 ans	+ 18 000 ans

Tableau 17 Résultats des mesures des âges des ponces de la carrière Danoy et de l'anse des Pères par la méthode de la thermoluminescence.

Echan- tillon	Localisation	Formation	Phase anal.ysée	% К	% ⁴⁰ Ar*	âges (ans)
N 1105	5 Morne Goyavier Cycle récent		Mésostase	1,214 %	1,1345	10 8 000 ± 11 000 100 000 ± 10 000 93 000 ± 9 000
S 1201	Carbet (3ème chute)	Pitons de Bouillante- Sans-Toucher	Mésostase	1,006 %	3,76 5,55	132 000 [±] 6 000 127 000 [±] 4 500 129 000 [±] 5 000 ans
к 1401	Coulée du Fond Bernard	Cycle récent	Mésostase	0,926 %	4,151 3,54	149 000 ± 6 000 143 000 ± 6 000 137 000 ± 6 000 ans
30 A	Tuf	Chaîne andésitique de Bouillante	verre	1,624 %	11,07 9,813	334 000 ± 8 000 325 000 ± 8 000 316 000 ± 8 000 ans
24	4 Tarare- Chaîne andésitique Morandais de Bouillante		Mésostase	0,711 %	2,74	855 000 ± 50 000 872 000 ± 50 000 863 000 ± 50 000 ans
J 101	Pointe Vieux Fort	Monts Caraïbes	Mésostase	0,644 %	5,61 5,46	469 000 [±] 16 000 475 000 [±] 16 000 475 000 [±] 16 000 ans
J 301	Pointe Mazarin	Monts Caraïbes	Mésostase	0,408 %	3,485	555 000 ± 26 000
E 1101	Coulée du Plessis	Pitons de Bouillante- Sans-Toucher	Mésostase	0,745 %	7,22	600 000 ± 17 000
J 1401	. Morne Montval	Pitons de Bouillante Sans-Toucher	Mésostase	0;/735 %	11,5	630 000 ± 15 000 613 000 ± 15 000 620 000 ± 15 00
J 120	Saut d'eau 1 du Matouba	Pitons de Bouillante Sans-Toucher	Mésostase	0,488 %	12,4	642 000 [±] 13 000 616 000 [±] 14 000
D 1402	a Morne Dayi	Pitons de Bouillante Sans-Toucher	Mésostase	0,866 %	2,24	721 000 [±] 47 000 735 000 [±] 47 00 750 000 [±] 48 000
D 1301	Grande Rivière des Vieux- Habitants	Pitons de Bouillanté Sans-Toucher	Mésostase	0,733 %	12,92 10,72	777 000 [±] 18 000 784 000 [±] 19
G 1501	Habitation Grivelière	Pitons de Bouillante Sans-Toucher	Mésostase	0,583 %	22,51	955 000 [±] 20 000 949 000 [±] 20 00
Н 170	2 Morne Soldat	Pitons de Bouillante Sans-Toucher	Mésostase	0,516 %	7,14	1 030 000 ± 30 000 1 017 000 ± 20 000

Tableau 9 Ages obtenus par la méthode K.Ar

III INTERPRETATION DES RESULTATS OBTENUS PAR POTASSIUM-ARGON ET THERMOLUMINESCENCE

1. PITONS DE BOUILLANTE-SANS-TOUCHER. (fig. 39)

Les datations faites sur cette phase s'étalent de 600 000 ans à 1,02 Ma (tableau 9), et confirment ainsi la mise en place pléistocène de ce massif. Le volcanisme du Sans-Toucher marque le stade ultime de l'activité des Pitons de Bouillante-Sans-Toucher : les datations effectuées sur le Morne Montval (620 000 ans - 15 000) et la coulée du Plessis (600 000 ans - 17 000), attribuées au Sans-Toucher, le confirment. La coulée du Saut d'eau du Matouba pourrait être rattachée à ce stade ultime en raison de son âge (629 000 ans - 13 000).

Les différentes datations antérieures de la coulée du Plessis: 1,1 Ma (BAUBRON, 1974), 1,35 Ma (BELLON, 1974) et 1,3 Ma (BRIDEN, 1978) ne concordent pas avec notre mesure (600 000 ans). Il semble que cette différence puisse s'expliquer par l'échantillonnage de deux coulées différentes: il y a en effet superposition d'une coulée ancienne et d'une coulée récente, et le point d'échantillonnage de BRIDEN correspond à l'ancienne coulée.

Pour notre part, nous avons échantillonné la coulée du Plessis (coordonnées UTM 634,25 E ; 1773,8 N ; altitude 60 m) ; l'âge de celle-ci concorde parfaitement avec les données de terrain : le Morne Montval et la coulée du Plessis représentant le stade ultime d'activité des Pitons de Bouillante-Sans-Toucher, et ayant des âges voisins.

L'hypothèse de WESTERCAMP (1980), selon laquelle les ponces à quartz de la carrière Danoy et de l'anse des Pères formeraient un seul et unique niveau au début de l'épisode Sans-Toucher-Carmichaël, ne paraît pas actuellement devoir être retenue ; en effet, les deux niveaux de ponces à quartz ont donné deux âges différents à 244 000 ans (carrière Danoy) et 140 000 ans (anse des Pères), tous deux plus jeunes que les coulées récentes.

2. LES MONTS CARAIBES.

Ils témoignent d'une activité phéatomagmatique subaquatique de type surtseyen. Les produits de la phase initiale sont des brèches fines et des lapilli hyaloclastiques riches en éléments de socle (andésites, calcaires). Puis l'activité devient mixte : explosive (pluigé de cendres et lapilli) et effusive (minces coulées basaltiques), pour se poursuivre

Deux coulées basaltiques (analyses en annexe I) ont donné des âges de 472 000 ans ⁺ 16 000 ans (Pointe de Vieux-Fort) et 555 000 ans ⁺ 26 000 (Pointe Mazarin). Ces âges, assez voisins indiqueraient que le début d'activité magmatique des Monts Caraïbes a été assez rapide; début d'activité magmatique des Monts Caraïbes a été assez rapide; ensuite, les phases effusives andésitiques et la mise en place des dômes correspondraient à des stades de différenciation plus étalés dans le temps.

3. LA CHAINE ANDESITIQUE DE BOUILLANTE ET LE CYCLE RECENT.


En se basant sur les datations des ponces à quartz de la carrière Danoy et de l'anse des Pères, on peut affirmer qu'il existe certainement plusieurs niveaux ponceux à quartz dans le Sud de la Basse-Terre. De ce plusieurs niveaux ponceux à quartz dans le Sud de la Basse-Terre. De ce plusieurs niveaux ponceux à quartz dans le Sud de la Basse-Terre. De ce plusieurs niveaux ponceux à quartz par DAGAIN (1981), selon fait, l'hypothèse de WESTERCAMP (1980), reprise par DAGAIN (1981), selon laquelle la chaîne andésitique de Bouillante serait postérieure à une seule et unique grosse éruption ponceuse à quartz, paraît devoir être seule et unique grosse éruption ponceuse à quartz, paraît devoir être seule et unique grosse éruption ponceuse à position de ces deux éruptions écartée. Il reste cependant à préciser la position de ces deux éruptions ponceuses dans la chronologie des événements volcaniques récents.


3.1. La chaîne andésitique de Bouillante.

Les deux datations K-Ar effectuées sur des laves attribuées à la chaîne andésitique concernent l'obsidienne rhyolitique de Tuf et le dyke de Tarare (fig. 39 et tableau 9), ce dernier étant lié pour GADALIA (1983) au volcanisme du Morne à Jules.

L'âge de l'obsidienne rhyolitique de Tuf (325 000 ans ± 8 000) peut être considéré comme représentatif de la période d'activité du Morne à Jules, de Getz et de Tuf dans la zone de Vieux-Habitants (fig.39), puisque ces dépôts apparaissent sur le terrain étroitement intriqués (cf chap.1) quant au dyke de Tarare, daté à 863 000 ans ± 50000, il n'appartient Quant au dyke de Tarare daté à 863 000 ans ± 50000, il n'appartient certainement pas au volcanisme du Morne à Jules, mais pourrait corresponcertainement pas au volcanisme du Morne à Jules, mais pourrait correspondre à une phase d'activité antérieure de la chaîne andésitique de Bouillante ou à la phase des Pitons de Bouillante-Sans-Toucher.

La datation de l'obsidienne rhyolitique de Tuf confirme ce que DAGAIN (1981) avait déduit des datations de la Pointe à Sel (840 000 ans), de la coulée de la Rivière Colas (460 000 ans) et de l'anse du Dépôt (moins de coulée de la Rivière Colas (460 000 ans) et de l'anse du Dépôt (moins de coulée de la Rivière Colas (460 000 ans), une activité de la chaîne andésiti-200 000 ans, BAUBRON, 1980), à savoir, une activité de la chaîne andésitique de Bouillante globalement plus récente que ne laissai ent supposer les datations de BRIDEN (1978).





Pitons de Bouillante -Sans-Toucher

Monts Caraïbes

Chaîne septentrionale

Plaine nord-orientale

Fig. 39 .Carte des ensembles volcaniques de la Basse-Terre.D'après GADALIA (1983).

L'ensemble des âges obtenus sur les Monts Caraïbes (472 000 et 555 000 ans, présente étude) et sur la chaîne andésitique de Bouillante (325 000 ans, (présente étude), 840 000 ans et 460 000 ans (BAUBRON, 1980)) confirment une activité simultanée de ces deux centres éruptifs, comme le confirment les affleurements de Belost, où les niveaux attribués aux Monts suggèrent les affleurements de Belost, où les niveaux attribués aux Monts Caraîbes sont couverts par des dépôts de la chaîne andésitique de Bouillante, et de Baillif où l'inverse est observé.


3.2. Le début du cycle récent.

. Les coulées andésitiques du Morne Goyavier, du Fond Bernard et de la 3e chute du Carbet, que nous avons datées entre 143 000 et 100 000 ans, forment un seul épisode (carte 40) :

- les faciès de ces laves sont comparables : roches porphyriques à phénocristaux de plagioclases, d'orthopyroxènes millimétriques, de clinopyroxènes ; les oxydes de fer-titane sont en microcristaux, en inclusions dans les pyroxènes, et en microlites dans la pâte microcristalline ;

- sur le terrain, les coulées du Morne Goyavier et du Fond Bernard sont groupées, dans la même phase effusive par BOUDON (1981) et DAGAIN (1981), aux coulées de Bains Jaunes, Parnasse, Crête à Mangles, Nez Cassé, Morne Joseph, groupe que nous appelerons par la suite: "groupe nord", et auquel nous associons les coulées du Carbet (âge de la 3ème chute : 129 000 ans - 5 000). Vers le Sud, les coulées de Trois-Rivières font partie du même ensemble éruptif (coulées de la Regrettée, Le Faubourg, Trois-Rivières, Caféière, Grand Fond, Ermitage : groupe Sud.) (DAGAIN, 1981). Toutes ces coulées sont considérées comme contemporaines. Pour BOUDON (1981), les coulées du groupe sud, bien que du même âge que celles du groupe nord, représenteraient le premier stade de l'épisode Madeleine, avec un centre d'émission situé vers la plaine de Moscou, ce qui veut dire qu'il y aurait eu deux centres éruptifs fonctionnant simultanément ou en alternance (puisque les produits ne se recouvrent pas) : la Grande Découverte au Nord et la plaine de Moscou au Sud. Il semble en effet difficile d'attribuer l'ensemble des coulées des deux groupes à un seul centre d'émission. DAGAIN (1981), explique que toutes les coulées seraient issues de centres situés sur l'axe volcanique NNW-SSE, matérialisé par l'alignement Soufrière-Echelle -Citerne-Madeleine. Les datations ne confirment pas l'hypothèse de BOUDON (1981), puisque les coulées du groupe șud, contemporaines des coulées du groupe nord, datées entre 143 000 ans - 6 000 et 100 000 ans - 10 000 (présente étude), font partie pour cet auteur du même cycle éruptif (cycle Madeleine) que l'ensemble composant les coulées de Schoelcher, L'Habituée (datées entre 12 700 et 8 500 ans °C, PATERNE, 1980).

L'ensemble des coulées des groupes sud et nord semble appartenir au même stade éruptif, compris entre 150 000 et 100 000 ans, leur centre d'émission serait principalement la caldeira de la Grande Découverte (BOUDON, 1981) et d'autres centres situés sur l'axe volcanique NNW-SSE.



Le dôme du Carmichaël, situé dans la caldeira de la Grande Découverte, peut être associé à cet ensemble (BOUDON, 1981). Entre l'émission des coulées des deux groupes et la première manifestation volcanique suivante (Madeleine : vers 27 000 ans (DAGAIN, 1981) ou 12 700 ans (BOUDON, 1981), tableau), il y aurait un arrêt de l'activité volcanique pendant 70 000 ans au minimum.

. l'âge obtenu par les ponces à quartz de l'anse des Pères à 140 000 ± 14 000 les rattache au même cycle éruptif que les coulées des groupes nord et sud, bien qu'il n'y ait aucun rapport statigraphique direct entre tous ces niveaux.

Nous admettrons que les ponces à quartz de l'anse des Pères correspondent à la phase explosive initiale du début du cycle récent. Les âges obtenus à 140 000 ans - 14 000 pour les ponces à quartz, et 143 000 ans - 6 000 pour les plus anciennes coulées du groupe nord, confortent notre hypothèse.

- . La position stratigraphique des ponces de Pintade reste posée :
 - DAGAIN (1981) observe dans la rivière Grande-Anse un affleurement altéré de ponces pouvant appartenir à l'épisode de Pintade. Ces ponces affleurent sous les coulées du groupe Sud.
 - BOUDON (1981) observe que les ponces rattachées à l'épisode Pintade et affleurant entre Roche Noire et Trois-Rivières, sont recouvertes par les mêmes coulées de laves du groupe sud.

Ces deux arguments de terrain plaident en faveur de la position sousjacente des ponces de Pintade par rapport aux coulées du groupe nord et sud.

Dans la région de Matouba, la coulée du Fond Bernard recouvre directement la coulée du Saut d'eau du Matouba, appartenant au massif du Sans-Toucher, et que nous avons datée à 629 000 ans - 13 000. (tableau \$). Si les ponces de Pintade avaient précédé la coulée du Fond Bernard, on aurait dû les trouver entre le substratum (représenté par les coulées du Saut d'eau du Matouba), et la coulée du Fond Bernard. Ce n'est pas le cas. Mais, elles ont pu être érodées. Inversement, si les ponces de Pintade étaient postérieures aux coulées des groupes nord et sud, on devrait trouver des affleurements de ponces dessus. Il n'en est rien. Elles ont pu également être érodées. Une autre explication possible est que ces coulées de ponces soient coupées de leurs racines comme c'est le cas à Sainte-Lucie (CHEVALLIER et al., 1983). Compte tenu de ces arguments, la position stratigraphique des ponces appartenant à l'événement de Pintade sous les coulées des groupes nord et sud reste la plus probable.

La position stratigraphique des ponces de Pintade par rapport aux ponces à quartz de l'anse des Pères n'est pas connue. On admettra simplement qu'elles font partie du même cycle éruptif :

- les ponces de Pintade ne peuvent provenir que d'un secteur éruptif central (Grande Découverte-Carmichaël), à cause de leur répartition géographique (BOUDON, 1981)
- Elles sont recouvertes par les coulées des groupes nord et sud et reposent sur des produits plus anciens, soit des lahars, soit des ponces à quartz de la carrière Danoy (244 000 ans ± 18 000), position en tout point identique aux ponces à quartz de l'anse des Pères. (140 000 ans ± 14 000).

On admettra que ces coulées pyroclastiques, ponces à quartz de l'anse des Pères et ponces de Pintade font partie du même cycle éruptif, dont elles en constituent la phase initiale, sans toutefois pouvoir pour autant déterminer l'antériorité des unes par rapport aux autres.

BOUDON (1981) et DAGAIN (1981) associent les retombées ponceuses andésitiques de Boucan- Mont d'Or (fig. 39) à l'épisode ponceux de Pintade, et considèrent les premières comme la phase plinienne accompagnant les coulées pyroclastiques (modèle de SPARKS, 1976); elles proviendraient de la zone de la Grande Découverte (BOUDON, 1981 GADALIA, 1983). En effet, BOUDON observe une structure dans la région de la Grande Découverte - Morne du Col, qu'il interprête comme une caldeira consécutive aux éruptions ponceuses et dont il ne resterait que le mur nord. Les ponces à quartz de l'anse des Pères, appartenant au même cycle éruptif que les ponces de Pintade, pourraient provenir également de la caldeira de la Grande Découverte.

Dans la fourchette de temps 150 000 - 100 000 ans, nous avons mis en évidence une phase éruptive importante, dont le centre éruptif est la caldeira de la Grande Découverte, et qui aurait débuté par une activité explosive de grande envergure, donnant les ponces à quartz de l'anse des Pères, les ponces andésitiques de Boucan-Mont d'Or et les ponces de Pinta-de et qui se serait terminée par un épisode lavique important (groupes nord et sud). Nous appellerons cette phase éruptive la phase Carmichaël puisque le dôme du Carmichaël se construit au cours de cette phase.

Des problèmes restent posés :

- Quelle est la position des ponces à quartz de la carrière Danoy ? L'âge obtenu par thermoluminescence (244 000 ans) inciterait à les placer dans la chaîne andésitique de Bouillante;
- Quelle est la position des dépôts de la carrière Blanchette, attribuables soit à la chaîne andésitique, soit à la phase initiale du cycle récent ? (DAGAIN, 1981)

- Quelle est l'aire de répartition du niveau ponceux de Pintade ?

L'étude minéralogique fine et géochimique des niveaux ponceux devrait permettre de tenter de résoudre ces trois problèmes et de confirmer ou d'infirmer les résultats acquis par datation.

- Quel est l'âge des ponces dacitiques à quartz de Montval ?

Nous avons daté ces ponces à 108 000 ans - 10 000 par la thermoluminescence (tableau 15). Cet âge semble incompatible avec leur position stratigraphique dans la zone de Vieux-Habitants. (GADALIA, 1983): les produits dacitiques à quartz et sans quartz sont étroitement imbriqués et par conséquent indissiociables; leur âge peut être estimé par la rhyolite de Tuf aux alentours de 325 000 ans (tableau 9).

L'âge obtenu sur les ponces à quartz de Montval les attribuerait plutôt à la phase Carmichaël, ce qui pourrait indiquer leur rajeunissement au cours de cette phase. Il faut envisager les effets éventuels d'une élévation de température due à l'activité du volcan proche (par conduction chimique, hydrothermalisme...). En effet, la stabilité de la thermoluminescence (pic à 380°C sur lequel est mesurée la paléodose), varie rapidement avec la température. Ainsi, lorsque la température reste inférieure à 50 ou 60°C, on peut être assuré de la stabilité pour des durées géologiques, mais des mesures préliminaires ont montré que vers 100°C, on assiste à un déclin de la TL d'environ 50 % en 1 000 ans (G. GUERIN, communication personnelle).

Une telle température a pu être atteinte lors de phénomènes hydrothermaux qui se seraient produits dans la zone de Vieux-Habitants lors de la phase Carmichaël, et être ainsi responsable du rajeunissement des ponces de Montval. Un moyen sûr de vérifier cette hypothèse serait de prélever ces dacites à quartz de façon systématique, et de les dater par thermoluminescence. On devrait voir varier latéralement les effets de ce réchauffement (s'il a existé): tous les niveaux ne devraient pas être atteints de manière égale par le réchauffement et nous devrions obtenir des âges échelonnés entre 325 000 ans environ et 100 000 ans.

94 N°	Localisation	X ; Y ; altitude	Episode volcanique	Faciès
F 901 b ₁ F 901 b ₂	Carrière Danoy	636,2 E 1 771,07 N 60 m	Ponces andésitiques Pintade	gris blanc
н 901 а н 901 ь	Rivière des Pères	637,45 E 1 771,5 N 160 m	. Pintade	noire clair
J 1007/A J 1007/B	Rivière Noire	638,4 E 1 772,5 N 340 m	Pintade	clair foncé
D 1204	Grand Croix - Rocroy	634 E 1 774,5 N 40 m	Pintade	clair
7 A	Calbassiers	635,35 E 1 770,1 N 20 m	Pintade	clair
X 901	Anse à la Fontaine	652,40 E 1 771,85 N 10 m	Pintade	. clair
P 401 a	Anse du Morne Rouge	645, E 1 766,35 N O m	Pintade	blanc mixte
F 802 g ₁ F 802 g ₂	Carrière Danoy	634,2 E 1 770,90 N 40 m	Dacite à quartz Base du cycle récent ? Chaîne andésitique de Bouillante ?	clair foncé
P 301a P 301b	Anse des Pères	644,05 E 1 765,5 N 5 m	Dacite à quart Base de cycle récent ? Cycle Madeleine ?	c]air mixte
E 1103 a E 1103 b E 1103 c E 1103 e	Carrière Blanchette	634,25 E 1 773,35 N 50 m	ponces andésitiques à daci- tiques base de Soufrière ? chaîne andésitique de Bouillante ?	clair clair noire clair
F 802 a ₁ F 802 a ₂	Carrière Danoy	634,2 E 1 770,90 N 40 m	Nuée Sain-Vincent · chaîne andésitique de Bouillante ? Cycle récent ?	scorie lave
C 1501	Morne à Jules	632,8 E 1 777,75 N 60 m	Pitonside Bouillante ? Chaîne andésitique de Bouillante ?	ponce soyeuse

ableau 4 échantillons étudiés par microsonde

CHAPITRE 3

ETUDE GEOCHIMIQUE DES NIVEAUX PONCEUX

Les ponces, quelles qu'elles soient, hormis celles qui contiennent du quartz, et dans la fourchette de temps où elles se sont mises en place, ne sont pas datables. De plus, comme il a été vu précédemment, les différents auteurs se basant sur les observations de terrain, ne sont pas d'accord sur la position stratigraphique des différents niveaux ponceux (exemple des ponces dacitiques de la carrière Danoy attribuées par DAGAIN (1981) et BOUDON (1981) au cycle récent, et par GADALIA (1983) à la chaîne andésitique de Bouillante.

La géochimie de ces niveaux ponceux doit apporter des éléments nouveaux confirmant ou infirmant les corrélations obtenues par les autres méthodes d'investigation. En effet, les ponces appartenant à des lignées magmatiques différentes, ont des caractères chimiques propres, qui vont être exploités à des fins de corrélation ou de discrimination.

1. CORRELATIONS DES NIVEAUX PONCEUX (Tableau 4)

1.1. Etude de la composition chimique des roches totales.

Les analyses de roches totales (Annexe I) ont été faites au Laboratoire de Géologie de Grenoble, par fluorescence X (analyste F. Keller) (spectromètre CGR alpha 2020 Automatique, tube Rh, tension 50 kV, 50 mA. Détecteurs : compteurs à scintillation et/ou compteur proportionnel à flux gazeux. Cristaux : LIF 100, LIF 220, ADP, TLAP, PET. Temps de comptage : 40 secondes sur les rapports étalon-échantillon. Etalons internationaux). Les erreurs relatives sur les différents éléments sont notées en annexe I, ainsi que les analyses chimiques.

La convention suivante a été utilisée pour chaque groupe pétrogra-

basaltes : SiO₂ < 53 % en pourcentage pondéral

andésites basiques : $53 \% < SiO_2 < 57 \%$

andésites: $57 \% < SiO_2 < 63 \%$

dacites: 63 % < SiO₂ < 68 %

rhyolites: SiO₂ > 68 %

Sur les diagrammes des oxydes /SiO (diagr. 41-48), les ponces attribuées à l'événement Pintade (n° 1 à 11), se regroupent bien. Les faciès clairs des ponces à quartz (n° 12 et 14) tombent dans le champ des dacites; la scorie et la lave de la nuée ardente Saint-Vincent (n° 20 et 21) sont des andésites proches du champ des ponces attribuées à l'épisode Pintade ; le faciès noir des dacites à quartz de la carrière Danoy (n° 13) est voisin des points de la nuée Saint-Vincent. Les produits de la carrière de Blanchette (n° 16 à 19) présentent une composition étalée, du basalte à la dacite, en passant par l'andésite ; les ponces du Morne à Jules ont une composition andésitique.

De plus, sur ces diagrammes, on note une évolution linéaire très classique des séries calco-alcalines (EWART,1976) : les teneurs en MgO, Fe $_2{\rm O}_3$, CaO, et Al $_2{\rm O}_3$ sont négativement corrélées à la teneur en SiO $_2$, alors que l'inverse se produit pour Na $_2{\rm O}$ et K $_2{\rm O}$; enfin, P $_2{\rm O}_5$ reste à peu près constant.

Les variations constatées sont compatibles avec une évolution magmatique dominée par la cristallisation fractionnée des pyroxènes, magnétites et plagioclases. L'apatite reste un minéral accessoire, de cristallisation précoce.

Plusieurs constatations peuvent être faites à partir de ces diagrammes :

- les ponces Pintade (nº 1 à 11) forment un groupe assez homogène;
- les dacites à quartz (nº12 à 15) semblent différentes ;
- les dépôts de Blanchette (n° 16 à 19) paraissent n'appartenir à aucun des groupes précédents (ponces à quartz ou ponces de Pintade). Il en est de même pour les ponces du Morne à Jules (n°22) Les dépôts de la carrière Blanchette et le facies blanc des dacites à quartz de la carrière Danoy ont des teneurs globalement plus faibles en MgO et TiO2 que les ponces de Pintade et les nuées ardentes Saint-Vincent;
- celles-ci ont un comportement chimique voisin des ponces de Pintade.





Fig. 41 . Position des ponces étudiées dans le diagramme Fe O / SiO .

Légende ci-dessus.

Fig. 42 . Position des ponces étudiées dans le diagramme Al O / SiO . Même légende que pour le diagramme 41 .






Fig. 43 . Position des ponces étudiées dans le diagramme Na O / SiO .

Meme légende que pour le digramme 41.




Fig. 44 . Position des ponces étudiées dans le diagramme K O / SiO 2 . Même légende que pour le diagramme 41 .




Fig. 45 . Position des ponces étudiées dans le daigramme MgO / SiO $_{2}$. Même légende que pour le diagramme 41 .




Fig. 46 . Position des ponces étudiées dans le diagramme CaO / SiO .

Même légende que pour le diagramme 41.




Fig. 47 . Position des ponces étudiées dans le diagramme PO / SiO .

Même légende que pour le diagramme 41.25




Fig. 48 . Position des ponces étudiées dans le diagramme TiO / SiO 2.

Même legende que pour le diagramme 41.

1.2. Etude minéralogique des niveaux ponceux.

Les mesures ont été faites à l'aide de la microsonde CAMEBAX de l'université des Sciences et Techniques de Montpellier (Responsable Cl. Merlet). Les conditions d'analyse sont les suivantes : analyses acquises par spectrométrie de dispersion de longueur d'onde avec un temps de comptage de 16 s. pour Cr, Na et K, et de 10 s. pour Si, Al, Fe, Mn, Mg, Ca et Ti. L'intensité du faisceau est de 10 nA et la tension d'accélération de 15 kV. Les standards utilisés sont des métaux purs et des standards composites (silicates). L'erreur statistique est fonction sur chaque élément du nombre de coups enregistré pour chaque mesure. Par exemple, l'erreur pour SiO est de 1 % (nombre de coups > 2 000).

La description des affleurements de ponces est en annexe II. Les numéros (1 à 22) rappellent les numéros d'échantillons dans les diagrammes.

1:F 901 b	CARRIERE DANOY	FACIES FONCE
2:F 901 b ₂	CARRIERE DANOY	FACIES CLAIR
3;H 901 a	RIVIERE DES PERES	FACIES FONCE
4:H 901 b	RIVIERE DES PERES	FACIES CLAIR
5:J 1007/A1	RIVIERE NOIRE	FACIES CLAIR
6:J 1007/B2	RIVIERE NOIRE	FACIES FONCE PONCES DE PINTADE
7:D 1204	ROCROY	
8:7A	CALBASSIERS	
9:X 901	ANSE A LA FONTAINE	
10:P 401 a	ANSE DU MORNE ROUGE	FACIES CLAIR
11:P 401 b	ANSE DU MORNE ROUGE	FACIES RUBANE
12:F 802 g ₂	CARRIERE DANOY	FACIES CLAIR
13:F 802 g ₃	CARRIERE DANOY	FACIES FONCE
14:P 301 a	ANSE DES PERES	FACIES CLAIR DACITES A QUARTZ
15:P 301 b	ANSE DES PERES	FACIES RUBANE
16:E 1103 a	CARRIERE BLANCHETTE	1°NIVEAU DE PONCES
17:E 1103 b	CARRIERE BLANCHETTE	2°NIVEAU DE PONCES
18:E 1103 c	CARRIERE BLANCHETTE	3°NIVEAU DE PONCES
19:E 1103 e	CARRIERE BLANCHETTE	NIVEAU DE SCORIES
20:F 802 a	CARRIERE DANOY	NUEE SAINT-VINCENT, SCORIE
21:F 802 a ₂	CARRIERE DANOY	NUEE SAINT-VINCENT, LAVE
22:0 1501	MORNE A JULES	

Les analyses de verres obtenues à la microsonde sont consignées en annexe IV.

1.2.1. Les ponces soyeuses du Morne à Jules. (22) (tableau18)

Elles sont de petite taille (2 à 5 cm de diamètre) de teinte blanchâtre, fibreuses (d'où leur appellation de ponces soyeuses). Elles sont pauvres en minéraux.

Les plagioclases, de taille inférieure ou égale au demi-millimètre, sont automorphes et de composition An 38 à An 53. Quelques individus sont zonés normalement (fig. 49).

Les orthopyroxènes sont automorphes , voisins du millimètre et de composition En 42 à En 49 avec les coeurs à En 48 et les bordures à En 40-49 (zonation normale). Aucun clinopyroxène n'a été analysé. (fig. 50)

Les magnétites sont en granules peu abondants, quelques-uns millimétriques, avec un pourcentage d'ulvospinelle à 43 % (fig. 51)

La mésostase vitreuse représente 80 à 90 % de la roche, mais n'a pu être analysée.


La composition minéralogique de ces ponces confirme les résultats obtenus sur les roches totales, à savoir leur indépendance par rapport aux autres groupes de ponces.

1501	C1501	
* E(-) * 1(AE) * 1(AE) * 2(B) * 2(AE) * 2(AE) * 3(1) *	* 1(-MG* 1(+MG* 2(4) * 21-MG* 2(+MG*	C1501
TO: 1 57,50% Eg. 70% EG. 10% EG. 92% 20 17% ES. 200	2. MG 21+MG*	* L(1) *
E0 - 0.25* 0.25* 0.25* 0.26* 0	\$102 * 52.13* \$2.47* \$2.44* \$2.26* \$2.61* A1203* 0.51* 0.25* 0.34* 0.63* 0.62* FEO * 28.61* 20.35* 30.79* 32.21* 29.95* MMO * 1.50* 1.53* 1.43* 1.79* 1.57* \$20 * 15.57* 15.71* 1.43* 1.70* 1.57* \$20 * 1.50* 1.51* 1.34* 1.31* 1.35* NA20 * 0.60* 1.45* 1.34* 1.31* 1.35*	SIG2 + 0.25* 6L203* 1.91* FEU + 75.75* 6H2 + 0.95* 6H3 + 0.61*
0 10 0.10 0.00 0.00 0.11 0.13 0.13	MAG V 0.04 2.054 0.074 0.074 6.379	Ch0 * 0.00*
0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00*	T102 * 0.00* 0.01* 1.00* 0.00* 2.00* T102 * 0.10* 0.12* 1.0 * 0.00* 0.14* CR203* 0.00* 0.00* 0.01* 0.00* 0.00*	##20 * 0.00* F102 * 0.00* F102 * 14.20* EM203* 0.00*
05: 32* 32* 32* 32* 32* 32* 32* 32* 32* 32*	NP 0X*	## 0.002* ## 1 0.002* ## 1 0.002* ## 1 0.002* ## 1 0.000* ## 1 0.255* ## 1 0.000* ## 1 0.000* ## 1 0.000* ## 1 0.000* ## 2 0.000* ## 3 0.
Plagioclases	orthopyroxènes	magnétite

Tableau 18 . Moyennes des analyses de plagioclases, d'orthopyroxènes et de magnétites de C 1501 (Morne à Jules).

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'analyses.

1:coeurs des phénocristaux : 2:bordures des phénocristaux : 3:microlites.



Bordures des phénocristaux, microphénocristaux, microlites et inclusions

Fig. 49 . Position des plagioclases des ponces du Morne à Jules , et de la carrière Blanchette dans le diagramme An-Ab-Or.





Fig. 50 . Position des pyroxènes et les olivines des ponces du Morne à Jules et de la carrière Blanchette dans le diagrame me En-Fe-Wo. Légen le ci-contre.





▲ E 1103 e 3º NIVEAU DE LA CARRIERE BLANCHETTE






Fig. 51 . Position des magnétites des ponces du Morne à Jules et de la carrière Blanchette dans le diagramme Fe₂O₃-FeO-TiO₂.

1.2.2. La nuée Saint-Vincent de la carrière Danoy. (n°20 et 21)

Sur le tableau 24 sont résumées les observations microscopiques faites sur ce niveau, sur les diagrammes 52 à 55, les compositions des différents minéraux et des verres et sur les tableaux 19 à 23, les analyses.

Les minéraux sont comparables dans la scorie et la lave (diagr. n° 52 , 53 , 55). Les plagioclases de la scorie ont une composition plus basique (An 60-An 95), avec des individus à zonation inverse (bordures An 75 coeurs An 65) et zonés normalement. Le plagioclase de la scorie montrant des coeurs à An 90 sont certainement hérités (diagr. 52).

BOUDON (1981) compare les dépôts basiques de la carrière Danoy à ceux de l'éruption de la Soufrière de Saint-Vincent en avril 1979 (BARDINTZEFF et CLOCCHIATTI, 1980), au cours de laquelle une phase explosive immédiatement suivie de l'extrusion d'un dôme a pulvérisé l'ancien dôme de 1971. Dans ce modèle, la scorie représenterait le magma juvénile, alors que la lave appartiendrait au dôme existant avant l'éruption.

FBC	2	201				FB	0:	262								
			2(5) *	2(-MG*	2(+MG*		*	1(3) *	1 (-MG*	1:+MG*	2(3) *	2(-MG*	2(+MG*	3(4) *	3(-MG*	3(+MG*
					53.1.8*	SIO	2 *	52.91*	53.15*	52.68*	52.94	52.07*	52.30*	52.97*	52.77*	53 00*
AL203	3*	1.10*	1.11*	0.67*	0.99*	HLA	120	U	1.93	0.75*	1-12*	0.97*	1 41 *	1 1 2 2	1 774	
FEO	×	24.95*	23.02*	24.01*	21.53*	FEO	- 74	947	-2-98*	22.1.7	22.97*	22.77*	22.53*	22.39*	22 254	21 70*
MNO	*	1.07*	0.95*	1.04*	0.74*	MNO	*	0.94*	0.81*	0.91*	0.91*	1.01*	- 0.79*	0.79*	0.83*	
MGO	*	19.16*	20.80*	19.82*	21.89*	MGO	*	21.178	21.15*	21.41*	20.35*	19.99*	20.39*	20 47*	20.20*	
CAO	*	1.70*	1.62*	1.65*	1.63*	CAO	*	1.59*	1.52*	1.55*	1.5ó*					
NAZ0	*	0.00*	0.04*	0.00*	0.02*	NAZ	3 4	0.05*	0.03#	0.07*					0.04*	0.04*
K20	*	0.00*	0.01*	0.00*	0.02*	K20	*	0.00*	0.00*	0.00*					0.04*	0.00*
T102	*	0.39*	0.15*	0.10*	0.20*	TIO:	. *	0.07*	0.10*	0.04*					0.11*	
CR203	3*	0.22*	0.00*	0.00*	0.00*	CR26	3*	0.00*	0.00*	0.00*		0.00*	0.00*	0.01*	0.03*	0.18*
NB 0)	(*	5*	6*	6*	6.4	ND C				6*	6*	5*	6*	5*	6 *	
SI	*	1.763*	1.980*	1.997*	1.980*	31	×	1.9774	1.975*	1.7724	1 223*	1 202*	1.956*	1 0048	4 0004	4 0000
AL	*	0.048*	0.048*	0.029*	0.043*	AL.	×	0.042*	0.045*	0.042*	0 0424	0.041*	0.071*	0.051#	1.7704	1.985*
FE3	*	0.000×	0.000*	0.000×	0.000*	FE3	*	0.000*	0.000*	0.000*	0.000#	0.000*	0.000*	0.031*	0.055*	0.049*
FE2	*	0.773*	0.710*	0.747*	0.663*	1 E2	*	0.699#	0.712*	0.420*	0.717*	0.722*	0.706*	0.0004	0.000*	0.000*
MM	*	0.034*	0.030*	0.033*	0.023*	1414	*	0.030*	0.025*	0.0004	0 0204	0.7234	0.025*	0.577*	0.699*	0.677*
MG	*	1.068*	1.155*	1.110+	1.2138	MG	*	1.136*	1.179*	1 2024	1 1678	1 1418	1.150*	0.025*	0.026*	0.022*
CA				0.066*		CA	*	0.0034	0.061#	0.000	0.0474	0.061*	0.073*	1.161*	1.142*	1.185*
NA				0.000*		NA	*	0.004	0.002*	0.005*	0.000*	0.001*	0.000*	0.061*	0.061*	0.061*
K				0.000*		K	*	0.000+	0 000*	0.000*	0.0004	0.001	0.000*	0.0024	0.003*	0.003*
11	*	0.025*	0.004*	0.003×	0.005*	TI	*	0.0074	0	0.0013	0.000*	0.0004	0.000*	0.000*	0.002*	0.000*
P.				0.000*		- P	*	0.000*	0.000*	0.000*	0.000#	0.000*	0.000*	0.004*	0.003*	9.005*
	-	0 00/4	0 000*	0.000*	0 0004	CR		0.000	2 22.0		2. 1.00	h. Malia	D. 000#	0.000*	0.000*	0.000*
CR	*															
				58.7*			*	52.04	6.000*	0000 ·	0.000*	0.000*	0.000*	0.000*	0.001*	0.000*

Tableau 19 . Moyennes des analyses d'orthopyroxènes de F 802 a1 et de F 802 a2 (nuée Saint-Vincent).

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures.

-MG signifie individu le moins magnésien ; +MG signifie individu le plus magnésien.

1:coeurs des phénocristaux ; 2:bordures des phénocristaux ; 3:microlites .

Tableau 20 . Moyennes des analyses de plagioclases de F 802 a₁ (nuée Saint-Vincent, carrière Danoy).

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures. 1:coeurs de la première famille de phénocristaux et 2: bordures associées; 3:coeurs de seconde famille de phénocristaux et 4: bordures associées; 5: inclusions; 6: microlites.

Tableau 21 . Moyennes des analyses de plagioclases de F 802 a (nuée Saint-Vincent, carrière Danoy).

1:coeurs des phénocristaux; 2: bordures des phénocristaux;
3: microlites.

F80	261													
		* 2(6)	21-004	2/16:00	3-1)		FB		2A2					
									* 1(5)	1 (-CA	* 1(+CA	7/7)	¥ 3. 7	e 40000 S
3102	51.51	* 52.30	51.87	5. 704	F2.56*		210		2 2				-1-CH	2111.6
								~7	* 52.42	52.15	\$ 52.20	52.11	51.99	6 50
							FED	03	* 1.74	1.76	1.66	1.37*	1.83	: 00
							MNO		11.48	11.57	11.09	11.39*	11.75	11.00
							HCO	- 23	* 0.52	0.55	0.54*	0.61*	0.57	0.53
							CAO	4	13.29	13.20	13.45*	13.31*	12.98*	1 . 20
K20 *	0.00	0.36*	0.54*	0.39*	19.51* 0.27*		NAZ	0 1	20.17	17.20	20.20*	19.96*	17.63*	20.17
T102 *	0.00	0.09	0.40*	0.00%	0.27*		1(20	,	0.30	0.24	0.30*	0.30*	0.33*	0.20
CR203*	0.00	0.34	0.41*	0.37*	0.01* 0.02* 0.05*		TIO	2 +	0.34	0.01	0.03*	0.00*	0.00*	0.01-
	0.00	0.004	0.00*	0.00*	0.05*		CR20	33+	0.00*	0.40*	0.31*	0.27*	0.40*	0.414
										0.00	0.00*	0.02*	0.01*	0.00
MB OX*	6*	6*	4*	2.4	5*									
	4-730*	1.755*	1. 261*	1 0504	1 0704		NB C	JXX	5*	6*	4*	4.4		
***	V. UO4×	0.0748	0.091*	A ARAX	A 4151		SI							
	0.000*	0.000*	0.000*	AAAA	A A A A A M									
* ***	V. 4048	0.3618	0.359*	A 750x	/h		FE3							
	O. 013*	0.017*	0 0174	A ATAX	0 0404		FE2							
	U. /24×	0. /4/2	0 777*	A 7/7×	A 7544									
	U. / 72×	0. /998	0 774#	O GOOX			MG							
							NA							
TT *	0.000*	0.004*	0.012*	0.000*	0.000*		K							
P *	0.012*	0.009*	0.012*	0.010*	0.001*									
CR *	0.000*	0.000*	0.000*	0.000*	0.000*		P							
LE BAS	0.000"	0.000×	0.000*	0.000*	0.001*		CR							
	41 574	42 454					LE BAS	S	0.000*	U. 000*	0.000*	0.001*	0.000*	0.000*
MG *	34 204	70 204	42.27*	42.58*	41.45*		CA	*	42.58*	61 714	42 704	200		
FE *	21.53#	10 758	10.00	37.15×	38.57*									
D.H.Z		17.35×	18.89*	18.13*	19.78*		FE	*	19.19*	19.83*	19 404	38.45*	37.81*	37. 36*
CA *	40.38*	41 548	40 74×	** ***		-								
MG *	37.34*	38 80*	40.31*	41.85*	40.34*		CA	*	41.92*	40.75*	42.01*	41 458		10 10 100000000
FE *	21.78*	19.65*	19.54*	19 448	38.98*									
				16.448	20.18*		FE	*	19.41*	20.02*	18.83*	19 478	20.23*	57.53*
													-V. 3/	18 - RS*

Tableau 22 . Moyennes des analyses de clinopyroxènes de F 802 a₁ et de F 802a₂ (nuée Saint-Vincent)

-CA signifie individu le moins calcique;+CA signifie individu le plus calcique.

Même légende que pour le tableau 21 .

F80261		
* 1(1: * 2(1) * 3(6) - 3(-1°E*	THEFE F'8	02A2 -
		* 1/11 * 3/71 * 1/ 200 3
0102 * 0.21* 0.00* 0.26* 0.41*	0.15*	
HE 2020 2. YET 2.31* 1.17* 0.04*	7 203	2 * 0.10* A 27* A 24* A 24*
FEU = 70.54* 76.96% 76.5 + 76 nov	79 AD# 6L2	0.34 9.064 9.054 9.534
MNO * 0.46* 0.51* 0.47* 0.49*	0.46*	7 0.18* 0.25* 0.29* 0.24* 0.3* 2.16* 2.35* 2.53* 3.04* * 74.84* 76.33* 75.25* 77.33*
760 × 2.40* 1.77* 2.15* 1.74*		* 0.11* 0.54* 0.58* 0.52*
LBU * 0.00* 0.00* 0.11* 0.15*	a au = MGO	
HA20 * 0.00# 0.00* 0.01* 0.00*	0.00* CA0	
K20 * 0.04* 0.01* 0.01* 0.00*	A CON NAZI	0 * 0.00* 0.01* 0.03* 0.00* 0 * 0.00* 0.01* 0.03* 0.00*
1102 * 12.35* 12.77* 12.04* 11 26*	11 70*	* 0.01* 0.00* 0.00* 0.00*
CR203* 0.01* 0.06* 0.02* 0.06*	0.07*	2 * 12.05* 11.09* 12.53* 8.52*
0.00	CR20	0.04* 0.01° 0.00* 0.00*
NB DX* 32* 32* 32* 32*	704	
SI * 0.073* 0.000* 0.001* 0.169*	NB (0X* 32* 32* 32* 32*
AL * 1.218* 1.158* 1.200* 1.200*	7.052*	* 0.065* 0.083* 0.086* 0.090*
NB 0X8 32* 32* 32* 32* 32* 32* 32* 32* 32* 32*	1.3124 AL	* 1.208* 1.208* 1.065* 1.339*
FE2 *22,161*22,464*22,201*22 317*20	7 707* FE3	* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*
MN * 0.135* 0.151* 0.179* 0.169*	1 175 FE2	*22.399*22.725*22.435*24.121*
MG * 1.282* 0.730* 1.127* 0.241*	. 135* MN	* 0.124* 0.164* 0.175* 0.164*
CA * 0.000* 0.000* 0.004# 0.009*	MG MG	* 1.018* 0.924* 0.935* 0.679*
NA * 0.000* 0.014* 0.007* 0.000*	CA	* 0.008* 0.004* 0.000* 0.008*
K * 0.013* 0.004* 0.004* 0.000*	NA NA	* 0.000* 0.007* 0.021* 0.000*
TI * 3.218* 3.355* 3.155* 3.229* 3	1.000°	* 0.005* 0.000* 0.000* 0.000*
P * 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0	TI	* 3.245* 2.990* 3.362* 2.420*
CE * 0.003* 0.000* 0.005* 0.017* 0	0.000* 0.000*	* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*
KEPAKI FER CARMICHAEL	CR	* 0-011* 0.003* 0.000* 0.000*
FE203* 42.29* 41.25* 42.24* 40.28* 4	KEPAK	I FER CARMICHAFI
FED * 38.48* 39.83* 30.56* 38.02* 3		
ZULV ' 36.7* 38.2* 36.3* 37.2*		
ZULV 31.3* 34.2* 31.3* 77.0*	34. U*CAKMICHAEL ZULU	37.2* 34.1* 39.3* 27.2*CARMICHAEL
31.3* 33.0*	29.2*ANDERSON ZULV	32.8* 29.7* 34.3* 23.6*ANDERSON

Tableau 23 . Moyennes des analyses de magnétites de F 802 a₁ et de F 802 a₂ (nuée Saint-Vincent).

-FE signifie individu le moins ferrifère ; +FE signifie individu le plus ferrifère.

1:phénocristaux; 2:microlites; 3:inclusions.


108	F 802a ₁ (n° 20)	F 802u ₂ (n°21)
Localisation	Carrière Danoy I	Carrière Danoy I
Description macroscopique	 scorie noire vitreuse, porphyrique en blocs pluridécimétriques phénocristaux de plagioclases millimétriques 	 lave porphyrique, en blocs pluricentimétriques phénocristaux de plagioclases millimétriques Vésiculation moyenne
Description microscopique Plágioclases	- automorphes, plurimillimétriques et microlitiques - Composition An 60 à An 95 peuvent être zonés zonation normale : coeurs An 90 bordure : An 60 zonation inverse : coeurs An 65 bordure An 75 - Les microlites ont une composition An 60- An 85	 automorphes, millimétriques Composition An 58 - An 75 peuvent être zonés (zonation normale) coeurs de composition voisine de An 68 certains individus sont corrodés
Clinopyronèxes	 subautomorphes avec quelques fois des golfes de corrosion, millimétriques composition Wo 41-42 - En 36-36 individus non zonés inclusions de plagioclases, magnétites, orthopyroxène 	 automorphes, millimétriques peuvent être corrodés composition Wo 42- En 38 les orthopyroxènes et les clinopyroxènes et les plagioclases peuvent être groupés en glomérophyres inclusions de magnétites et plagioclases
Orthopryroxènes	- automorphes plurimillimétriques - composition proche de En 60 - Inclusions de magnétites	- automorphes, millimétriques - oompositéon de En 60 Quelques individus lágèrement zonés (zonation normale): coeurs En 61 - En 63 bordures En 60 - En 60 microlites: composition En 61 - En 63 - inclusions de plagioclases et de magnétites
Magnétites	 individus globuleux, de taille millimétrique à inframillimétrique composition : 34 à 38% d'ulvospinelle qu'elles soient dans la mésostase ou en inclusions Inclusions de pyroxènes et de plaglioclases 	- individus globuleux millimétriques à inframilli- métriques - composition : 27 à 37 % d'ulvospinelle qu'elles soient dans la mésostase ou en inclusions
Olivines	- en petits et rares cristaux	- en petits et rares cristaux
Mésostase	 vitreuse représente 50 % de la roche verres rhyolitiques (70 % à 75 % SiO₂) de même composition dans la mésostase ou en inclusion 	- vitreuse - représente 40 à 50 % de la roche verres rhyolitiques (69 à 72 % SiO ₂)

Fig. 53. Position des pyroxènes de F 802 a₁ et 'de F 802 a₂ (nuce Saint-Vincent), dans le diagramme En-Fe-Wo. Fe 0 50 △ F 802 a₁. Coeurs
A F 802 a₂. Bordures
☐ F 802 a₂. Coeurs
■ F 802 a₂. Bordures Tio * F 802 a1 09 Fig. 52. Position des plagioclases de F 802 a1 et de F 802 a2 dans le diagramme An-Ab-Or. CARATERE DANOY (P. 802.21) Nuce. Seite Viec.

Fig. 54. Position des magnétites de F 802 a₁ et de F 802aa dans le diagramme TiO₂ -Fe₂O3-FeO.

Tableau 24

Nuée Saint-Vincent



1 ensemble microsonde * 1a en o t 55

1.2.3. Les dacites à quartz de la carrière Danoy et de l'anse des Pères. (n° 12, 13, 14, 15) (tableaux 25 à 34, fig. 55 à 58)

Les deux niveaux de ponces dacitiques à quartz se différencient par :

- 1. La taille et l'aspect des ponces,
- 2. La composition des minéraux : plagioclases moins basiques dans le facies blanc de la dacite de l'anse des Pères P 301 a (An 40-50) que dans le facies blanc de la dacite de la carrière Danoy F 802g₁ (An 40-80), orthopyroxènes (En 57 dans P 301a, En 45-En 60 dans F 802g1) dans les magnétites et les ilménites (20 à 25 % d'ulvospinelle et 15 à 17 % d'hématite dans P 301a et 36 à 37 % d'ulvospinelle et 6 % d'hématite dans F 802g₄).
- 3. La rareté de l'amphibole dans la ponce de l'anse des Pères,
- 4. La différence de taille et de forme des quartz (taille voisine de 2 mm, forme quelconque pour les quartz des ponces de l'anse des Pères, taille voisine de 1,2 mm et quartz bipyramidés pour les ponces de la carrière Danoy),
- 5. La nature des verres de la mésostase, globalement plus acide dans la ponce de l'anse des Pères.

FF	0.	262					F:3	0	1 Fe		
			1(+CA*							1 (-CA*	1+CA+
5103		52.90*	52.14*			60	310	2 *	53.374	53.35*	53.06*
			1.52*				AL2	03*	0.71*	0.67*	1.16*
LEO		11.73×					FEO			11.57*	
11140		0.63*				¥0	MNO			0.51*	
MGO	4	12.93*	12.41*				MGO	*	13.24*	13.02*	13.59*
CAO	×	20.72*	20.98×				CAO	*	20.36*	20.68*	21.08*
NA2(*	0.24*	0.32*				NA2	0 4	0.25*	0.30*	0.25*
K20	*	0.00*	0.00*				1:20	*	0.00*	0.01*	0.01*
110:	*	0.35*	0.42*				TIO	2 *	0.12*	0.19*	0.11*
PR:		0.02*	0.02*				CR2	03*	0.00*	0.00#	0.00*
ella f	~ *	5*	7.4				HG	nv=	72	5 *	
SI		1.767*					SI			1.997*	
AL.		0.055*					àL.			0.030*	
FE.3		0.000*					FE3			0.000*	
FL2		0.370*					FE2			0.364*	
1111		0.020*					MN			0.016*	
riG		0.722*					MG			0.731*	
CA		0.927*					CA			0.829*	
HA		0.017*					NA			0.022*	
15		0.000×					K			0.000*	
TI.		0.010*					11			0.005*	
F.		0.000*					P			0.000*	
CR		0.001*					CR			0.000*	
IE BA							LE B			0.00	DV/1.
CA		43.14*	43 59%				CA		43 40*	43.30*	67 104
MG		36.92*					HG			37.25*	
FF		19.94*					FE			19.37*	
D.H.Z							D H.	2	10.00		40.00
40	*	42.54*	42.734				CA		93.138	12.74*	4:00
ont.		37.25*					MG			37.67*	
f.L.		20.12*					NE.		10.54*	19.59*	10 04 .
							-				

Tableau 25 . Moyennes des analyses de clinopyroxènes des dacites à quartz de la carrière

Danoy (F 802 g) et de l'anse des Pères (P 301).

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures.

-CA signifie individu le moins calcique;+CA signifie individu le plus calcique.

1:phénocristaux (coeurs).

```
FRC 261

10.01 | 10.01 | 10.02 | 2(10)* 2(010)* 2(010)* 3(0) * 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(01)* 3(
```

Tableau 26. Moyennes des analyses de plagioclases des dacites à quartz de la carrière Danoy.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures.

AB signifie individu le plus acide; AN signifie individu le plus basique.

Pour F 802 g₁: 1:coeurs; 2: bordures; 3: microlites.

Pour F 802 g₂: 1:coeurs de la première famille de phénocristaux et

2: bordures associées; 3:coeurs de la seconde famille de phénocristaux

et 4: bordures associées; 5:cristaux non zonés; 6: micolites; 7:microlites.

1:coeurs; 2:bordures; 3: microlites.

```
** 1(14)*** 1(AB)*** 1(AB)*** 2(4) *** 2(AB)*** 2(AB)*** 3(AB)*** 3(AB)*** 4(7) *** 4(AB)*** 4(AB)***

*** 1(14)*** 1(AB)*** 1(AB)*** 2(4) *** 2(AB)*** 2(AB)*** 3(AB)*** 3(AB)*** 4(7) *** 4(AB)*** 4(AB)***

*** 1(14)*** 1(AB)*** 1(AB)*** 2(4) *** 2(AB)*** 2(AB)*** 3(AB)*** 3(AB)*** 4(7) *** 4(AB)*** 4(AB)***

*** 1(14)**** 1(AB)*** 1(AB)*** 2(4) *** 2(AB)*** 2(AB)*** 3(AB)*** 3(AB)*** 4(AB)*** 4(AB)***

*** 1(14)**** 1(AB)**** 1(AB)**** 2(AB)*** 2(AB)*** 2(AB)*** 3(AB)*** 4(AB)*** 4(AB)*** 4(AB)***

*** 1(14)**** 1(AB)**** 1(AB)**** 2(AB)*** 2(AB)*** 3(AB)*** 3(AB)*** 4(AB)*** 4(AB)*** 4(AB)*** 4(AB)****

*** 1(14)**** 1(AB)**** 1(AB)**** 2(AB)*** 2(AB)*** 2(AB)*** 3(AB)*** 4(AB)*** 4(AB)** 4(AB)*** 4(AB)
```

1: famille basique(phénocristaux) ; 2 :coeurs des phénocristaux de la seconde famille de phénocristaux et 3 : bordures associées ; 4 :microlites .

.8	02	101				o a compa	
			1 -00.	1 (FFE t	F. 3		
		5.000000		T. S. C.		*	111 1
101		45.12*	46.03*	40.524			
AL2	35+	7.48*	7.56*	7.41*			4 11.
ED	*	17.53*	18 58*	20.35*			3- 114
Mo	*	0.44*	0.41*	0.50*			11.127
1CO	*	10.46*	11.15*				0.26*
CAO	*	10.58*		10.55+			10.70*
AZ		1.53*	1.40*		CAO	*	19.16*
20		0.23*			NA20	*	0.54*
		0.23*	0.174	0.21*	K20	*	0.00%
57		1.63*	1.01*	1.55+	T102	*	1.69*
120		0.02*	9.97*	0.00+			0.00*
	*	2.00+	2.00*	2.00*	H20		2.02*
	1×	241	24*	24*	NB 0	Y =	248
15	*	5.916+	6.375*	6.923*	31		
IL.	*	1.320*	1.332*	1 7078			7.037*
£2	*		0.000*	0.000*	AL.		1.336*
E2	+		2.319*	2.534*	FE3		0.900x
72	*		0.052*		FE2		1.300*
t.	*		2.501	2.3135	MN		0.0314
A		1,700%	1.714-	1.080-	MG		2.266*
h			0.704		CA		2.379*
8	*	0 000	0.03		NA		0.1484
	*	0.1074	1.00.	0.040-	K		0.004#
6		3 3/3/34	0.101*		TI		0.174*
-	- 4		000	3-300*	P	*	0.000*
1 .1		22	0.007*	to the contract of	CR	*	0.000.
	Section 191 Control		200		AMPHIROLES		
9	1		0 1. *		T1 2	3*	0.15
5 6			24-14		51 2	3*	0.753*
			2. 2.	3			0.63*

Tableau 27 . Moyennes des analyses de plagioclases des dacites à quartz de l'anse des Pères .

Tableau 28 . Moyennes des analyses d'amphiboles des dacites à quartz de la carrière Danoy et de l'anse des Pères.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'analyses.

-FE signifie individu le moins ferrifère

+FE signifie individu le plus ferrifère.

1:phénocristaux ; 2 : microlites .

Tableau 29. Moyennes des analyses d'orthopyroxènes des dacites à quartz de la carrière Danoy et de l'anse des Pères.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures.

-MG signifie individu le moins magnésien; +MG signifie individu le plus magnésien.

1:coeurs ; 2:bordures ; 3:microlites ; 4:inclusions.

1:phénocristaux ; 2:microlites ; 3:inclusions.

1:inclusions.

1:microlites partie claire ; 2:microlites partie foncée ; 3:inclusions.

Tableau 31 . Moyennes des analyses des magnétites des dacites à quartz de la carrière Danoy et de l'anse des Pères.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures.

-FE signifie individu le moins ferrifère ; + FE signifie individu le plus ferrifère .

1:inclusions.

	F301A * 1(1) * 2(1) * 3(1) *
P301B	* 1(1) * 2(1)
* 1(1) *	* A A O A A A A A A A A
	SIO2 * 0.14* 0.08* 0.06*
3102 * 0.12*	1 0078 0 228 0-148 V-17
AL203* 0.19*	FEO * 49.99* 50.89* 50.33*
FEO * 49.34*	MNO * 0.55* 0.72* 0.54*
MNO * 0.51*	MNO * 0.55 2.13* 2.07* MGO * 2.11* 2.13* 2.07*
MGO * 2.33*	2.0 × 0.00# 0.01* V-30
CAO * 0.24*	
NA20 * 0.07*	
	× 66 468 44-//* 40-0/
	CR203* 0.00* 0.00* 0.00*
TI02 * 42.62*	CHESS
CR203* 0.00*	
	NB 0X* 5* 5*
	* 0.007* 0.004* 0.003*
NB 0X* 6*	* 0 014* 0-009* 0-010*
31 * 0.007*	v o ooo* 0 000* 0.000*
AL * 0.012*	
FE3 * 0.000*	
FE2 * 2.245*	
MN * 0.024*	
MG * 0.191*	
CA * 0.014*	0 000* 0 005*
NA * 0.007*	K # 0.000# 0.000# 0.000#
K * 0.000*	TI * 1.778* 1.771* 1.774*
TI * 1.746*	* 0.000* 0.000* 0.000*
F * 0.000*	CR * 0.000* 0.000* 0.000*
CR * 0.000*	REPART FER CARMICHAEL
REPART FER CARMICHAEL	FE203* * 1
REPART FER CHARLES	FED * * * * * *CARMICHAEL
FE203 -	ZULV * * *ANDERSON
FEO * *CARMICHAEL	7H U * * * HIDE KOOK
AULV	SEART SER CARMICHAEL
	eeanz* 15.55* 16.74* 14.75°
REPART FER CARMICHAEL	
FE203* 17-29*	
FEO * 33.78*	ZHE 16.3* 17.4* 15.5*ANDFRSON
ZHE 16.9*CARMICHAEL	ANC 1010
18.8*ANDERSON	

1 sinclusion

1:coeurs; 2:bordures; 3:inclusions.

Tableau 32 . Moyennes des analyses d'ilménites des dacites à quartz de la carrière Danoy et de l'anse des Pères .

-TI signifie individu ayant la teneur en titane la moins élevée, +TI signifie individu ayant la teneur en titane la plus elevée.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures.


117 F 802g₁ (n° 12) F 802g₂ (n° 13) Localisation Carrière Danov Carrière Danoy - ponces de petite taille - ponces de petite taille Description - patine ocre, cassure blanche, aspect soyeux - patine ocre, cassure grise, plus compacte que les ponces blanches - roche porphyrique : phénocristaux de quartz, macroscopique pyroxènes, plagioclases, - roche porphyrique : phénocristaux de plagioclases et de pyroxènes. - subautomorphes - plurimillimétriques à Description subautomorphes, millimétriques inframillimétriques - phénocristaux non zonés à An 90, - composition : microscopique coeur : An 45 - An 80 inversement zoné : coeur : An 85 bordures, microlites : An 40 - An 65 bordure:: An::88 - 96 et normalement zonés avec les bordures à An 53-An 50 zonation normale - microlites 2 sortes : An 50-70 et An 80-85 Plagioclases groupement plagioclases-orthopyroxènes - inclusions de clinopyroxènes, orthopyroxènes et magnétite. - petits cristaux subautomorphes - composition : Wo42 - En36 Clinopyroxène - groupements clinopyronènes-orthopyroxènes-magnétite - en très rares petits cristaux non anàlysés plagioclases-clinopyroxènes magnétite- clinopyroxènes - subautomorphes - taille moyenne millimétrique - composition : En45 - En 60 - dépassent rarement le demi-millimètre. coeurs : En 45- En 55 - composition : En 50- En60, qu'ils soient dans la bordures : En₅₂ - En 60 mésostase ou en inclusion Orthopyroxènes zonation inverse - inclusion d'ilménites de magnétites - groupement plagioclases-orthopyroxènes groupement orthopyroxènes-magnétites - taille demi-millimétrique à inframillimétrique - taille demi-millimétrique à inframillimétrique - composition : 36 - 37 % d'ulvospinelle dans les - composition : 26-37 % d'ulvospinelle minéraux de la mésostase et en inclusions dans les dans les cristaux de la mésostase Magnétites clinopyroxènes . 32 à 37 % d'ulvospinelle dans les cristaux en inclusions association plagioclases-magnétites - la seule ilménite analysée est en inclusion dans - les deux ilménites analysées sont en inclusion dans une amphibole - composition : 6 % d'hématite un orthopyroxène Ilménites - 2 mm au-maximum - composition voisine de $\frac{M}{M+F}$ = 50 Amphiboles - inclusions de verre et d'ilménite - groupement amphibole-magnétite - millimétriques. Quartz - automorphes, bipyramidés, - 1 mm au maximum Olivines - Composition voisine de Fo74 identique en microcristal ou en phénocristal groupement olivine-magnétite - vitreuse, Mésostase - cryptocristalline - verres rhyolitiques (75 % de SiO,)

Tableau 33

Ponces à quartz de la Carrière Danoy


Localisation	Anse des Pères	Anse des Pères
Description macroscopique	 ponces grises à noires en patine, blanches en cassure roche porphyrique : phénocristaux de quartz, pyroxènes et rares feldspaths 	 ponces grises à noires en patine, gris clair en cassure; avec un léger rubannement roche porphyrique, phénocristaux de quartz, pyroxènes et très rares olivines,
Description microscopique Plagioclases	 quelques individus plurimillimétriques; la plupart des cristaux est microlitique composition bien groupée entre An 40 - An 50 avec une zonation inverse 	- taille inframillimétrique - rares individus milli- métriques - composition : 2 compositions An 90 - 96 (phénocristaux et glomérophyres) - An 50 - An 75 (phénocristaux et microlites) - pas de différence entre partie foncée et claire de la ponce
Clinopyroxènes	- clinopyroxènes peu abondants	- microlitiques - composition augitique En 37 - Wo 40 - inclusions d'ilménites et de magnétites
Orthopyroxènes	- automorphes atteignant le millimètre - composition centrée autour de En 57	- automorphes millimétriques à inframillimétriques - composition : coeurs : En62 - En 55
Magnétites	 inframillimétrique composition : 20 à 25 % d'ulvospinelle (magnétites analysées sont incluses dans les orthopyroxènes) 	- 1/10 de millimètre - composition : 24 % d'unvospinelle dans la particulare de la ponce 24 - 28 % dans la partie foncée 18 % en inclusions
Ilménites	- microlites dans la mésostase - composition 15 à 17 % d'hématite	- la seule ilménite analysée est en inclusion dans les pyroxènes
Amphiboles		- une amphibole, de taille inférieure au millimètre, analysée dans la partie claire $\frac{M}{F + M} = 0,63$
Quartz	- plurimillimétriques - cristaux arrondis à golfes de corrosion	- plurimillimétriques - forme globulaire
Olivines	Y.	- taille inférieure au millimètre, analysée dans la partie sombre voisine de Fo 77
Mésostase	- vitreuse - représente 80 % de la roche - verres hyperacides : 75 à 80 % Si0 ₂	- vitreuse - représente 80 % de la roche - verres dacitiques et rhyolitiques 60 à 78 % SiO ₂





* Coeurs des phénocristaux.

Bordures des phénocristaux, microphénocristaux, microlites et inclusions.
 Fig. 56. Position des plagioclases des dacites à quartz de la carrière Danoy et de l'anse des Pères dans le diagramme An-Ab-Or.




des ilménites des dacites, des ilménites des dacites à quartz de la carrière Danoy et de l'anse des Pères. dans le diagramme TiO2-Fe2O3-FeO. Fig. 58

Tableau 34

Ponces à quartz de l'anse de Pères

F 802 g ; PONCES A QUARTZ DE LA CARHIERE DANOY, FACIES CIAIR
F 802 g 2 PONCES A QUARTZ DE LA CARHIERE DANOY, FACIES FONCE

P 801 B PONCES A QUARTZ DE L'ANSE DES PERES. FACIES CLAIR
F 901 B PONCES A QUARTZ DE L'ANSE DES PERES. FACIES FONCE



ಕ KO/SiO2. 55

1.2.4. <u>La carrière Blanchette</u> (n° 16, 17, 18, 19) (tableaux 35 à 42, fig. 59 à 61)

Les dépôts de la carrière Blanchette se différencient des autres dépôts ponceux par plusieurs caractères :

- 1. la faible épaisseur de chaque niveau ponceux ou cendreux et la succession sans discontinuité de ces couches ; par comparaison, dans la carrière Danoy,les niveaux sont plus épais (métriques à plurimétriques),
- 2. la composition globale de chaque niveau ponceux qui ne se rattache à aucun autre groupe : dacites à quartz ou scorie Saint-Vincent,
- 3. la basicité des plagioclases, plus élevée que celle des dacites à quartz de l'anse des Pères et de la carrière Danoy,
- 4. les clinopyroxènes sont plus magnésiens que ceux des dacites à quartz et de la nuée Saint-Vincent. Les orthopyroxènes sont globalement plus magnésiens que les orthopyroxènes des ponces à quartz de la carrière Danoy,
- 5. la composition de la mésostase vitreuse est moins acide que celle des dacites à quartz, même en ce qui concerne le second niveau de ponces de composition dacitique, et que celle de la nuée Saint-Vincent.

Les dépôts de la carrière Blanchette s'individualisent donc nettement sans possibilité de les corréler avec aucun autre niveau ; l'hypothèse selon laquelle il n'y aurait eu qu'un seul épisode ponceux à quartz n'est à nouveau pas vérifiée.

1:individus de la première famille parties noires et 2:individus de le seconde famille blanches
3:feldspaths potassiques (partie blanche)

E1103C *1(7) * 1(AB) 5107 * 47.26* 40.38 \$1203* 34.28* 34.20 FEO * 0.62* 0.61 MOO * 0.01* 0.00 MGO * 0.01* 0.00 CAO * 16.80* 16.78 K20 * 0.02* 0.02 T102 * 0.00* 0.00 CR203* 0.00* 0.00	* 45.36* 51.76 * 35.18* 30.53 * 0.58* 0.78 * 0.01* 0.00 * 0.01* 0.00 * 13.32 * 13.00* 13.32 * 0.94* 3.50 2* 0.03* 0.10	\$ 51.52* \$ 31.29* \$ 0.72* \$ 0.03* \$ 0.06* \$ 14.10* \$ 3.25* \$ 0.05* \$ 0.02*	52.20* 30.16* 0.66* 0.01* 0.05*	54.18* 28.82* 0.00* 0.00* 0.06* 11.13* 4.46* 0.13* 0.00*	51.02* 31.18* 0.55* 0.00*	SIO2 * 46. 0L293* 34. EFO = 0. MNO * 0. MGO * 1. CAO * 1. K20 * 0. 1102 * 0.	28* 46. 56* 34. 56* 0. 02* 0. 03* 0. 63* 17. 01* 1.	05)* 1(AN)* 05* 45.23* 55# 35.81* 51* 0.41* 00* 0.00* 06* 0.00* 52* 18.75* 01* 0.49* 00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00*	45.71* 34.77* 0.68* 0.02* 0.04* 17.89* 0.95* 0.02* 0.00*	45.39* 34.91* 0.75* 0.00* 0.09* 16.99* 1.19* 0.04* 0.00*	45.31* 35.60* 0.53* 0.02*	46.87* 34.86* 0.77* 0.00* 0.03* 17.42* 1.17* 0.01*	41.17* 34.34* 0.97* 0.00* 0.06* 16.94* 1.30* 0.00* 0.00*	46.59* 32.52* 0.44* 0.01* 0.00*
AL * 7.372* 7.37 FE3 * 0.000* 0.00 FE2 * 0.094* 0.09 MN * 0.003* 0.00 MG * 0.003* 0.00 CA * 3.300* 3.30 NA * 0.527* 0.53 N * 0.005* 0.00 F * 0.000* 0.00 CR * 0.000* 0.00 CR * 0.12* 0.1	2* 32* 32 6* 8,400* 7,436 5* 7,588* 6,523 6* 0,009* 0,100 3* 0,009* 0,100 3* 0,009* 0,100 3* 0,003* 0,000 6* 3,536* 2,59* 6* 0,007* 0,02 6* 0,000* 0,00 0,000* 0,000* 0,00 0,000* 0,000* 0,00 12* 0,18* 0,4 10* 3,69* 3,7 13* 71,21* 67-4	* 9.307* * 6.637* ** 0.000* * 0.108* 0.016* 2 2.724* 0.1134* 3 0.012* 40 0.003* 0 0.000* 0 0.000*	0.000* 0.104* 0.014* 2.288* 1.370* 0.000* 0.000* 0.000*	7.830* 6.152* 0.000* 0.130* 0.005* 1.014* 2.144* 1.566* 0.300* 0.000* 0.000*	9.3178 6.3998 9.0008 9.0008 9.0011 9.2634 1.1637 9.000 9.000 9.000 9.37 30.52	Al * 7. FES * 0. FEC * 0. MN * 0. HG * 0. LA * 3. NA * 0. LA * 3. TI * 0.	430* 7. 900* 9. 933* 0. 903* 0. 903* 0. 475* 3. 360* 0. 905* 0. 900* 0. 901* 0.	32* 32* 32* 504* 8.290* 500* 7.722* 000* 0.0	3.430* 7.554* 9.000* 9.104* 9.003* 9.011* 3.520* 9.0009 9.0009 9.0009	8.506* 7.530* 0.000* 0.115* 0.0025* 3.338* 0.422* 0.000* 0.000* 0.000*	8.315* 7.586* 0.000* 0.001* 0.003* 0.006* 3.647* 0.206* 0.000* 0.000* 0.000*	8.533* 7.466* 0.000* 0.017* 0.000* 0.008* 3.398* 0.419* 0.000* 0.000* 0.000*	8.067* 7.913* 0.000* 0.162* 0.000* 9.018* 3.557* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*	8.710* 7.153* 0.000* 0.069* 0.002* 0.000* 3.584* 0.391* 0.000* 0.000* 0.000*

Tableau 35. Moyennes des analyses de plagioclases des ponces (E 1103 a, b, c) et de la scorie (E 1103 e) de Blanchette.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures.

AB signifie individu le plus acide ; AN signifie individu le plus basique.

1:coeurs des phénocristaux ; 2:bordures des phénocristaux ; 3:microlites.

E 1.0.3A * 1(5) * 11-MG* 1(*MG* 2(-MG* 2(*MG* 3.43* 4.12* 4.15* 53.42* 53.40* 53.43* 41.203* 1.54* 1.50* 1.71* 1.47* 1.47* FEO * 18.85* 17.57* 17.91* 19.52* 18.29* MNO * 0.66* 0.61* 0.63* 0.79* 0.59* MGO * 23.48* 23.91* 24.05* 23.08* 23.77* CAO * 1.52* 1.48* 1.92* 1.57* 1.43* MA20 * 0.03* 0.02* 0.04* 0.03* 0.09* MCO * 0.00*	E1103E * 1(-MG* 1(+MG* 2(-MG* 2(+MG* 3(3) * 3(-MG* 3(+MG* 3(4) MG* 3(1) MG*	# 1(1) * 2(16G* 2(-MG* 3(5) * 3(+MG* 3(-MG*
NB 0X* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6*	NB DX* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6*	NB 0X*

Tableau 36. Moyennes des analyses d'orthopyroxènes des ponces (E 1103 a, b, c) de Blanchette.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures.

-MG signifie individu le moins magnésien; +MG signifie individu le plus magnésien.

1:coeurs ;2:bordures ; 3:microlites.

E1103E
 * 1(3) * 1(-MG* 1(+NG* 2(7) * 2(-MG* 2(+MG* 3102 * 39.91* 39.92* 39.79* 39.73* 38.75* 39.49* AL203* 0.02* 0.00* 0.02* 0.02* 0.02* 0.03* 0.02* FED * 21.19* 21.31* 20.84* 25.08* 26.79* 23.33* MNO * 0.33* 0.34* 0.31* 0.40* 0.58* 0.42* GEO * 40.31* 40.44* 40.99* 37.10* 36.38* 38.48* GEO * 40.12* 0.11* 0.13* 0.15* 0.19* 0.15* MA20* 0.00* 0.01* 0.00* 0.00* 0.01* 0.01* 0.00* CEO * 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.01* 0.00* CEO * 0.00* 0.00* 0.00* 0.01* 0.00* CEO * 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* CEO * 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* CEO * 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* CEO * 0.00* 0.

Tableau 37 . Moyennes des analyses déolivines des scories de Blanchette.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures.

-MG signifie individu le moins magnésien;+MG signifie individu le plus magnésien.

1:coems ; 2:bordures.

		-1107F
		E1103E * 1(5) * 1(-CA* 1(+CA* 2(4) * 2(-CA* 2(+CA*
E1103A	E 1 1 030 * 1(1) * 2(3) * 2(-CA* 2(+CA* 3(3) * 3(-EA * 3(+CA*	
* 1(4) * 1(-CA* 1(+CA*	* 1(1) * 2(3) * 2(-tax 2(1tax 3(3)	**S102 * 51.39* 51.59* 51.40* 51.35* 51.36* 51.28*
* 1(4) 1(5)	\$107 * 52.40* 51.37* 51.65* 52.68* 51.55* 51.90* 50.95*	
SI02 * 51.72* 51.31* 51.14*	\$102 * 52.40* 51.37* 51.55* 500* 51.32* 2.08* 1.93*	ALZUS 3.30 0 /5* 0 75* 9.41* 9.24* 7.95*
AI 203* 2.51* 2.37* 2.72*	5107 * 52.40* 51.37* 51.38* 1.51* 1.72* 2.08* 1.93* 51.203* 1.81* 1.96* 1.70* 1.61* 1.72* 2.08* 1.73*	FEU * 8.07 7.00 0 24* 0 25* 0.34* 0.22*
AL203* 2.51* 2.37* 2.72* FEO * 9.54* 10.17* 2.12*	FEO * 12.55* 12.23* 12.49* 12.39* 12.71* 13.31* 12.08*	HWV " 15 10 1 15 15 15 15 15 22* 14.64*
		MG0 * 14.86* 15.12* 14.63* 20.00* 17.30* 21.21* CA0 * 17.86* 18.99* 20.53* 20.00* 17.30* 21.21*
	MNO * 0.33* 0.43* 14.31* 14.45* 14.23* 14.49* 14.06*	CAO * 19.86* 18.99* 20.55* 20.22* 0.28* 0.19*
	CAO # 13.00* 18.12* 17.50* 18.74* 17.89* 17.64* 16.26*	NA20 * 0.24* 0.25* 0.00* 0.00*
CAO * 19.82* 19.11* 20.50*	NADO # 0.26* 0.25* 0.25* 0.23* 0.26* 0.25*	K20 * 0.00* 0.00* 0.00
NA20 * 0.20" 0.27	K20 * 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.02* 0.03* 0.03*	
820 * 0.01" 0.00	TIO2 * 0.52* 0.45* 0.45* 0.46* 0.43* 0.48* 0.39*	CR203* 0.00* 0.00* 0.03* 0.03* 0.00* 0.14*
1102 # 0.48	CR203* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.01* 0.05* 0.00*	
CR203* 0.00* 0.00* 0.00*		6* 6* 6* 6*
	2000	NB 0X* 6* 6* 6* 6* 5* 5*
up ove 4# 4# 32*	NB DX* 6* 6* 6* 6* 6* 6*	
	* + 940* + 954* 1.953* 1.956* 1.947* 1.938* 1.944*	
SI * 1.945* 1.946*10.295*	. A DOOR D DOOR D DOOR D. OFF U. UFLY U. U.	
AL * 0.111* 0.106* 0.544*	* 0 200* 0 000* 0 000* 0.000* 0.000* 0.000*	
FE3 * 0.000* 0.000* 0.000*		
FE2 * 0.299* 0.321* 1.530*	" a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
MN * 0.012* 0.013* 0.065*	- " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
MG * 0.800* 0.796* 4.218*	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
CA * 0.778* 0.777* 4.421*	" " " O O O O O O O O O O O O O O O O O	
WA * 0.015* 0.021* 0.113*	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
* 0 000* 0.000* 0.000*	v n n+F* n n17* n n17* 0.013* 0.012* 0.013* 0.011	
TT * 0.014* 0.015* 0.0//*		CR * 0.000* 0.000* 0.001* 0.000* 0.004*
* 0.000* 0.000* 0.000*		
CR * 0.000* 0.000* 0.000*		
I E BAS	LE BAS CA * 38.22* 38.53* 37.49* 38.79* 37.87* 36.88* 38.99*	
CA * 42.27* 41.37* 43.82*	oru si osa si cia so 97% 41.04% 41.25% 40.01	HG * 43.14* 43.83* 42.76* 13.85* 15.32* 13.13* FE * 14.78* 16.00* 13.80* 13.85* 15.32* 13.13*
MG * 41.59* 41.27* 40.77*		
FE * 16.14* 17.36* 15.41*		D.H.Z CA * 41.56* 39.66* 42.77* 41.63* 40.26* 44.13*
D-H-Z	D.H.Z CA * 37.61* 37.94* 36.90* 38.27* 37.24* 36.22* 38.32*	
	MG * 41.45* 41.43* 42.00* 41.32* 41.47* 41.50* 20.42*	FE * 14.91* 16.14* 13.71* 13.71
	FE * 20.74* 20.63* 21.10* 20.41* 21.30* 22.12* 20.42*	
FE * 16.27* 17.56* 15.56		

1:phénocristaux

1:coeurs; 2:bordures; 3:microlites.

Tableau 38 . Moyennes des analyses des clinopyroxènes des ponces (E 1103 a, c) et des scories (E 1103 e) de Blanchette.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures.

-CA signifie individu le moins calcique, +CA signifie individu le plus calcique.

```
E1103A
* 1(1) *

SIO2 * 0.15*
AL203* 0.20*
FEO * 44.20*
MNO * 3.52*
MGO * 3.45*
CAO * 0.00*
K20 * 0.00
```

Tableau 39 . Analyse d'ilménite des ponces (E 1103 a) de Blanchette.

1:microcristal.

F110	036			
	1(5) *	1(-FF#	1(*FE*	E1103B
	1107	AS FE	11116	* 1(1) * 2(+FE* 2(-FE*
3102 *	0.31*	0.47*	0.24*	SIO2 * 0.29* 0.33* 0.33* AL203* 2.54* 2.43* 2.43* FED * 74.84* 76.06* 75.53*
AL203*	4.23×	3.92*	4.45*	5102 * 0.29* 0.33* 0.33*
FEO *	75.17*	74.15*	75.44*	AL203* 2.54* 2.43* 2.43*
MNO *	0.39*	0.36*	0.37*	FED * 74.84* 75.06* 75.53*
			2.79*	11110 0.50* 0.42* 0.54*
CAO *			0.00*	MGO * 1.58* 1.55* 1.52*
NA20 *			0.04*	CAO * 0.00* 0.02* 0.00*
K20 *			0.00*	NA20 * 0.08* 0.05* 0.00*
				K20 * 0.01* 0.03* 0.00*
			0.03*	TI02 * 15.15* 15.26* 15.58*
UNZUU	0.01.	0.00*	0.03	CR203* 0.05* 0.07* 0.00*
ив пх*	32*	32*	324	We down
ST *	0.110*	A 166*	0.083*	NB UX* 32* 32* 32*
AI *	1 767*	1 6268	1.810*	NB 0X* 32* 32* 32* SI * 0.100* 0.112* 0.112* AL * 1.027* 0.772* 0.973* FE3 * 0.000* 0.000* 0.000* FE2 *21.437*21.56.071.428*
FET *	0.000*	0.000*	0.000*	AL * 1.027* 0.972* 0.973*
FE2 *	22 247*	71 707*	22 025	FE3 * 0.000* 0.000* 0.000*
MC *	1 40/4	1 500#	1.551* 0.000*	MN * 0.145* 0.121* 0.155*
CA *	0.0154	0.070*	1.551#	MG * 0.815* 0.791* 0.776*
NA X	0.015	0.030*	0.000*	
IAM *	0.014*	0.000*	0.02/=	NA * 0.053* 0.033* 0.000*
TT #	0.005	0.014*	0.000*	K * 0.004* 0.013* 0.000*
0 4	0.000*	2.900*	2.705*	TI * 3.906* 3.893* 3.978*
CO *	0.000*	0.000*	0.000*	P * 0.000* 0.000* 0.000*
DEDART I	U. UU3*	0.000*	0.008*	CR * 0.014* 0.017* 0.000*
REPART I	TER CARI	TCHAEL		REPART FER CARMICHAEL
FE2U3*	44.35*	42.31*	0.000* 0.027* 0.000* 2.705* 0.000* 0.000*	FE203* 36.37* 37.08* 36.34*
1 LU				
ZULV '	30.8*	34.1*	31.0*CARMICHAEL	YIII I / 45 4# 45 4# 4/ 2#245V720V
ZULV	23.6*	-/	24.5-ANDERSON	XULV 42.2* 42.1* 43.1*ANDERSON

1:phénocristaux

- 11	3C			EL	10	3.F				
			2(+FE*		*	t(3) *	1(-FE*	1 (+FE*	3(-FE*	3(+FE*
3102 *	0.32*	0.62*	0.25*	310	2 *	0.31*	0.79*	0.304	0.20*	0.274
				AL.	03*	5.28*	5.02*	5.62*	5-24*	5.75*
FEO *	74.40*	72.94*	75.30*	FEO	+	75.58*	74 09*	75.38*	74 57#	76.70*
MNO ×	0.48*	0.46*	0.50*	MNO	*	0.32*	0.37*	0.28*	0.46*	0.43*
MG0 *	2.73*	3.14*	2.84*							4.18*
CAO *	0.11*	0.13*	0.00*	CAO	*	0.118	0.25*	0.07*	0.06*	0.02*
NA20 *	0.02*	0.03*	0.05*	NA2	0 *	0.02*	0.04*	0.03*	0.00*	0.02
			0.00*	K20	*	0.00%	0.02*	0.00*	0.00*	0.00*
T102 *	11.39*	10.94*	11:54*	TIO	2 ×	5 518	6 174	5.78*	5 97*	5.57*
										0.00*
							105050505	207.03020		
			32*	NB	UX*	32*	32*	32*	32*	32* 0.081*
			0.088*	SI	*	0.140*	0.253*	0.114*	0.104*	0.081*
			1.329*	AL	*	2.236*	2.168*	2.351*	2.216*	2.370*
			0.000*	FE3	*					0.000*
			22.077*	FE2 MN MC	*	22-970*	22.459*	22.777*	22.934*	22.448*
			0.149*	MN	+	0.097*	0.115*	0.084*	0.140*	0.127*
			1.499*	MC	*	2.073*	1.932*	2.160*	2.157*	2.176*
			0.000*	CA				0.027*		
			0.034*	NA						0.000*
			0.000*	K	*	0.0004	0.009*	0 000*	0 0004	0.000*
			3.045*	TI	*	1.730*	1.485*	1.574*	1.599*	1.752# 0.000# 0.000*
P *	0.000*	0.000*	0.000*	P	*	0.000#	0.000*	0.000#	0.000*	0.000*
CR *	0.003*	0.011*	0.000*	CR	*	0.000%	0.000*	0.000*	0.017*	0.000*
EPART	FER CARN	TICHAEL		REPA	RT I	ER CAR	HICHAEL			
FF:03*	42.31*	47 244	42 97*	EE 2	774	CO. AAY	40 174	51.65*	51.73*	50.26*
FEO *	36.32*	34.93*	36.71*	FEO	*	30.55+	29.83*	30. 40*	30.01*	31 04*
ZULV '	35.0*	34.1*	36.71* 35.0*CARMICHAEL 28.2*ANDERSON	201	, ,	20.4*	19.78	10.9*	18 7*	20 7*CARMICUAE
VIII 11	20 44	74 74	OR DAAMOEDOOM	*****				10.0	10.7	TO. / "CARNICHAE

Tableau 40 . Moyennes des analyses de magnétites des ponces (E 1103 a, b, c) et des scories (E 1103 e) de Blanchette.

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures.

-FE signifie individu le moins ferrifère;+FE signifie individu le plus ferrifère.

1:microlites ; 2:inclusions ; 3:phénocristaux.

		E 1103 b (n° 17)
126	E 1103 a (N°16) ler niveau de ponces	2nd niveau de ponces
Localisation	Carrière Blanchette	Carrière Blanchette
Description macroscopique	 ponces de potite taille (2 à 3 cm max.) de couleur marron en patine, gris foncé en cassure. très peu porphyrique ; les rares phénocristaux de feldspath sont millimétriques présence de rubannements légers 	 ponces de petité taille, (3-4 cm max.) de teinte blanche, jointives entre elles, très vésiculées roche pauvre en minéraux et peu porphyrique : rares phénocristaux de pyroxènes demi-millimétriques et de plagioclases de même taille
Description microscopique Plagioclases	- cristaux millimétriques, de forme quelconque, - composition: Les phénocristaux se partagent en deux groupes: ler groupe An 60 2ème groupe An 80-90 Groupement monophasés de plagioclases An 60. Pas de différence entre parties - fedspath alcalin de composition An 26 analysé	- cristaux dépassant très rarement le -1/2 mm subautomorphes - composition : Cristaux zonés bordures: An 55 An 85 coeurs : An 75 An 85 Zonation normale Groupementsmonophasés de plagioclases
Clinopyroxènes	- microlitiques, - composition = W0 42 En 41 pour les cristaux de la partie claire.	
Orthopyroxènes 4	 cristaux dépassant rarement le demi-millimètre composition : En 65 En 70 pour les cristaux de la partie claire. Individus non zonés Inclusion de magnétite les orthopyroxènes et les clinopyroxènes sont groupés en glomérophyres 	 globuleux, demi-millimétriques, composition En 50-En 60, avec les bordures comprises entre En 56-En 60 Zonation normale, Inclusion de magnétites Groupements de plagioclases et d'orthopyroxènes
Magnétites ,	- globuleuses dans la mésostase, - composition assez bien groupée : 29 à 34 % d'ulvos- pinelle	- microlites - composition autour de 4.6 % d'ulvospinelle qu'elles soient dans la mésostase ou en inclusion
Ilménites	- dans la mésostase - composition : 10 % d'hématite - analyse faite dans partie claire	6
Olivines	- présence d'une olivine dans la partie noire	
Quartz	- inframillimétriques, - globuleux	
Mésostase	- vitreuse dans la partie foncée et dans la partie claire - composition : 66 % à 60 % de SiO ₂ dans partie claire - Aucune analyse n'a pu être effectuée dans la partie foncée.	- microcristalline

Tableau 41

arrière Blanchette			
		28	

	E 1103c (n°18) 3ème niveau de ponces	E 1103e (n°19) 127
Localisation		niveau de scories Carrière Blanchette
Description.	 ponces de petite taille (3-4 cm max.) ocre en patine, noire en cassure roche corphyrique : phénocristaux de plagioclases, plus rarement de pyroxènes structure peu vésiculée 	- scorie noire de petite taille (3-4 cm max.) noire en patine et en cassure
Description microscopique PJagioclases	- taille millimétrique pour les plus gros. individus cassés et/ou corrodés - composition : homogène quand ils ne sont pas zonés : Au :8 - An 70 sinon:zonation normale : bordure : An 70 coeurs : An 92 - Inclusions de magnétites	- rares phénocristaux millimétriques. microlites - composition : An 89 - An 98 zonation normale : coeurs An 95 - 98 microlites et bordures :An 94 - 99
Clinopyroxènes	- subautomorphes - taille inférieure ou égale au demi-millimètre. - composition groupée Wo 38 . En 41 qu'ils soient en phéno ou en midsdaristaux - inclusions de magnétites	- forme quelconque cristalline à globuleux taille pouvant atteindre le demi-millimètre microlites - composition groupée Wo 38-45 - En 40-45 composition zonée: coeurs Wo 40-45 - En 43-45 ordure: Wo 38-44 - En 42-45
Orthopyroxènes	- taille atteignant le millimètre - composition : En 58 - En 68 - Groupement glomérophyre d'orthopyroxènes, clino- pyroxènes et magnétites, en petit cristaux (10mm) - inclusions de magnétites	
Magnétites	- globuleux de petite taille - composition bien groupée 35 % d'ulvospinelle	- de petite taille et microlites - composition groupée, de 18 à 20 % d'ulvospinelle
Ilménites		
Olivines		- rares exceptions millimétriques la plupart des cristaux sont microlitiques, composition : coeurs : Fo 77 bordures : Fo 71-76
Quartz		
Mésostase	- vitreuse - verres de composition basalto-andésitique : SiO ₂ entre 53 et 58 % .	- vitreuse - verres de composition andésitique : SiO, voisin de 56 % (une exception à 50 % analysée dans la mésostase)

Tableau 42

Carrière Blanchette




Fig. 59 . Position des plagioclases des ponces du Morne à Jules et de la carrière Blanchette dans le diagramme An-Ab-Or.





Fig. 60 . Position des pyroxènes et des olivines des ponces de la carrière Blanchette et du Morne à Jules dans le diagramme En-Fe-Wo.







Fig. 61 . Position des magnétites des ponces du Morne à Jules et de la carrière Blanchette dans le diagramme Fe₂O₃-FeO-TiO₂.



KO/SiO2. des verres de diagramme Position dans le Fig. 55

1. 2. 5. <u>I'événement ponceux de Pintade.</u>(n° 1 à 11) (tableaux **43** à **57**

Les niveaux ponceux attribués à l'épisode Pintade se différencient nettement des autres niveaux ponceux précédemment étudiés, tant par l'organisation des affleurements (puissance d'un dépôt 20 m en moyenne, avec des venues décamétriques), que par la taille, la couleur, la structure et la paragénèse des ponces (absence de quartz, d'olivine, d'amphibole).

Tous les niveaux étudiés attribués à l'affleurement à l'événement de Pintade, présentent les mêmes caractéristiques géochimiques, avec cependant quelques différences en ce qui concerne les niveaux de Rocroy (n° 7):

- 1. les feldspaths, en observation microscopique sont en individus souvent automorphes et renfermant des inclusions de clinopyroxènes, magnétites et verres. La composition des plagioclases s'étend de An55 à An90 (fig. 62);
- 2. les pyroxènes présentent des compositions groupées entre clinopyroxènes (fig. 63 et 64);
- 3. les oxydes de Fe-Ti sont uniquement des magnétites (fig. 65). Aucune ilménite n'a été analysée ;
- 4. les verres inclus dans les minéraux ou dans la mésostase ont des compositions relativement groupées, avec des teneurs en SiO élevées, supérieures pour la plupart à 70 %. (fig.55)

Les ponces de Rocroy (n°7) présentent des feldspaths de composition plus groupée que les autres ponces. Les orthopyroxènes sont moins magnésiens, les clinopyroxènes légèrement plus ferrifères. Ces ponces ne semblent pas appartenir à l'ensemble des ponces attribuées à l'événement de Pintade.

Les diagrammes de variations des compositions minérales montrent des lignées distinctes des autres groupes et compatibles avec une même parenté magmatique.

```
10 * 0.40 * 0.40 * 0.40 * 0.40 * 0.50 * 0.11 * 0.50 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60 * 0.60
```

1:coeurs des phénocristaux ; 2:bordures des phénocristaux zonés et phénocristaux non

```
1 90 112
* 1(4) * 1(AD)* 1(AD)* 2(13)* 2(AD)* 2(AD)* 3(A)* 3(AB)* 3(AD)*
$\frac{8102}{6102} \cdot \frac{54.28}{29.04} \cdot \frac{53.49}{29.38} \cdot \frac{53.25}{5.28} \cdot \frac{52.57}{5.5.48} \cdot \frac{52.57}{5.5.718} \cdot \frac{50.234}{50.200} \cdot \frac{29.04}{29.04} \cdot \frac{29.49}{29.308} \cdot \frac{29.59}{30.398} \cdot \frac{30.008}{30.008} \cdot \frac{27.18}{27.218} \cdot \frac{31.348}{31.348} \\
\text{FEO} \cdot \cdot \frac{0.97}{0.988} \cdot \frac{0.048}{0.038} \cdot \frac{0.498}{0.048} \cdot \frac{0.528}{0.528} \cdot \frac{0.528}{0.528} \cdot \frac{0.528}{0.088} \cdot \frac{0.088}{0.088} \cdot \frac{0.988}{0.088} \cdot \frac{3.988}{0.188} \cdot \frac{3.988}{0.188} \cdot \frac{3.988}{0.088} \cdot \frac{3.988}{0.088} \cdot \frac{0.088}{0.088} \cdot \frac{0.088}{0.
 AN 2 * 60.56* 50.39* 64.50* 60.40* 55.11* 65.15* 64.03* 55.50* 70.17*
```

H901A * 1(3) * 1(AB)* 1(AN)* 2(10)* 2(AB)* 2(AN)* 3(3) * 3(AB)* 3(AN)* \$102 \times \frac{51.05}{51.05} \times \frac{51.35}{51.35} \times \frac{54.92}{54.92} \times \frac{54.72}{54.92} \times \frac{52.76}{52.33} \times \frac{53.33}{54.54} \times \frac{54.54}{54.92} \times \frac{52.76}{52.76} \times \frac{53.33}{53.33} \times \frac{54.54}{54.54} \times \frac{54.92}{52.52} \times \frac{52.76}{52.33} \times \frac{53.33}{54.54} \times \frac{54.52}{54.54} \times \frac{54.52}{54.92} \times \frac{52.76}{52.52} \times \frac{53.33}{52.62} \times \frac{54.52}{29.64} \times \frac{54.52}{53.32} \times \frac{54.52}{29.64} \times \frac{54.52}{53.32} \times \frac{54.52}{52.62} \times \frac{54. AN X * 71.27* 70.11* 72.99* 63.20* 59.89* 66.95* 62.99* 60.24* 66.52*

H901E * 1(5) * 1CAB)* 1(AH)* 2(16)* 2(AB)* 2(AH)* 3(A) * 3(AH)* 3(AH)* AN Z * 73.49* 69.59* 84.65* 68.33* 59.35* 78.78* 66.30* 62.45* 73.68*

Moyennes des analyses de plagioclases de F 901 b (carrière Danoy) et de H901 (Rivière des Péres). Tableau 43.

1:coeurs des phénocristaux; 2:bordures des phénocristaux; 3 : microlites; 4:inclusions Les numéros entre parenthèses indiquent le nombre d'analyses. Ab signifie :individu le moins basique; An signifie individu le plus basique.

J.1002.431 * 100 - 100 - 100 - 200 - 200 - 200 - 200 - 300 -\$\frac{8100}{6100} \cdot \frac{94.00}{61.00} \frac{16.75}{61.00} \frac{94.60}{61.00} \frac{16.20}{61.00} \frac{49.50}{61.00} \frac{51.00}{61.00} \frac{92.60}{61.00} \frac{51.20}{61.00} \frac{52.60}{61.00} \frac{92.60}{61.00} \frac{51.20}{61.00} \frac{52.60}{61.00} \frac{50.50}{61.00} \frac{50.50}{61.00} \frac{50.50}{61.00} \frac{50.50}{61.00} \frac{60.50}{61.00} \ Ad 5 - 6.15* SULL* 87.36* 75.71* 69.80* 80.13* 70.92* 56.96* 81.05* | NB | 0x* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | 32* | AH 2 * 50.000 for 18 ob.ba* 54.34* 50.76* 70.02* 60.66* 57.90* 63.30*

\$102 \(\frac{47.401}{47.401} \) 47.481 \(\frac{9.48}{47.401} \) 48.8 \(\frac{9.279}{32.401} \) 53.492 \(\frac{49.49}{47.401} \) 47.481 \(\frac{9.279}{32.401} \) 32.492 \(\frac{9.279}{32.162} \) 30.472 \(\frac{30.279}{32.601} \) 32.572 \(\frac{9.542}{32.31} \) 30.472 \(\frac{29.36}{30.472} \) 29.585 \(\frac{49.479}{32.601} \) 0.557 \(\frac{0.592}{0.592} \) 0.559 \(\frac{0.592}{0.592} \) 0.569 \(\frac{0.799}{0.001} \) 0.549 \(\frac{40.992}{0.001} \) 0.014 \(\frac{0.014}{0.001} \) 0.066 \(\frac{0.049}{0.001} \) 0.066 \(\frac{0.049}{0.001} \) 0.067 \(\frac{0.049}{0.001} \) 0.068 \(\frac{0.049}{0.001} \) 0.068 \(\frac{0.049}{0.001} \) 0.058 \(\frac{11.49}{0.101} \) 1.1581 \(\frac{3.964}{0.001} \) 4.583 \(\frac{3.114}{0.101} \) 4.472 \(\frac{4.964}{0.001} \) 1.162 \(\frac{0.054}{0.001} \) 0.058 \(\frac{0.054}{0.001} \) 0.059 \(\f AN X * 75.95* 71.52* 85.72* 64.10* 58.76* 71.52* 59.45* 55.09* ▼ 1(3) * 1(AB)* 1(AH)* 2(3) * 2(AB)* 2(AH)* 3(6) * 3(AB)* 3(AB)* \$\frac{1}{64.203}\$\$ \$51.13\times \frac{52.99\times 48.77\times 49.80\times 50.70\times \frac{48.60\times 50.65\times 52.80\times 49.54\times 54.20\times 64.203\times 30.97\times 29.76\times 32.57\times 31.58\times 31.26\times 32.26\times 31.34\times 30.11\times 30.11\times 33.60\times 49.54\times 10.60\times 0.60\times 0.60\time AH % * 69.93* 61.50* 78.28* 74.28* 69.59* 78.56* 71.20* 64.77* 06.325

3320ア/Ect * 1(8) * 1(AB)* 1(AB)* 2(S) * 2(AB)* 2(AB)* **§**(1) * **§**(1) *

Tableau 44. Moyennes des analyses des plagioclases de J 1007 (Rivière Noire), de D 1204 (Rocroy) et de 7A (Calbassiers). Même l'égende que pour le tableau 43.

	des phénocristaux;2:bordures des ph facies rubané, partie foncée [14] * 1(an)* 1(an)* 2(a) * 2(au)* 2(an)* 51.27* 51.57* 50.87* 51.44* 54.26* 50.95 30.57* 30.15* 31.60* 30.91* 30.91* 30.90 5.53* 0.47* 0.40* 0.40* 0.60* 0.60*	0.004 0.007 0.007 0.007 12.234 14.234 13.734 13.254 12.234 13.234 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.254 13.255 13.254 13.255 13.254 13.255	1, 1508 1, 15.68 1, 1798 1, 12.519 1, 15.19 0, 9518 1, 1.1508 1, 15.68 1, 1798 1, 12.528 1, 15.19 0, 0.9518 1, 1.1508 1, 15.68 1, 1.2508 1, 1.2508 1, 1.2508 1, 1.2508 1, 0.0508 0, 0.0508
### 1 (6.5 % 1 (All 13 % 1 (Al	facies rubané, partie claire facies rubané, partie	2. 31. (1.03) (1.04) (1	HIGH TO JOES 1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-100

	F 901 b							Н 9	901 a		Н 901 Ь					
	1(4)	I (-MG*	L(+MG*	2(4) *	2(-MG*	2(+MG*	1(9) +	1 (-MG *	1 (+MG*	2(1) ¥	1(4) *	1(-MG*	1 (+MG +	2(3) *	2(-MG*	2(+MC
3105 +	52.63*	54.04*	53.17*	52.63*	52.45*	52.76*	53.38*	52.54*	54.16*	51.40*	52.71*	52.79*	52.43*	52.624	52 40*	50 40
AL.203*	1.09×	1.10*	1.02*	1.09*	1.01*	0.38*	0.39*	0.33*	0.91*	0.36×	0.93*	1.03*	0.35*	0.93*	0.27*	0.04
FEO *	24.66*	24.49*	24.78*	24.66*	25.17*	24.50*	22.35*	23.43*	21.51*	23.21*	24.22*	24.46%	27. 244	73 73%	74 154	27 54
MNO *	0.70*	0.71*	0.71*	0.90*	0.70*	0.71*	0.36*	0.74*	0.70*	0.75*	0.35*	0.72*	0.79*	0.91*	1.08*	0 92
460 4	20.17*	19.73*					21.44*	21.09*	22.34*	29.75*	17.39*	12.53*	20-078	20. 30*	19.34*	70.79
	1.42*			1.42*		1.38*	1.53*	1.57*	1.58*	1.44*	1.45*	1.56*		1.43*		
	0.06*			0.06*	0.00*	0.04*	0.04*	0.01*	0.04*	0.06*	0.07*					
(20 *	0.01*	0.04*	0.00*	0.01*	0.00*	0.01*	0.00*	0.00*		0.00*	0.02*			0.02*		
1102 *	0.20*	0.19*	0.25*	0.20*	0.23*	0.19*	0.20*	0.20*	0.24*	0.23*	0.20*		0.174			0.16
SR203*	0.01*	0.00*	0.00*	0.01*	0.00*	0.00*	0.01*	0.00*	0.03*	0.00*	0.00*		0.00*			0.02
IR HYX	5*	5¥	5*	5 *	5*	5×	232	1925			100					
	1.965*						6*			6×	6*				5*	
¥ .14	0.048×	0.0498	2 0445	0.0408	1.9/24	1.956*		1.764*			1.730*	1.731-	1.989*	1.277*	1.979*	1.977
E3 *	9.000*	3.000*	0.044*	0.048*	0.045*	0.038*		0.037*			0.041*	0-045*	0.030*	0.041 *	0.041*	0.042
	0.757*	0.757*	0.000*	0.000*	0.000*	0.000*		0.000*							0.000*	
	0.028*	0.733*	0.703*	0.7074	0.709*	0./58*		0.730*			0.758*	0.765*	0.732+	0.742#	0.757*	0.730
	1.131*	1 0234	1 1478	1 171*	1.0274	0.029*		0.030*			0.0275	0.023*	0.025*	0.029*	0.034*	0.025
	0.057*	0.0574	0.0544	0.0578	0.047*	0.0558		1.103*			1.121*	1.099%	1.133#	1.1424	1.1174	1.149
4 A	0.004*	0.001*	0.034*	0.03/4	0.002*	0.055*		0.063*			0.058*	0.033*	0.058*	0.059*	0.0594	0.060
	0.000*	0.007*	0.001*	0.004	0.000*	0.003*		0.001*			0.005*	0.0064	0.002*	0.0014	0.004*	0.000
	0.006*	0.005*	0.000*	0.000*	0.000*	0.000*		0.000*			0.001*	0.001*	0.002*	0.001*	0.0014	9.000
	0.000*	0.000*	0.000*	0.000*	0.000*	0.005*		0.006*			0.006×	0.008×	0.005+	0.005*	0.004	0.005
'R +	0.000*	0.000#	0.000*	0.000*	0.000*	0.000*		0.000*							0.000*	
	58.7*	50.3*	59 2*	5.000×	57 78	0.000×	0.000*				0.000*	0.000*	0.000*	0.000#	0.000×	0.001
		00.3	21.2	30.75	37.3*	37.57	51.7*	60.9*	.34.4*	51.7*	58.11*	58.3*	50.0*	59.74	58.34	30.1

	T 1	1007	/A1							T 10) (7 / D /	,				
			,) 10	007/B2	4		7A	0.	
. 3 . 7	- 3	(nt;*	1(HnG*	4(4) *	2 :-dG*	2(+MG*	3 (1) *	2 (-MG*	1 (HMG*	1 *	1 *	3 : •	4:1 -	2 /3) *	2 (-mg*	1 CHIC
Milo * 0.5	14* 11* 2 14* 2 14* 15* 16*	0.74* 3.79* 1.07* 7.76* 1.52* 0.00* 0.00*	0.70* 22.04* (.94* 22.20* 1.44* 0.01* 0.00* 0.10*	0.38* 21.80* 0.72* 22.26* 1.49* 0.02* 0.01* 0.21*	0.88* 22.57* 0.73* 21.64* 1.48*	0.33* 20.37* 0.36* 23.29* 1.38* 0.00* 0.00*	0.71* 21.05* 0.74* 21.36* 1.69* 0.01* 0.00* 0.14*	0.74* 22.34* 0.77* 20.35* 1.58* 0.05* 0.10*	0.32* 22.20* 0.35* 21.33* 1.53* 0.00* 0.02*	1.44* 21.75* 0.71* 21.70*	1.04* 23.23* 0.39*	1	0.05* 0.00* 10.70* 1.67* 0.02* 0.04* 0.17*	1.14* 22.23* 0.87* 20.43* 1.50* 0.05* 0.02*	0.04* 0.05* 0.07*	0.06* 21.31* 9.36* 21.32* 1.44* 0.04* 0.00*
S1 + 1.07 AL + 0.03 FED + 0.00 FEP + 0.1 HM + 0.00 HG + 1.17 CA + 0.00 NA + 7.00 K + 0.00	17* 0 10* 0 12* 0 17* 0 17* 0 12* 0 12* 0	.973* .342* .060* .751* .034* .125* .062* .300*	1.768* 0.034* 0.000* 0.029* 1.235* 0.057* 0.001*	1.967* 0.038* 0.000* 0.671* 0.029* 1.234* 0.059* 0.001*	1.768* 0.038* 0.000* 0.697* 0.031* 1.203* 0.059* 0.004* 9.001*	1.974* 0.038* 0.000* 0.534* 0.025* 1.274* 0.054* 0.000*	1.996* 0.040* 0.000* 0.554* 0.023* 1.195* 0.068* 0.001*	1.787*	1.780* 0.036* 0.000* 0.692* 0.027* 1.200* 0.063* 0.000*	0.063* 0.000* 0.681* 0.022* 1.223* 0.066* 0.003* 0.002*	1.757* 0.046* 0.000* 0.727* 0.028* 1.132* 0.063* 0.007* 0.007*	0.040* 0.000* 0.771* 0.027* 1.101* 0.058* 0.008*	1.989* 0.050* 0.090* 0.768* 0.025* 1.090* 0.069* 0.001*	1.283* 0.051* 0.000* 0.701* 0.028* 1.157* 0.061* 0.004*	6* 1.796* 0.033* 0.000* 0.736* 0.030* 1.123* 0.064* 0.003* 0.002*	1.772* (.voo 0.000* 0.671* 0.027* 1.172* 0.058* 0.003*
P + 0.30	90 1 0	.000*	1.000*	0.000*	0.000+	0.000*	0.000*	0.000*	0.000*	0.000*	0.000* 0.000* 41.0*	0.000*	0.000*	0.000*	0.002* 0.000* 0.006* 59.5*	0.000*

Tabeau 46 . Moyennes des analyses d'orthopyroxènes de F 901 b (carrière Danoy), de H 901 (rivière des Pères), de J 1007 (rivière Noire) et de 7A(Calbassiers). Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'analyses.

1:phénocristaux (individus non zonés); 2: microlites ; 3:coeurs des phénocristaux ; 4:bordures des phénocristaux; 5:inclusions.

P 401 b

(1150* 1: 46* 1(+46* 2(8) * 2(-46* 2(+46* 3(4) * 3(-46* 3(+46* \$3.67* \$2.29* \$3.31* \$3.15* \$2.37* \$3.30* \$3.34* \$5.29* \$3.46* \$0.30* \$0.37* \$0.39* \$0.22* \$0.95* \$1.15* \$1.25* \$1.07* \$0.38* \$2.37* \$24.38* \$22.41* \$24.73* \$20.36* \$21.19* \$22.31* \$21.75* \$2.20* \$0.99* \$0.34* \$0.92* \$0.98* \$0.34* \$0.39* \$0.27* \$0.36* \$2.21* \$21.75* \$2.20* \$20.20* \$21.10* \$21.75* \$1.25 * 1(-nG* 1(4nG* 2(5) * 2(-MG* 2(4NG* 1(-MG* SID: * \$3.12* \$2.39* \$2.55* \$2.13* \$2.73* \$3.12* \$61.20* \$0.39* \$0.53* \$1.00* \$1.08* \$0.37* \$0.37* \$1.20* \$2.40* \$0.53* \$1.00* \$1.08* \$0.57* \$0.37* \$1.00* \$1.08* \$0.57* \$0.37* \$1.00* \$1.08* \$0.57* \$1.00* \$1.08* \$0.57* \$1.00* \$1.08* \$0.57* \$1.00* \$1.08* \$1.00* \$1.20* \$1.70* \$1.12* \$1.14* \$1.11* \$1.22* \$1.00* \$1.14* \$1.11* \$1.22* \$1.00* \$1.14* \$1.11* \$1.22* \$1.00* \$1.40* \$1.40* \$1.40* \$1.40* \$1.55* \$1.40* \$1.56* \$1.40* \$1.60* \$1.40* \$1.60* \$0.05* \$0.00* \$0.05* \$0.00* \$0.00* \$0.00* \$0.00* \$1.00* \$1.00* \$0.00* \$0.00* \$0.00* \$0.00* \$1.00* \$1.00* \$0.00* \$

P 401 a	partie claire	partie sombre

P 401 b

Control of the Contro			-		
	45 - 5T. s) + 2(-MG* 2(+MG* 3(1) *
* 1 * 2(3) * 2(-MG* 2(+MG* 3 \$102 * 53.27* 53.33* \$2.78* \$3.33* \$ \$1203* 0 07* 0.55* 0.52* 0.31* FEO * 22.22* 23.52* 23.99* 23.36* 2 MNO * 0.30* 1.00* 1.20* 1.00* MNO * 0.30* 1.00* 21.19* 2	3.74* 52.11* 51.31* 0.52* 1.31* 0.68* 22.72* 21.56* 22.18*	53.03* 53.33* 53 0.69* 0.65* 0 21.76* 23.52* 21	3.67* 53.77* 54.29* 0.69* 0.55* 0.78* 1.70* 22.28* 22.61* 0.83* 0.94* 0.85* 1.67* 21.67* 21.64*	53.84* 53.84* 54. 0.10* 0.75* 0.75* 0. 22.80* 22.63* 22.63* 22. 1.00* 0.79* 0.79* 0. 21.23* 21.23* 21.	0.67* 0.65* 0.71* 64* 0.67* 22.07* 22.10* 27* 22.34* 22.07* 22.10* 36* 0.36* 0.36* 0.75* 52* 21.10* 21.47* 21.63* 1.33* 1.22* 1.42*
MH0 + 0.30° 1.04° 20.19* 21.19* 21.07	20 44* 19.97* 20.00	1.72* 1.25* 0.02* 0.03* 0.03* 0.01* 0.29* 0.07*	1.50* 1.25* 1.47* 0.05* 0.93* 0.97* 0.06* 0.90* 0.90* 0.00* 0.97* 0.13* 0.00* 0.90* 0.90*	1.38* 1.43* 1.43* 0.00*	0.04 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NB 0X* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5*	2.004 0.059 0.0318 0.000* 0.000* 0.000* 0.706* 0.684* 0.717* 0.224* 0.028* 0.028* 1.164* 1.141* 1.164* 0.01* 0.075* 0.055 0.001* 0.000* 0.000 0.003* 0.005* 0.003 0.000* 0.000* 0.000	1.790* 1.795* 1 10.030* 0.029* 1 0.000* 0.000* 1 0.000* 0.733* 1 0.330* 0.033* 1 1.177* 1.147* 1 0.069* 0.050* 1 0.001* 0.002* 1 0.001* 0.000* 1 0.000* 0.000* 1 0.000* 0.000* 1	6* 6* 6* 6* 6* 6* 1.98* 1.994* 1.993* 1.993* 0.034* 0.034* 0.034* 0.0034* 0.0034* 0.0034* 0.0034* 0.023* 0.023* 0.023* 0.023* 0.023* 0.056* 0.056* 0.056* 0.004* 0.000	0.051 0.052 0.004 0.009 0. 1.701* 0.097* 0.346* 0. 1.701* 0.057* 0.070* 0. 1.174* 1.177* 0.150* 1. 0.051* 0.057* 0.069* 0. 0.051* 0.007* 0.099* 0. 0.000* 0.000* 1.000* 0. 0.000* 0.000* 1.000* 0. 0.000* 0.000* 1.000* 0.	67 1.9954 2.009* 1.979* 0.029* 0.021* 0.021* 0.000*

Fig. 47 . Moyennes des analyses d'orthopyroxènes de D 1204 (Rocroy), de X 901 (anse à la Fontaine), et de P 401 (anse du Morne Rouge). Même légende que pour le tableau. 46

D 1204	7A	P 401 a	P 401 b	P 401
4(-CA 4(+CA* \$(3) * \$(-CA* \$(+CA* \$(-CA* \$	1(1) * 3(3) * 3(-CA* 3(+CA* 51.73* 51.98* 52.48* 51.52* 1.36* 1.70* 1.70* 1.73* 11.44* 11.22* 10.33* 11.38* 0.46* 0.53* 0.50* 0.45* 12.33* 13.37* 13.49* 12.32* 19.47* 19.41* 17.33* 19.92* 0.03* 0.20* 0.36* 0.23* 0.00* 0.41* 0.32* 0.41* 0.59* 0.00* 0.41* 0.59* 0.00	51. 10* 52. 17* 1. 1. 1. 1. 11* 10. 15* 10. 15* 9. 55* 0. 53* 12. 18* 17. 57* 21. 18* 21. 52* 3. 26* 9. 77* 0. 00* 9. 03* 0. 00* 9. 00* 0. 00* 9. 00*	1(1) * 50.25* 31.34* 0.49* 0.01* 0.00* 14.32* 2.29* 0.06* 0.00*	9: 5 1).4 3(1) 5 50.05 50.105 50.505 50.505 50.105 50.105 50.055 50.105 50.105 50.055 50.105 50.055 50.105 50.055 50.105 50.055 50.055 50.055 50.055 50.055 50.055 50.055 50.055 50.005 50.005
NB DX*	64 64 64 1.938 1.968 1.9738 1.9524 0.0614 0.0774 0.0758 0.0778 0.0078 0.0078 0.0008 0.0008 0.0008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.0784 0.0784 0.788 0.008 0.7044 0.7784 0.908 0.008 0.704 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.008	1.74 1,967 4,967 0,065 0,068 0,068 0,007 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,007 0,017 0,007 0,017 0,007 0,017 0,007 0,017 0,007 0,017 0,007 0,017 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,000 0	68 1.722* 1.264* 0.000* 0.014* 0.000* 0.544* 0.198* 0.003* 0.000* 0.000*	3* 7,* 7,* 1,267* 0.041* 0.050* 0.065* 0.065* 0.065* 0.065* 0.065* 0.065* 0.065* 0.065* 0.065* 0.065* 0.065* 0.065* 0.065* 0.055* 0.015* 0.017* 0.771* 0.751* 0.751* 0.751* 0.751* 0.015* 0.015* 0.015* 0.015* 0.015* 0.015* 0.015* 0.015* 0.015* 0.015* 0.015* 0.015* 0.0015* 0.0015* 0.0015* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*
HE * 20.05* 20.43* 20.02* 20.27* 20.25*	41.77* 41.93* 41.69* 42.33* 38.42* 39.03* 39.94* 37.36* 19.31* 19.04* 13.37* 20.30*	35.81* 41.92* 37.94* 78.15* 17.85* 16.93*	78.12* 0.00* 1.38*	45.53* 41.29* 43.47* 36.14* 39.30* 40.14* 11.33* 17.33*
CA * 42.03* 41.78* 42.34* 41.69* 42.56* MG * 37.72* 37.55* 37.45* 37.35* 36.75* FE * 20.26* 20.67* 20.21* 20.46* 20.48*	41. 70* 41. 20* 90. 35* 41. 33* 38. 47* 39. 46* 40. 51* 37. 69* 19. 33* 19. 25* 18. 64* 20. 46*	44.49° 94.30° 38.30° 32.57° 17.21° 17.12°	77.44* 0.00* 2.56*	45.89* 40.51* 42.30* 37.35* 59.9** 49.50* 18.75* 17.56* 16.54*
	v			
F 901 b	Н 90)1 a	Н 901 Ъ	
* 1(5) * 1(-CA* 1(+CA* 2(1)	* 3(1 - * 1(3) * 1(-20* 1(4	-CA* 2(1) * 3(2) *	1(-CA* 1(+CA*	_
SIO2 # 52.33* 52.49* 52.66* 52.50 AL203* 1.35* 1.62* 1.27* 1.54 FEO * 12.34* 12.69* 12.24* 12.00 MNO * 0.58* 0.56* 0.69* 0.64 MGO * 13.34* 13.42* 13.09* 13.91 CAO * 17.71* 19.13* 20.20* 19.67 NA20 * 0.29* 0.32* 0.26* 0.25 K20 * 0.01* 0.00* 0.02* 0.32* TIO2 * 0.20* 0.24* 0.22* 0.35 CR203* 0.01* 0.00* 0.00* 0.00*	1.07* 1.05* 1.56* 1. 1.05* 1.56* 1. 1.73* 11.73* 11.73* 11.73* 11.73* 11.73* 11.73* 11.73* 11.73* 11.73* 11.73* 11.73* 11.73* 11.74* 13.76* 1	.01* 12.76* 12.27* 47* 0.58* 0.50* .67* 13.27* 13.33* .53* 17.60* 17.68* .25* 0.36* 0.30* 000* 0.00* .38* 0.56* 0.45*.	52.63* 52.65* 1.22* 1.31* 11.74* 11.75* 0.53* 0.53* 13.95* 12.75* 19.23* 19.35* 0.27* 0.26* 0.02* 0.02* 0.30* 0.40* 0.02* 0.01*	*
SI * 1.267* 1.266* 1.272* 1.25. AL * 0.060* 0.071* 0.056* 0.06 FE3 * 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.00 FE2 * 0.336* 0.396* 0.322* 0.32. HN * 0.013* 0.013* 0.022* 0.02 MG * 0.752* 0.754* 0.738* 0.77 CA * 0.794* 0.753* 0.011* 0.73 HA * 0.020* 0.023* 0.017* 0.016 K * 0.000* 0.000* 0.001* 0.006* 0.01 FI * 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.001 CR * 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000 CR * 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000	## 1.700* 1.755* 1.7979* 1.7 ## 0.000* 0.0072* 0.0067* 0.1 ## 0.000* 0.000* 0.000* 0.1 ## 0.775* 0.015* 0.017* 0.0 ## 0.775* 0.778* 0.778* 0. ## 0.016* 0.017* 0.003* 0.1 ## 0.016* 0.018* 0.017* 0.0 ## 0.016* 0.018* 0.018* 0.0 ## 0.000* 0.001* 0.0 ## 0.000* 0.001* 0.0 ## 0.000* 0	5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5* 5	5* 5* 1.771* 0.054* 0.080* 0.000* 0.000* 0.000* 0.367* 0.108* 0.774* 0.774* 0.779* 0.001* 0.018* 0.017* 0.001* 0.001* 0.001* 0.001* 0.001* 0.001* 0.001* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*	
LE BAS CA * 41,32* 40.38* 42.16* 40.73 MC * 38.15* 38.49* 37.34* 39.36 FE * 20.54* 21.13* 20.50* 19.87	(* 40.5°* 79.72* 40.05* 39	. 0* 41.15* 41.29* .44* 37.75* 36.29* .37* 21.10* 20.42*	40.55* 42.57* 39.83* 37.35* 12.42* 20.08*	
D.H.Z CA * 40.69* 39.66* 41.57* 40.10 HG * 38.55* 38.96* 37.72* 37.74 FE * 20.76* 21.38* 20.71* 20.00	0.1)* 57.36* 40 57.41.04* 10.10* 40.51* 57	.03* 90.36* 40.63* .91* 50.36* 30.72* .50* 21.30* 20.65*	39.70* 41.97* 40.25* 37.74* 19.30* 20.29*	

Tableau 48 . Moyennes des analyses de clinopyroxènes de D 12 04 (Rocroy), de 7A (Calbassiers) de P 401 (anse du Morne Rouge), de F 901 (carrière Danoy) et de H 901 (rivière des Pères).

Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'analyses.

1:phénocristaux non zonés ; 2:microlites ; 3:inclusions ; 4:coeurs de phénocristaux ; 5:bordures des phénocristaux.

-CA signifie individu le moins calcique ; +CA signifie individu le plus calcique.

	-								
						J100	07	7A1	
J 1 0	1)	7/62	•	V120 - 12-12-13		*	2	(-CA+	Streat.
	*	1 (1) *	1 (-CA*	I (+Ca*	2(1) *				000 -000
		100000	000 00000		F/3 . 0.8	3102	5	2.71*	52.03*
5.112	*	50.30*	51.55*	50.71	52.00	AL203	•	1.50*	1.5
AL 30:	Ç.4	1.36		1.73*		FF.O ?	. 1	0.60*	11.01-
FED			13.12*	12.32*		MNO		0.57*	0.50
OHM		0-494		0.53*		HG0	÷ 1	4.01*	13. "3"
			13.50*	13.758	13.43*	CAO	* 2	0.44*	20. 79-
CAO	W		19.17*	19.78*	19.51*	NA20	*	0.24*	0
- NA.10	+	0.31*		0.31*			*		0.00*
K20	*	0.01*	0.01*	0.01*	0.17*		*	0.38*	0. 0.
TI::2	*	0.41*	0.42*	0.47*		CR203	*	0.00*	0.00*
CR20	3*	0.00*	0.00*	0.00*	0.00#				
						ND UA	*	5*	
NO O	¥ #	o.*	5.4	6.4	5*	SI		1 941*	1.95
31	*	1.723*	1.741*	1.213*	1.976*	AL	+	0.073*	0.070*
AL.	4	6.033*	6.081*	0.086	0.046*	FE3		0.000*	0.000*
FET		0.000*	0.000*	0.000*	0.000*				0.3414
1 F		0 6035	0.411*	0.391*	0.371*				0.0174
MH	*	2.0168	0.015*	0.017*	0.033*	MG			0.734
MG	4	0.773*	0.751*	0.730*	0.750*	EA.		0.777	0.8278
Co		3 7064	0.772*	0.310*	0.7894		_	0.014	0.017
NA	· ·	A A274	0.005*	0.023*	0.023*	HA			0.000*
16		0.000#	5.000*	0.000*	0.009*	K)			0.003*
11	4	0 0124	0.012*	0.013*	0.004*	11			0.000*
Ρ.	*	0.000*	0.000*	0.000*	0.000*	P			0.000*
CK		0.000*	0.000*	0.000*	0.000*	CR		0.000	0.000
LE BI	. 41					LE BAS	5	40 514	42.93*
Ca		40 7.14	40.20*	41.22*	41.38*	CA			38.38
mi	234	39 748	38.35×	33.51×	38.25*	MG			18.13*
FF		30.70	21 468	20.17	20.34*	FE		1/.00	18.15
		20.79	~~.	20		D.H.Z			
D.:1.	•	70	30 614	40.54	40.41*	CA	*	41.73	42.43*
f.A		70 204	10 95	17.04	38.39*	MG			39.234
MG		37.22	20.00	20 40	* 20.70*	FE	*	17.83	18.34
FE		21.17	/ M	20140					

Tableau 49 . Moyennes des analyses de clinopyroxènes de J 1007 (rivière noire) 1:phénocristaux; 2:microlites.

	P 4 partie	01 b clair	e	1	P partie	401 b foncé	e	_	P 401 a
	3 (5) * ∃	3 (-FF*	3(1FE*	4(1) * 3	S (4) *	3(-FE* 3	(+FE* 4	·(1) *	,
*.102 * nl 203* 11.0 * nido * nido * tino *	0.154 2.214 76.024 0.478 1.038 0.028	0.25* 2.36* 72.19* 0.38* 1.91* 0.06* 0.70*	0.04* 1.96* 77.67* 0.55* 1.79* 0.01*	0.20* 2.34* 77.78* 0.40* 1.61* 0.05*	0.19* 2.68* 74.92* 0.46* 2.12* 0.04* 0.03*	0.23* 2.64* 73.57* 0.49* 2.09* 0.00* 0.00* 11.48*	0.16* 2.40* 77.45* 0.44* 1.74* 0.05* 0.00* 0.03*	0.27* 2.20* 75.82* 0.57* 2.23* 0.00* 0.00*	3.1.4 2.114 3.144 0.458 1.658 0.018 0.508 0.508 0.508 1.478 0.008
HR DX:	0.021 0.021	0.00°*	0.00# 32# 0.014*	0.00	0.01* 32* 0.068*	0.084*	0.00* 32* 0.056* 0.772*	32* 0.095* 0.908*	32* 0.228* 0.027*
OL CE3 FE2 HO	* 0.931* * 0.000* *72.382* * 0.142* * 0.993*	1.063 9.000# 22.267# 0.119# 1.061*	0.000* 0.000* 0.164* 0.740*	0.000* 23.897*: 0.125* 0.890*	0.000* 2.399*2 0.137* 1.141*	0.000* 22.471*3 0.152* 1.150*	0.000* 22.672* 0.131* 1.022*	0.000* 22.154* 0.167* 1.173* 0.000*	0.000* 22.433* 0.137* 0.095* 0.004*
KA NA K	* 0.903* * 0.000* * 0.130* * 0.050* * 3.295* * 0.000* * 0.006*	0.0248 0.445* 0.741* 3.157*	0.000# 0.000# 3.389*	0.057* 0.000* 2.605*	0.021* 0.009* 3.226*	0.000* 0.023* 3.157*	0.000* 0.013* 3.275* 0.000*	0.000* 0.000* 3.477* 0.000*	0.000* 0.000* 3.115* 0.000*
REPART	FLR CAR * 41.58* * 38.60*	39.079 39.079 36.319 36.31	42.26 ⁹ 39.66 ⁹ 37.7	45.39* 36.48* 29.7*	41 204	40.76* 36.70* 35.7*	42.46* 39.24* 36.7*	40.79* 39.11* 39.3*CARMICH	62.51* 67.963* 9E 55.1* 1 51.1

Tableau 50 . Moyennes des analyses de magnétites de P 401 (anse du Morne Rouge). Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mesures. 1:phénocristaux , microlites et inclusions . 2:phénocristaux ;3:microlites ; 4: inclusions.

> -FE signifie individu ayant la teneur en fer la moins élevée; +FE signifie individu ayant la teneur en fer la plus élevée.

Н 901 а	Н 901 Ъ	F 901 b	F 901 b	J 1007 / A1
GEV				-
* 1(9) * 1(FL* 1()FES*	1(7) * 1(-FE* 1(-FE*	1(7) * (1-FE*)(+FE*	1(10)* 1(-FF* 1/+FF* 1	2. FE* & FFF* 3 (-FE* 3 (+FE*
SID2 * 0 27* 0 tot 0 #*	3 80 8 4			
SI02 * 0.27* 0.34* 0.25* AL203* 2.58* 2.13* 2.00*			0.21* 0.20* 0.27* 0.63*	0.21* 0.19* 0.22* 0.15*
FEO * 77.51* /4.718 79 748	77 478 77 718 70 708	2.56* 2.71* 2.45*	2.28* 2.39* 2.51* 2.11*	2.66* 2.80* 2.93* 2.92*
FEO * 77.51* /4.71* 79.76* MNO * 0.50* 0.30* 0.60*	0.52* 0.55* 0.51*	77.38* 72.25* 79.59*	79.06* 78.73* 79.99* 76.14*	74.12* 76.99* 75.73* 75.12*
	1.83* 1.63* 1.98*	V. 33" U. 45" U. 51*	0.57* 0.60* 0.56* 0.45*	1.58* 0.48* 0.53* 0.27*
CAO * 0.05* 0.00* 0.53*	0.01* 0.02* 0.00*		1.51* 1.60* 1.45* 1.65*	2.07* 2.00* 2.12* 1.64*
MACO * 0.03* 0.07* 0.11*	0.00* 0.00* 0.00*	0.01* 0.01* 0.01*	0.01* 0.01* 0.00* 0.01*	0.00* 0.00* 0.00* 0.05*
			0.01* 0.02* 0.04* 0.00*	0.03* 0.00* 0.01* 0.00*
			0.02* 0.04* 0.02* 0.00*	0.00* 0.04* 0.00* 0.00*
CR203* 0.04* 0.11* 0.02*	0.00* 0.00* 0.03*	0.01# 0.02% 0.00%	12.71* 12.54* 11.58* 11.49*	11.96* 11.73* 12.79* 10.73*
		0.01 0.02 0.00*	0.01* 0.00* 0.00* 0.00*	1.00* 0.00* 0.04* 0.01*
in des				
MB 0X* 32* 32* 32*	32* 32* 32*	32* 32* 32*	32* 32* 32* 72*	
AL * 1.062* 0.202* 1.161*	0.007* 0.398* 0.079*			32* 32* 32* 32*
FE3 * 0.000* 0.000* 0.000*	1.073* 1.067* 1.099*	1.069* 1.155* 0.784*	0.073* 0.070* 0.094* 0.228* 0.931* 0.978* 1.030* 0.897*	0.085* 0.067* 0.077* 0.055*
FE *32 FORMAR 0.000* 0.000* (0.000* 0.000* 0.000*	0.000* 0.000* 0.000*	0.000* 0.000* 0.000* 0.000*	1-111* 1-165* 1-208* 1-213*
162 *22.599*22.580*23.424*23 MN * 0.163* 0.11/- 0.179* (2.024*22.839*22.761*2	2.965*21.815*22.638*	2.366*22.821*27 250*20 077*	9.000* 0.000* 0.000* 0.000*
MG * 1.018# 0.945* 0.953*	0.155* 0.173* 0.140*	0.165* 0.138* 0.176*	J. 1774 0. 1768 0. 1658 0. 1778	0.000* 0.000* 0.000* 22.525*22.684*22.050*23.183* 0.174* 0.145* 0.156* 0.083*
1 * 3 2048 3 3794 1 2778 3	0.005* 0.005* 0.000*	0.000* 0.000* 0.000*	0.009* 0.018* 0.009* 0.000*	0.021* 0.000* 0.007* 0.000* 0.007* 0.018* 0.000* 0.000*
* 0.000* 0.000* 0.000* 0	2.825* 3.127*	3.165* 3.514* 3.338*	0.009* 0.018* 0.009* 0.000* 3.308* 3.271* 3.030* 3.115* 0.000* 0.000* 0.000*	3 150* 7 118* 0.000* 0.000*
E * 0.011* 0.051* 0.005* 0	0.000* 0.000* 0.000*	0.000* 0.000* 0.000*	3.308* 3.271* 3.030* 3.115* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*	3.000+ 0.000* 3.549* 2.961*
TORT FER CARBUCHAEL	7.000× 0.000× 0.005×	0.003* 0.006* 0.000*	0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.003* 0.000* 0.000* 0.000*	0.000* 0.000* 0.000*
T20.* * 40.03* #4 20* 4	7 7/4 40 408 44 45			0.0034 0.0004 0.0034
FO * * 39.59* 37.74* 7	0 002 75 552 70	42.66* 37.78* 43.15*	42.38* 42.93* 44.37* 42.51* 40.42* 40.09* 39.41* 37.22*	42 25% 12 05% 14 75%
OIL9 * 34.25 26.08	30.17 32.3* 35.4*	35.8* 40.6* 37.7*	37.2* 36.9* 34.0* 35.1*0	33.01* 30.33* 39.10* 37.43* 35.3* 35.3* 39.4* 33.3*CARMICHAE
	51.5° 27.7* 30.8*	31.7* 36.2* 33.6*0	33.44 33.1* 30.4* 31.1*A	35.9* 75.3* 39.10* 37.43* 35.9* 75.3* 28.6* 33.3*CARMICHAE 30.7* 30.6* 33.7* 27.4*ANDERSON
J 1007 / B2	D 1	204	7A	X 901

. 2(5) +2(+FE* 2(-FE*4:(1) *	- 4:11*4:00*4() •	2(-FE* 2(+FE* 3.1). * 4(1) - 2(10)* 2(-FE* 2(+FE* 4(1) *
GIO2 V 0.174 0.224 0.13X 0.23X 0.12X 0.23X 0.12X 0.23X 0.12X 0.23X 0.12X 0.23X 0.12X 0.23X 0.00X 0.11X 0.20X 0.23X	0.02* 0.11* 0.10* 1.54* 2.41* 2.37* 7*.20* 78.45* 78.50* 0.62* 0.01* 0.64* 1.99* 1.53* 1.33* 9.10* 0.03* 0.02* 0.02* 0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 0.04*	0.00* 0.76* 0.80* 0.82* 0.26* 0.10* 0.29* 0.22* 1.83* 2.57* 2.52* 2.92* 2.74* 1.73* 2.73* 2.69* 70.31* 74.13* 72.91* 76.79* 76.54* 73.76* 78.25* 78.47* 1.72* 1.99* 1.52* 1.98* 1.94* 1.29* 1.97* 0.62* 0.08* 0.02* 0.00
PB=00X= 32*	1.080+ 0.974+ 0.2698 0.000* 0.000* 0.0008 21.716*22.449*22.7698 0.185* 0.177* 0.188* 0.271* 0.788* 0.574* 0.972* 0.111+ 0.007* 0.014* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.18* 3.547* 3.495* 3.398* 0.00* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*	32* 32* 32* 32* 32* 32* 32* 32* 32* 32*
11 10.54 93.52* 44.10* 92.16* 92.56* 1716 * 37.93* 77.7* 37.34* 28.06* 1716 * 34.6* 73.7* 35.6* 34.6* 1717 29.6* 29.5* 30.6* 50.6*	78.34% 41.35% 41.35% 79.78% 41.37% 40.92% 41.10 39.7% 38.4%CA 27.50 30.0% 35.1%AN	34.28* 30.97* 40.75* 43.10* 43.08* 39.41* 44.58* 45.77* 39.76* 39.66* 36.23* 38.00* 37.37* 38.29* 38.13* 37.26*

Tableau. 51 Moyennes des analyses de magnétites de H 901(rivière des Pères), de F 901 (carrière Danoy), de J 1007 (rivière Noire), de D1204 (Rocroy), de 7A (Calbassiers) et de X 901 (anse à la Fontaine). Même légende que pour le tableau 50 .

	F 901 b ₂ (n° 2)	F 901 b ₁ (n° 1)
Localisation	Carrière Danoy	Carrière Danoy
Description macroscopique	 fibreuses blanchâtres, pouvant atteindre 10 cm roche porphyrique : phénocristaux de pyroxènes et de plagioclases 	 ponces fibreuses grises, décimétriques roche porphyrique : phénocristaux de pyroxènes plagioclases assez petits.
Description microscopique Plagioclases	- taille inférieure au millimètre - composition An 55-An 70 zonation normale	- automorphes - microlites - composition An 55-An 80, identique en inclusion ou dans la mésostase coeurs An 61 - 76 zonation normale bordure An 60-An 70
Clinopyroxènes	- présents mais non analysés	- taille tout au plus millimétrique minéraux les plus gros de la lame - microlites - composition bien groupée Wo 41 - En 38 - Inclusions de magnétites plagioclases (An 58-60)
Orthopyroxènes	- taille 3-4 mm automorphes - composition centrée autour de En 58 - Inclusion de magnétites	- présents mais non analysés
Magnétites	- maximum ½ mm - composition entre 34 et 37 % d'ulvospinelle	- maximum ½ mm microlites - composition : 35 à 40 % d'ulvospinelle dans la mésostase - inclusion d'orthopyroxènes
Mésostase	- vitreuse - les verres analysés sont inclus dans les plagioclases et les orthopyroxènes composition : autour de 75 % SiO 2	- vitreuse - composition des verres est rhyolitique 70 - 75 % SiO ₂ que ce soit en inclusion (clinopyroxènes, magnétites) ou dans la mésostase

Tableau 52 Evénement ponceux de Pintade

	H 901 b (n° 4)	H 901 a (n° 3)
Localisation	n Rivière des Pères	Rivière des Pères
Description	 ponce grise, décimétrique, assez vésiculée roche porphyrique, avec des phénocristaux de pyroxènes, et plus rares phénocristaux de plagioclases 	- roche noire, scoriacée, décimétrique - roche porphyrique : phénocristaux de plagioclases et de ferromagnésiens
Description microscopique Plagioclases	- taille tout au plus millimétrique, microlites automorphes, peuvent être cassés - composition : An 60 à An 85 - coeur des cristaux : An 70 - An 85 - bordures microlites : An 60 An 80 - zonation normale - groupements mouophasés de plagioclases, polyphasés de plagioclases-orthopyroxènes, plagioclases-magnétites - inclusions de clinopyroxènes et de magnétites	- millimétriques à microlitiques - composition: - plagicolases non zonés: An 60-66 ou An 70-75 - plagicolases zonés: coeur: An 73 périphérie: An 60-66 - groupement plagicolases-clinopyroxènes
Clinopyroxènes	- taille millimétrique - composition Wo 41- En 38 - groupements polyphasés magnétites-clinopyroxènes plagioclases en microcristaux	- taille millimétrique à microlitique - composition : Wo 40- En 37 - 40 - contiennent des plagioclases de composition An 65, et des magnétites
rthopyroxènes	 quelques individus sont millimétriques subautomorphes composition centrée autour de En 58 En 60 Pas de zonation observée. groupements polyphasés d'orthopyroxènes-magnétites Inclusions de magnétites 	- taille maximum 1,5 mm automorphes à subautomorphes - composition : En 60 - En 64 qu'ils soient dans la pâte ou en inclusion - inclusions de magnétites
Magnétites	- peuvent âtre demi-millimétriques à microlitiques - composition : 32 à 36 % d'ulvospinelle groupements polyphasés plagioclases-magnétites	- peuvent atteindre le demi-millimètre. globuleuses, microlites - Composition : de 37 à 39 % d'ulvospinelle
ésostase	- vitreuse - verres rhyolitiques : 69 à 74 % de SiO ₂ - verres inclus dans les orthopyroxènes : 73 % de SiO ₂	- vitreuse - verres rhyolitiques : 69 à 75 % de SiO ₂ - verres dans les plagioclases : 68 - 70 % de SiO ₂

Tableau 53 Evénement ponceux de Pintade

	J 1007/A1 (n°5)	J 1007/B2 (n°6)
Localisation	Rivière Noire	Rivière Noire
Description macroscopique	 ponce blanchâtre, vésiculée, fibreuse pouvant atteindre 10 cm. roche porphyrique à phéno cristaux de plagioclases millimétriques et pyroxènes plus petits 	 ponce grise vésiculée, de taille décimétrique roche porphyrique à petits cristaux de plagioclases et pyroxènes.
Description microscopique Plagioclases	- taille millimétrique à inframillimétrique - composition An 55 - An 85 coeurs An 68 - 80 bordures An 55 - 85 zonation normale pour les individus zonés - groupement plagioclase - magnétite	- taille inférieure au millimètre, automorphes - composition : An 55 - An 85 les coeurs sont plus basiques : An 60 - An 85 les bordures : An 60 - An 70 zonation normale - groupements monophasiques de plagioclases.
Clinopyroxènes	- taille inférieure au demi-millimètre automorphe - composition voisine sur Wo 40-42- En 38-40	- taille inférieure au demi-millimètre - coeurs Wo 40 - 42 - En 40
Orthopyroxènes	- taille ne dépasse pas le ½ millimètre sont automorphes - Composition An 58 à 65	 taille inférieure au demi-millimètre automorphes composition centrée sur En 61
Magnétites	- les plus gros cristaux ne dépassent pas le demi-millimètre composition : 35 % d'ulvospinelle - les inclusions et les cristaux de la mésostase : 35 % à 37 % d'ulvospinelle	 taille inférieure au mm composition uniforme ! 35 % d'ulvospinelle groupements en glomérophyres de magnétites—clinopyroxènes—quartz, de magnétites clinopyroxènes et de magnétites orthopyroxènes.
Mésostase	- vitreuse - composition des verres de 67 à 76 % SiO ₂ dans plagioclases : 68 à 76 % de SiO ₂ dans orthopyroxènes : 70 à 72 % de SiO ₂ dans clinopyroxènes : 71 à 75 % de SiO ₂ dans mésostase : 69 à 72 % de SiO ₂	- vitreuse - composition des verres de 69 à 75 % SiO ₂ dans plagioclases : 72 à 75 % SiO ₂ dans mésostase : 69 à 72 % SiO ₂

Tableau 54 Episode ponceux de Pintade

		14
	7A (n°8)	D 1204 (n° 7)
Localisation	Calbassiers	Rocroy
Description	octe en patine, cassure grise	- ponces, patine rose-brune , cassure grise-beige - structure vésiculée , fluidale, - roche prophyrique ; phénocristaux de pyroxènes millimétriques et de plagioclases millimétriques.
Description microscopique Plugioclases	- automorphes, taille inférieure au mm - composition : An 60 à An 80 coeur An 60 à An 75 bordures et microlites : An 64 à An 80 zonation inverse - Inclusion d'orthopyroxènes et de clinopyroxènes	- peuvent atteindre le millimètre automorphès souvent cassées - composition · An 55 - An 70 coeurs : An 55-66 bordures : An 60 - An 70 zonation inverse. Les microlites ne dépassent pas An 63 - groupements monophasés de plagioclases Inclusion de magnétite
Clinopyroxènes	- taille millimétrique, subautomorphes - composition centrée sur Wo 41 - En 35-40	- atteignent 2-4 mm , automorphes à subautomorphes - composition homogène : Wo. 42-43 En 37 - inclusion de clinopyroxènes
Orthopyroxènes	- taille millimétrique, subautomorphes, - composition centrée sur En 57- En 63 - groupements : orthopyroxènes-plagioclases, - Inclusion de magnétites	 en général plus petits que les clinopyroxènes attéignent toutefois le millimètre composition centrée sur En 56 - 57 groupements monophasés d'orthopyroxènes, polyphasés d'orthopyroxènes-plagioclases
Magnétites	- taille ½ millimètre au maximum globuleuses - composition : de 34 à 47% d'ulvospinelle	- dimension maximum 2 millimètres globuleuses - composition 31 à 38 % d'ulvospinelle
Mésostase	- vitreuse - composition de verres est dacitique de 65 à 68 % de SiO ₂	- vitreuse - composition des verres est dacitique à rhyolitique 66 à 70 % de SiO ₂ (inclusion dans clinopyroxènes : 69 % SiO ₂)

Tableau 55 Evénement ponceux de Pintade

	P 401 a (n°10)	P 401 b (n°11)
Localisation	Anse du Morne Rouge	Anse du Morne Rouge
Description nacroscopique	 ponces blanches vésiculées pluricentimétriques roche porphyrique : petits phénocristaux de ferromagnésiens et de plagioclases (lmm) roche altérée 	 ponces rubanées décimétriques, vésiculées roche porphyrique : phénocristaux de plagioclases, pyroxènes
Description microscopique Plagioclases	 taille inférieure au millimètre, micralites, rarement automorphes. Gros cristaux corrodés composition : An 60 - An 85 coeurs : An 68 - An 80 microlites bordures : An 60 - An 85 Zonation inverse inclusions inverse de clinopyroxènes, d'orthopyroxènes, magnétites. 	- taille pouvant atteindre le millimètre, automorphes, cristaux plus gros dans la partie sombre que dans la partie claire. - composition : partie claire : coeurs An 57 microlites, bordures : 59 - 80 zonation normale partie foncée : coeurs 66 - 70 microlites, bordures : 60 - 75 zonation normale et inverse
Clinopyroxènes	- taille maximum : ½ mm microlites à automorphes - composition Wo 45-En 38	- taille millimétrique automorphes - composition : Wo 42 45 - En 36 - 40 - inclusion de magnétites groupement plagioclases clinopyroxènes
Orthopyroxènes	- taille pouvant atteindre 2mm, microlites - composition autour de En 60 - En 62 coeurs En 62 microlites bordures En 59 - En 61 Zonation normale - inclusions de magnétites	- taille millimétrique eutomorphes - Composition : En 62 - 6.3 partie blanche En 61 - 63 partie noire - inclusions de magnétites et de plagioclases
Magnétites	- taille 1/4 millimètre. minéraux globuleux - composition : 35% d'ulvospinelle pour les cristaux	- taille maximum % millimètre globuleux - composition: partie sombre: 35-39% d'ulvospinelle partie claire: 29-37% d'ulvospinelle - groupement magnétites- orthopyroxènes - clino- pyroxènes
Mésostase	- vitreuse représente 50 % de la roche - verre de la mésostase : 72 % de SiO ₂ - verre inclus dans orthopyroxènes : 76 - 78 % SiO ₂	- vitreuse - verre inclus dans plagioclases : 67 - 69 % de SiO ₂

Tableau 56

Evénement ponceux de Pintade

	X 901 (n° 9)	
Localisation	Anse à la Fontaine	
Description macroscopique	- ponce grise, vésiculée décimétrique - roche porphyrique ; phénocristaux de pyroxènes et de plagioclases	
Description microscopique plagioclases	- petits cristaux automorphes (inférieurs au millimètre) - composition An 80 - 90 minéraux rares - Inclusions de magnétites	,
Clinopyroxènes	~ présents mais non analysés	
Orthopyroxènes	 millimétriques, automorphes composition En 59 - En 65 individus non zonés groupements polyphasés d'orthopyroxènes magnétites contiennent quelquefois des magnétites 	
Magnétites	 demi-millimétriques globuleuses composition homogène située entre 31 et 34 % d'ulvospinelle inclusion d'orthopyroxènes 	
Mésostase	- vitreuse - verres analyses dans la mésostase sont rhyolitiques 71 % de SiO ₂	ø

Tableau 57 Evénement ponceux de Pintade




Fig. 62. Position des plagioclases des ponces de Pintade dans le diagramme An-Ab-Or. Les différents échantillons sont classés par An croissant.




Fig. 63. Position des orthopyroxènes des ponces de Pintade dans le diagramme
Wo-En-Fe.

Wo

[::]

FeO

Fe₂O₃




Fig. 65 . Position des magnétites des ponces de Pintade dans le diagramme TiO₂-Fe₂O₃-FeO.

Même légende que pour la figure 63.




Fig. 55. Position des verres de la métostase et en inclusions, analysés à la microsonde, de l'ensemble des ponces dans le diagramme KO/SiO.

1. 3. Les pyroxènes.

Ce sont les marqueurs les plus intéressants de l'évolution magmatique, car ils sont présents à tous les stades de celle-ci. (Basaltic Volcanism Study Project, (1981), REUBER, (1982)).

La différenciation s'exprime par un enrichissement en Fe des pyroxènes, donc par la diminution du rapport Mg/(Mg + Fe). Il paraît significatif de reporter les teneurs de certains éléments chimiques, en fonction de ce rapport, de manière à pouvoir dégager les corrélations qui apparaissent.

Le choix s'est porté sur les éléments ayant des teneurs supérieures à 0,3 % (Al, Mn et Ca). Le chimisme des clinopyroxènes ne dépendant pas uniquement du rapport Mg/Mg + Fe, nous avons choisi de travailler sur les orthopyroxènes.

Les compositions de ceux-ci dans les ponces de Pintade et les dacites à quartz de l'anse des Pères sont portées sur les diagrammes 67 (Al/Mg/(Mg + Fe)), 66 (Mn/Mg/(Mg + Fe)) et 68 (Ca/Mg/(Mg + Fe)), tandis que les ponces du Morne à Jules, de la carrière Blanchette et les dacites à quartz et la nuée Saint-Vincent de la carrière Danoy sont sur les diagrammes 69 (Al/Mg/Mg + Fe), 70 (Mn/Mg/(Mg + Fe)) et 70 (Ca/Mg/(Mg +Fe)).

On observe sur les diagrammes 66 à 70 d'assez bonnes corrélations, positives pour Ca et Al, négatives pour Mn. La dacite à quartz de l'anse des Pères (n°14 et 15) se situe en dehors du nuage de points représentant les dépôts de Blanchette (n°16 à 19), de la carrière Danoy (n°12 et 13) et du Morne à Jules (n°22) et les ponces de Rocroy(n°7).

Il en est de même en ce qui concerne la ponce à quartz de la carrière Danoy (n° 12 et 13) sur les diagrammes où sont portées les ponces de Pintade (n° 1 à 6 et 8 à 11) et les dacites à quartz (14,15) de l'anse des Pères.

Les dacites à quartz de l'anse des Pères et les ponces de Pintade paraissent avoir subi la même évolution magmatique, tandis que les ponces du Morne à Jules, les ponces à quartz et la nuée Saint-Vincent de la carrière Danoy, les dépôts de la carrière Blanchette et la ponce de Rocroy se regroupent dans une même lignée volcanique.




Fig. 66 . Position des orthopyroxènes des ponces de Pintade et des dacites à quartz de l'anse des Pères dans le diagramme Mn/Mg/Mg+Fe.
Légende ci-dessous.

[△] P 301 4 DACITES A QUARTZ DE L'ANSE DES PERES; FACT'S CLAIR

A P 301 6 DACITES A QUARTZ DE L'ANSE DES PERES; FACIES FONCE

[·] PONCES DE PINTADE

F 802 g DACITES A QUARTZ DE LA CARRIÈRE DANOY




Fig. 67 . Position des orthopyroxènes des ponces de Pintade et des dacites à quartz de l'anse des Pères dans le diagramme Al/Mg/Mg+Fe;. Même légende que pour le diagramme 66 .





Fig. 68 . Position des orthopyroxènes des ponces de Pintade et des dacites à quartz de l'anse des Pères dans le diagramme Ca/ Mg/Mg+Fe. Même légende que pour le diagramme 66 .



O F 802 gt DACITES A QUARTZ (CARRIERE DANOY), FACIES CLAIR

• F 802 g2 DACITES A QUARTZ (CARRIERE DANOY), FACIES FONCE
O C 1501 PONCES DU MORNE A JULES

E 1103 a 1º NIVEAU • £ 1103 b 2º NIVEAU • £ 1103 c 3º NIVEAU

Δ F 802 a₁ NUEE SAINT-VINCENT


A F 802 a₂ NUEE SAINT-VINCENT

D 1204 PONCES DE ROCROY

P 301 DACITES A QUARTZ DE L'ANSE DES PERES

Fig. 69 .Position des orthopyroxènes des ponces de Rocroy, du Morne à Jules et des carrières Blanchette et Danoy dans le diagramme Al/Mg/Mg+Fe.

Légende ci-contre.






Fig. 70 . Position des orthopyroxènes des ponces de Rocroy, du Morne à Jules, de la carrière Blanchette, et de la carrière Danoy dans les diagrammes Ca/Mg/Mg+Fe, et Mn/Mg/Mg+Fe.

1. 4. <u>les éléments</u> en traces .

Les éléments Sc, Cr, Fe, Co, Ni, Rb, Sr, Zr, Sb, Cs, Ba, La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu, Hf, Ta, Th et U, ont été dosés au laboratoire de Pierre Süe (SACLAY) par J.L JORON.


Les éléments en traces n'ont pas été analysés dans tous les échantillons (analyses en annexe I); toutefois, les analyses disponibles sont en nombre nettement suffisant pour confirmer les résultats obtenus par la microsonde. Les ponces bicolores de Vieux-Habitants, visibles au BOUCHU (fig. 16) attribuées par BOUDON,(1981) à l'épisode de Fintade, et par GADALIA, (1983) à la chaîne andésitique de Bouillante, ont été portées sur les diagrammes.(n°23 à 24) (description de l'affleurement et description macroscopique en annexe II).

Les lignées magmatiques issues d'un même magma-parent par différenciation , par exemple par cristallisation fractionnée, présentent des corrélations caractéristiques entre leurs éléments en traces. On peut donc espérer que des dépôts volcaniques d'origine différente présentent des corrélations différentes et spécifiques, et qu'elles nous permettront de mettre en évidence des regroupements de gisements qui ne peuvent pas l'être par d'autres méthodes.

Les éléments hygromagmaphiles, tels que Ba, Sr, Rb, Ce, La, Ta, Th..., se concentrent préférentiellemnt dans le liquide magmatique, et lors d'une évolution par cristallisation fractionnée, comme c'est le cas des laves étudiées (PELLETIER, 1976, BROWN, 1977, § 1,2,4) on observe une corrélation linéaire, passant par l'origine, entre des éléments hygromagmaphiles. (TREUIL, 1973).

Avec la plupart de ces éléments, il apparaît une corrélation linéaire unique entre tous les gisements, et de ce fait, leur emploi n'est pas discriminant. Cependant, le diagramme La/Th (fig. 71) présente plusieurs alignements de points qui pourraient représenter différentes familles magmatiques. Ainsi :

- les ponces de Pintade : (n° 1 à 6 et 8 à 11) et celle de l'anse des Pères (n° 14) ont globalement un rapport La/Th inférieur à celui des ponces de la carrière Danoy (n°12et 13), de la nuée Saint-Vincent (n°20 et 21) et des ponces du Morne à Jules (n° 22) ;
- les ponces bicolores de Vieux-Habitants (n°23 à 24) ne se placent pas toutes dans l'alignement des ponces type Pintade ;
- l'alignement des facies mélangés, blanc (12) et noir (13) de la dacite à quartz de la carrière Danoy sur une droite passant par l'origine, suggère l'évolution des deux facies par cristallisation fractionnée, à partir d'un magma parental, comme cela a été démontré dans d'autres séries. (TREUIL 1973).






Fig. 71 .Diagrammes La/Th et Co/Sc /Th .Ponces de Pintade (1 à 6 et 8 à 11)

des ponces à quartz (anse des Pères et carrière Danoy, 12 à 14), de la

nuée Saint-Vincent (carrière Danoy, 20 à 21), des ponces du Morne à

Jules (22) et des ponces du Bouchu (23 à 24).

Les éléments de transition, tels que Ni, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn, Al Sc sont sensibles à la nature des phases qui apparaissent. Le scandium s'associe au cobalt et au fer dans les pyroxènes (TREUIL, 1973, STEINBERG et al., 1979). La teneur en éléments non hygromagmaphiles doit donc refléter les différentes concentrations de minéraux dans les ponces étudiées, ce qui est mis en évidence sur le diagramme Co/Sc/Th, le plus discriminant :

- les ponces de Pintade : (nº 1 à 6 et 8 à 11) s'alignent avec un rapport Co/Sc constant et compris entre 0,85 et 0,95 ;
- en revanche, <u>les ponces et les scories de la carrière Danoy</u> (n° 12,13, 20,21), <u>les ponces soyeuses du Morne à Jules (n° 22)</u> ont des rapports variables entre 0,42 et 0,98, et constituent un alignement différent du précédent. Les <u>ponces bicolores de Vieux-habitants</u> (n° 23 à 24) s'intègrent dans ce dernier alignement ;
- les ponces de l'anse des Pères (n°14 ...), que nous avons rattachées à la phase Carmichaël, ne sont pas dans le prolongement des ponces de Pintade, comme le suggéraient l'étude des pyroxènes et le diagramme La/Th. Cependant, il est possible que les plus faibles teneurs en Sc et Co de ces ponces entraînent au cours de leur dosage des erreurs analytiques non négligeables. Elles se trouvent malgré tout proches de l'alignement des ponces de Pintade.


L'étude de quelques éléments en trace mêne aux mêmes conclusions que l'étude minéralogique des niveaux ponceux, à savoir :

- <u>les ponces de Pintade</u> forment un groupe homogène, tant au point de vue chimique que minéralogique. Les <u>ponces à quartz de l'anse des Pères</u>, appartiennent à la même lignée magmatique;
- les ponces à quartz de la carrière Danoy la nuée Saint-Vincent et les ponces du Morne à Jules se regroupent dans une même lignée volcanique, à laquelle on peut adjoindre les dépôts de la carrière Blanchette (étude des pyroxènes), les ponces bicolores de Vieux-Habitants et les ponces de Rocroy.

2. CONCLUSION.

La composition chimique des laves et leur étude minéralogique permettent d'aboutir aux conclusions suivantes :

- les ponces de Pintade présentent des caractéristiques qui leur sont propres, hormis les ponces de Rocroy (organisation des affleurements, taille décimétrique et couleur grise des ponces, paragenèse sans quartz, amphibole et olivine ; aucune ilménite n'a été analysée) et sont bien regroupées dans le diagramme oxydes /SiO2. L'étude des orthopyroxènes (diagramme des teneurs en Ca, Al et Mn/Mg/Mg + Fe) et des éléments en traces (diagramme La/Th et Co/Sc/Th) confirme ces observations et permet d'apparenter les dacites à quartz de l'anse des Pères aux ponces de Pintade. Ces niveaux appartiennent à la même lignée magmatique. L'ensemble de ces données confirme le modèle obtenu à partir des datations et des données de terrain, où les ponces à quartz de l'anse des Pères et les ponces de Pintade font partie de la même phase Carmichaël ;
- les ponces de Rocroy sont différentes des ponces de Pintade ; elles s'apparentent plutôt aux dépôts de la chaîne andésitique de Bouillante (étude des orthopyroxènes), dans laquelle on retrouve des épisodes de retombées ponceuses andésitiques dans le secteur de Vieux-Habitants (GADALIA, 1983). De même, les ponces du Bouchu, attribuées par BOUDON, (1981) à l'épisode ponceux de Pintade, sont à rattacher à la chaîpe andésitique de Bouillante, comme l'indiquent les diagrammes La/Th et Co/Sc/Th Les ponces de Pintade n'affleureraient alors qu'entre Baillif et Basse-Terre et entre Trois-Rivières et Capesterre (fig. 72), ce qui réduit leur aire de répartition d'un quart environ par rapport à la surface proposée par BOUDON (1981);
- les ponces à quartz de l'anse des Pères et de la carrière Danoy diffèrent par leur âge, leur structure, leur composition minéralogique au niveau des plagioclases, magnétites, ilménites et amphiboles, ainsi que par la taille et la forme des quartz, et leurs teneurs en éléments en traces;
- les dépôts des carrières Danoy, Blanchette et du Morne à Jules, avec leurs caractéristiques propres concernant leur composition globale et leurs caractéristiques minéralogiques particulières, ont des caractères communs : taille réduite des affleurements, localisation de ceux-ci sur la côte caraïbe, produits différenciés. L'étude des orthopyroxènes et des éléments en traces montre une bonne corrélation de ces niveaux, permettant de les attribuer à la chaîne andésitique de Bouillante. Nous rejoignons en cela l'hypothèse de GADALIA, (1983), également en ce qui concerne l'appartenance des ponces du Bouchu à cette même chaîne ;



- les dépôts attribués au volcan de Tuf, de Getz et du Morne à Jules se sont mis en place simultanément (intrications des dépôts sur le terrain, GADALIA, 1983) et l'âge de l'activité volcanique de ces centres est représenté par la datation de l'obsidienne de Tuf (325 000 ans). Les dépôts des carrières Blanchette et Danoy font partie du même cycle éruptif et l'âge de 24 4 000 ans (ponces à quartz de la carrière Danoy) les place dans les derniers épisodes de la chaîne andésitique.

3. MELANGES MAGMATIQUES.

La présence de rubannement dans les ponces des différents niveaux que nous avons étudiés incite à se poser la question de son origine.

Il n'est pas dans notre propos de mener une étude exhaustive sur le phénomène de mélange magmatique, les analyses à la microsonde effectuées sur les niveaux de ponces étant destinés à apporter des éléments de corrélations venant s'ajouter à l'étude géochronlogique. Cependant, certaines données laissent à penser que dans certains cas, il y a eu effectivement mélange de magmas.

Historiquement, depuis les recherches de KUNO (1950) sur le volcan Hakone, d'ANDERSON (1976), de SUKUYAMA (1979) sur le Shirouma-Oike, de Luhr et Carmichaël (1980) sur le Colima, et de bien d'autres, on pense que le mécanisme de déclenchement d'une phase volcanique explosive est souvent lié à l'injection d'un magma basique et chaud dans une chambre superficielle plus différenciée. La supression de gaz occasionnée dans la chambre magmatique pourrait être responsable du déclenchement de l'éruption, lequel suivrait de très prés l'injection de magma basique. Dans le cas d'éruptions pyroclastiques de faible volume (1 à 10 km3), ce modèle

Dans le cas d'éruptions mettant en jeu des volumes pyroclastiques plus importants (10 à 100 km3), les variations des compositions chimiques des matériaux émis, allant des produits acides vers les produits les plus basiques, sont attribuables à la vidange complète d'une chambre magmatique zonée (SMITH, 1979). Dans ce modèle de zonation d'une chambre de grand volume, le ou les mécanismes de déclanchement de l'éruption est (sont) mal connu (s).

Dans le cas étudié ici, le volume le plus important de matériau pyroclastique émis est celui des ponces de Pintade ; celles-ci affleurent de Baillif à Basse-Terre et de Trois-Rivières à Capesterre (fig. 72) et représentent un volume d'environ 2 km3, en tenant compte du fait que la moitié au moins des matériaux ponceux a été entraîné en mer. La caldeira de la Grande Découverte associée à cette émission a un diamètre voisin de 2,5 km. En ce qui concerne les ponces à quartz, le calcul approximatif des volumes mis à jeu au cours de l'éruption est pratiquement impossible : les ponces à quartz n'affleurent qu'autour de l'anse des Pères (fig. 40) et il est possible qu'elles soient le résultat d'une éruption provenant peut-être d'une chambre encore plus superficielle, indépendante de celle qui donnera les ponces de Pintade . On remarque que le rubannement des ponces à quartz est bien mieux marqué que celui des ponces de Pintade, ce qui concorde avec les observations faites ailleurs en Guadeloupe (SEMET et al., à paraître), démontrant que les effets de mélanges sont d'autant plus visibles que les volumes seront moins importants. En ce qui concerne le premier niveau de Blanchette, les ponces montre un rubannement ténu.

Les indices de mélanges sont sensibles sur les échantillons dacitiques à quartz, mais peuvent se présenter également dans les autres niveaux ponceux (Pintade et Blanchette) :

- présence de ponces rubanées dans les ponces de Pintade, à l'anse du Morne Rouge par exemple, dans les faciès dacitiques à quartz de la carrière Danoy et de l'anse des Pères, et dans le premier niveau de la carrière Blanchette;
- chimisme des parties claires et sombres : dans le mesure du possible, nous avons effectué l'analyse chimique globale des parties claires et des parties sombres de chaque échantillon lorsqu'elles étaient séparables et séparées dans la nature. Les individus finement rubanés n'ont pas été analysés. (tableau 58)

	Partie sombre :	Partie claire
F 802g ₁ ponces à quartz : Carrière Danoy :	57,64 % SiO ₂ :	68,03 % SiO ₂
F 901 ponces de Pintade : Carrière Danoy	60,80 % [±] 4,86 SiO ₂	61,62 % [±] 4,92 SiO ₂
H 901 ponces de Pintade Rivière des Pères	59,40 % ⁺ 4,75 SiO ₂	58,90 % [±] 4,71 SiO ₂
J 1007 ponces de Pintade	59,31 % ⁺ 4,72 SiO ₂	: 59,90 % [±] 4,79 SiO ₂

Tableau 58 teneurs en SiO des faciès clairs et sombres des ponces

On remarque que les faciès clairs et sombres des ponces de Pintade ne sont pas sensiblement différents du point de vue chimique. Par contre, la partie claire de la ponce à quartz de la carrière Danoy est dacitique, alors que la partie noire est andésitique.

- observations sur les minéraux :
- . zonation inverse des phénocristaux (pyroxènes et plagioclases)




Fig. 73 .Traversées de phénocristaux.

En ce qui concerne les plagioclases, seules les analyses effectuées sur des points immédiatement voisins sont représentatives de la dernière évolution magmatique.

- . déséquilibre des assemblages minérologiques :
 - * présence d'olivine et de quartz dans les ponces rubanées de l'anse des Pères (P 301b),

quartz dans les parties claires, olivines dans les parties sombres

* même observation pour le 1er niveau de la carrière Blanchette E 1103a.

* variations importantes et bimodales de la composition des feldspaths :

ponces à quartz de l'anse des Pères, faciès foncé :

An 90 - 95 (Labrador - Bytownite) An 50 - An 75 -Andésine)

ponces à quartz de la carrière Danoy, faciès foncé :

An 90 Bytownite An 50 - 70 Andésine

1er niveau de la carrière Blanchette

An 20 - 30 An 50 - 80 Andésine

Ces observations permettent d'envisager un phénomène de mélange de magma à l'origine du déclenchement des éruptions ponceuses. Ce phénomène paraît plus évident dans le cas des ponces à quartz et de la carrière Blanchette (chimisme des roches totales, minéraux associés) que dans celui des ponces de Pintade. Cela pourrait s'expliquer par un volume de chambre magmatique plus important pour les ponces de Pintade (volume des pyroclastites : 2 km3) que dans le cas des dacites à quartz et des dépôts de la carrière Blanchette.

CHAPITRE 4

CONCLUSIONS GENERALES

CHRONOLOGIE DES DIFFERENTS EPISODES ERUPTIFS DU SUD DE LA BASSE-TERRE.

Grâce aux données chronométriques et géochimiques, nous pouvons proposer une chronologie des différents épisodes éruptifs du Sud de la Basse-Terre (tableau 59 et fig. 74)

Les dépôts du cycle Pitons de Bouillante-Sans-Toucher constituent dans le Sud de la Basse-Terre le substratum de la chaîne andésitique de Bouillante, et des dépôts du cycle récent. Ses dernières manifestations sont datées entre 629 000 ans (coulée du Saut d'eau du Matouba), et 600 000 ans (coulée du Plessis).

Les Monts Caraïbes et la chaîne andésitique de Bouillante ont une activité contemporaine comme le suggèrent les datations: 555 000 ans et 472 000 ans pour le volcanisme initial des Monts Caraïbes, 244 000 ans (carrière Danoy), 325 000 ans (obsidienne de Tuf) (présente étude) et 840 000 ans (Pointe à Sel, BAUBRON, 1980) pour la chaîne andésitique de Bouillante. Les dacites à quartz de la carrière Danoy font partie des derniers épisodes de la chaîne andésitique, l'âge fourni par les quartz (244 000 ans) représente la fin d'activité de la chaîne andésitique de Bouillante.

Les ponces andésitiques de Boucan Mont d'Or reposent directement sur les dépôts de la chaîne andésitique de Bouillante (GADALIA, 1983); les ponces de Pintade de la carrière Danoy reposent sur les dacites à quartz, appartenant également à la chaîne andésitique de Bouillante. Il y aurait eu entre la fin de l'activité de la chaîne andésitique de Bouillante, et le début de la phase Carmichaël, un hiatus d'activité volcanique, long d'environ 90 000 ans au cours duquel se remobilisent les produits précédemment émis, donnant lieu à des lahars. (carrière Danoy, rivière des Pères etc...)

Les ponces à quartz de l'anse des Pères appartiennent à la phase Carmichaël, qui débute par un épisode explosif de grande envergure, au cours duquel se mettent en place les ponces dacitiques à quartz de l'anse des Pères et les ponces andésitiques de Pintade, accompagnées des retombées pliniennes de Boucan Mont d'Or. Actuellement, aucun argument géochronologique ou stratigraphique ne permet d'attribuer une antériorité des unes par rapport aux autres, bien que les données de terrain et les données géochimiques les apparentent au même cycle éruptif. Nous serions tentés de placer les ponces à quartz de l'anse des Pères statigraphiquement sous les ponces de Pintade, car leur faible extension pourrait s'expliquer par une

166 WESTERCAMP (1980) GADALIA (1983) DAGAIN (1981) SEMET (1982) ars 47) SEMET (1982) Les éruptions historiques de la Soufrière Les éruptions historiques de la Soufrière Toutes à caractère phréatique 1975-1977 ; 1956 ; 1796-1798. truption de la Soufrière (XVIÈ) Eruption de la Soufrière (XVIÈ) Dôme de la Soufrière Dôme de la Soufrière Dôme de la Soutrière Palmiste Nuées Saint-Vincent Echelle Nuées péléennes ruption de la Soufrière d 3100 BP Eruption de la Soufrière à 3100 BP Eruption type Mérapi(avec lahars associés Eruption type Mérapi Episode type St Helens Lahar du Galton Formation du cratère du Citerne 3400 3500 Carmichael 4ème phase Echelle Gros Fougas Echelle ACTIVITE PERIPHERIQUE Boudoute Lherminier Gros Fougas Palmiste Edification du Madeleine Palmiste Phase Madeleine supérieure Massif de la fougas Boudoute Lherminier L'Habituée Schoelcher Phréatomagmatisme Maar du Galion Maar du Galiun 1 1560 Cycle Madeleine inférieure adeleine inférieure st-effusif (habitation Grand-Maison) st.explosif (coulées de ponces-scories-nuées ardentes Bananier-Capesterre) 17500 Hadeleine 2nde phase Episode explosif Episode lavique COULEES LAVIQUES DE TROIS-RIVIERES 215:0 CARMICHAEL frois-Rivières Parnasse Morne Goyavier Matouba Hez Cassé Bains Jaunes Parnasse Morne Goyavier Bassin Bleu Crète à Hangles La Regrettée Cycle Madeleine-Soufrière Episode ponceux de PINTADE Début du cycle récent Episode ponceux de PINTADE (Calbessiers-Danny, Bouche Transera de la Grans Découverte) lâre phase
chaine andésitique de
Bouillante
Sans Toucher
Carmichaë!
Episode ponceux à quartz (caldeira de
Vieux habitants Episode ponceux andésitique (Pintade) Ponces andésitiques de Boucan-Mt d'Or Episode basaltique .Chaine andésitique de Bouillante Dépôts des carrières Danoy et Blanchette (ponces à quartz, scories, ponces andésitiques)
 Lahars chauds
 Dépôts d'origine fissurale au niveau du : Episode des ponces à quartz (Blanchette, Danoy - Anse des Pères) punces suyeuses (Danoy) (nonces à quintz) Nuées Saint-Vincent (Danoy) Morne à Jules fufs Habitation Joséphine Tufs Nuées Saint-Vincent (Darxy) attribuées à l'ensemble Matéliane : Pitons de Bouillante Pitons de Bouillante Sans Toucher Ponces bicolores du Bouchu

> Début du cycle Madeleine-Soufrière

xxxxxxxxxx Période de repos

fableau synthetique illustrant les différentes hypothèses concernant l'édification du massif Madeleine-Soufrière et la chaine andéstique de Bouillante d'après MESTERCAMP (1980) BUUDOM (1981) DAGALTI (1981) CEMPT (1982) GADALIA (1983) Seuls les événements soulignés sont datés

Dépôts provenant du système à dominante ponctuelle (Bouillante, Pointe à Sel, Pointe à Zombi)


Chaine andésitique de Bouillante

ans	EPISODES ERUPTIFS		167
425 B.P	SOUFRIERE		C
	ECHELLLE		Y
10 000	MADELEINE SUPERIEURE		С
54-54 Artistation			ŗ
29 000	MADELEINE INFERIEURE		Е
xxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxx R
xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	É
100 000	Coulées de laves de Tro		C
	(groupes nord et sud)	2 W	E
	Ponces andésitiques de	Pintade	Phase N
	Ponces andésitiques de	Boucan Mont d'Or ép. explosif	CARMICHAEL T
150 000	Ponces à quartz de l'ans	2.	
xxxxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
-	*		
XXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	YYYYYYYYY
244 000	Ponces à quartz de la ca		AAAAAAAAA
		Zone de Vieux-H	-1-71
325 000	Ponces rhyolitiques de T	Cuf	abitants
:	CHAINE ANDESITIQUE DE BOUILLAN	TE	
472 000		MONTS CARAIBES Coulée o	de basaltes
555 000			sme de base)
600 000			
	Coulée du Plessis		
620 000	Morne Montval	Derniers stades du volcan du Sans-Toucher	isme
629 000	Saut d'eau du Matouba	aw pamb-loudiel.	
:	PITONS DE BOUII	LLANTE-SANS-TOUCHER	

Tableau 59 . Chronologie des différents épisodes éruptifs du Sud de la Basse-Terre de Guadeloupe.

xxxxx arrêt d'activité volcanique

durée d'un cycle ou d'une phase volcanique



Cycle récent Madeleine - Soufrière

éruption dirigée ou/et une canalisation des produits dans un paysage accidenté (rappelons qu'un long hiatus d'activité volcanique vient de s'écouler).

La présence des ponces à quartz à l'anse des Pères, et des ponces andésitiques dans le Sud de la Basse-Terre permet de localiser le centre d'émission sur les sommets du massif, au niveau de la Grande-Découverte-Morne du Col, aux lieux attribués par BOUDON (1981) à l'emplacement de la caldeira ouverte après l'émission des ponces à quartz et des ponces andésitiques.


L'activité se poursuit par des épisodes effusifs, certaines coulées s'étalent dans la caldeira et en débordant (Morne Goyavier, Fond Bernard, Chutes du Carbet, Bains Jaunes, Parnasse...); d'autres ont atteint la mer (coulées du groupe sud), à partir de centres éruptifs dispersés sur l'axe tectonique NNW-SSE. Ces coulées marquent la fin de l'activité explosive et effusive (pyroclastites - caldeira - coulées), appelée phase Carmichaël datée entre 100 000 et 150 000 ans.

Entre la phase Carmichaël et la phase suivante (Madeleine), un hiatus d'activité volcanique est souligné par des lahars. (DAGAIN, 1981)

La phase suivante est soit la phase Madeleine inférieure (DAGAIN, 1981) avec les coulées d'Habitation Grand-Maison, et des produits d'activité explosive (coulées de ponces, nuées ardentes et remaniements visibles entre Capesterre et Bananier), soit la phase Madeleine (activité périphérique, BOUDON, 1981), avec les coulées Schoelcher, Palmiste, Habituée, mises en place entre 12 700 et 8 500 ans.

L'hiatus d'activité serait de l'ordre de 70 000 ans au minimum. Cette valeur est vérifiée si les ponces de Pintade sont effectivement antérieures aux coulées des groupes nord et sud, et si des deux groupes sont contemporains, comme le suggèrent les données de terrain.

La suite de l'activité volcanique a été étudiée par PATERNE (1980), BOUDON (1981) et DAGAIN (1981), et figure sur le tableau 1 . Il s'agit de l'activité récente du cycle Madeleine-Soufrière (tous les événements ont pu être datés par ¹⁴C) qui se termine par la formation du dôme de la Soufrière au XVIe siècle. (VINCENT et al., 1979)



.Position des échantillons de porces étudiées à la microsonde et des coulées du Morne Goyavier, Fond Bernard, Carbet(3°chute), Schoelcher, Habituée dans le le diagramme La/Th.

Il nous revient d'avoir défini une phase Carmichaël, pendant laquelle la physionomie actuelle de la Guadeloupe se dessine. En effet, les dépôts de cette phase reposent sur un substratum appartenant au cycle Pitons de Bouillante-Sans-Toucher et à la chaîne andésitique de Bouillante, et forment le massif actuel de la Soufrière s. l., sur lequel se grefferont plus tard la Madeleine, l'Echelle, la Citerne et le dôme de la Soufrière lui-même.

La phase Carmichaël fait bien partie du cycle récent Madeleine-Soufrière en raison de :

- 1. son âge (150 000 à 100 000 ans);
- 2. la parenté géochimique de ses produits avec les dépôts postérieurs : sur le diagramme La/Th, les coulées du Morne Goyavier, Fond Bernard, les ponces de Pintade, les coulées de la Madeleine, (Schoelcher et L'Habituée) se regroupent le long du même alignement ; (Fig.75)
- 3. son lieu d'activité, centré-sur la caldeira de la Grande Découverte Morne du Col et postérieurement étalé le long de l'axe volcanique NNW-SSE, matérialisé par l'alignement Soufrière-Echelle Citerne Madeleine.

ANNEXES

I

Annexe I Analyses chimiques.

Les erreurs sur les mesures sont les suivantes ()

 Si
 8 %

 Al
 3 %

 Fe
 2 %

 Mg
 5 %

 Ca
 2 %

 Na
 3 %

 Ti
 5.%

 K
 3 %

 P
 4 %

Le calcul du partage du fer a été effectué pour obtenir 75% de Fe0 et 25% de Fe $_2^0$ 3 (pourcentage moléculaire) pour les roches totales et 50 % de Fe0 et de Fe $_2^0$ 3 pour les verres analysés à la microsonde.

Sb sa a e n E b b E b b	. 05 . 49 106 6. 8	13 7. - - 9	9 169	1. 69 . 62	. 46 142 7. 7 20. 7 . 94 . 54	. 69 148 7. 7 17. 3	13 7. 17.
Sc Cr Fe Co Ni Rb Sr Zr Sb	22.6 6 9.8 22 3.4 14 314 71	22. 5 8. 9 22 4. 2 16 311	8 7.6 18 4.0- 26 3 177 3 115	25.7 12 8.8 19 2.4 24 174 111	24.9 8.3 18 3.2 21 172 82 .06	18. 4 7. 3 13 . 6 28 194 102 . 09	18. 7. 1
Sp Pe Ru Ap H ₂ 0	0,37	0,28	0,33 2,63	0,37 1,25	0,52 0,88	0,26	0,28
He []	1,38	1,27	4,59 1,40	1,59	1,55	1,36	1,5
Fo Fa				5,20	5,19	4,46	5,2
Ho Diop Hed Ens Fe	1,65 0,75 9,37 4,92	8,89 4,79	6,45 4,31	7,59 4,85	0,41 0,23 7,32 4,72	5,80 4,22	1,59 0,93 6,80 4,56
Ne Le Ka Co		0,63	2,33	0,37		0,25	
))r An Ab	4,07 38,00 19,20	4,37 39,05 19,03	6,26 27,95 17,68	6,26 31,00 21,40	5,20 33,63 18,78	5,61 31,18 19,63	4,66 28,31 26,73
e ₂ 0 ₅	0,63 99,80	0,60 99,97	2,15 99,44 25,43	0,71 100,98 21,06	0,34 99,19 20,69	1,74 100,29 25,28	0,92 100,27 18,10
a ₂ 0 20 10 ₂	0,69 0,73 0,16	0,74	1,06 0,74 0,14	1,06 0,84 0,16	0,88 0,82 0,22	0,95 0,72 0,11	0,79 0,80 0,12
n0 g0 a0	0,18 4,07 8,47 2,27	0,17 3,57 8,03 2,25	2,59 5,82 2,09	3,05 6,46 2,53	3,02 7,23 2,22	2,33 6,43 2,32	3,03 6,49 3,16
10 ₂ 1 1 ₂ 0 ₃ 1 e ₂ 0 ₃	54,70 18,41 9,37	55,71 19,45 8,46	59,55 17,17 7,92 0,17	59,98 17,05 8,97 0,17	58.39 16.93 3.97 0.15	61,28 16,53 7,70 0,18	59,23 16,43 9,10 0,20
1	L'Habituée IA	Schoelcher I	Morne Goyavier N 1105	3ême chute du Carbet S 1201	Fond Bernard K 1401	D 1401 b 1	

CFCNRSZSCBLCSETY				27 11.8 35 5.0 2 268 39 .07 53 3.1 9.0	5 8.3 16 2.0 14 208 96 .07 .17 125 8.1 17.1	
Sc.				37. 9	22. 1	
Ru Ap H ₂ O	0,02	1	and the same	0,54	0,44	0,02
II Sp	0,36	2,03	1,88	1,99	1,78	0,77
Fa Mt He	1,63	5,32	5,97	7,07	5,06	3,01
Fe Fo	1,46	4,66		5,43	4,37	2,95
Ho Diop Hed Ens	0,19 0,39 0,63	5,47	2,76 1,86 5,91	5,72 2,31 11,71	0,51 0,35 5,49	2.73
Ne Le Ka Co		1,54				3,63
An Ab	9,05 38,50	24,49 26,56	39,31 22,59	47,58 9,64	24,87	21,15
Q Or	35,98 11,16	22,70	11,44 2,71	5,49 1,89	16,33 4,84 34,61	34,38 8,09 17,64
P.F.	1,18 100,75	0,88 99,02	0,27	0,22	0,53 99,79	4,70 99,45
Ti02 P205	0,19	1,07	0,99	1,05 0,23	0,94 0,19	0,41
Na ₂ 0	4,55 1,89	3,14 0,73	0,46	1,14 0,32	0,82	1,37
MgO CaO	0,29 1,98	2,20 5,20	2,89 9,43	5,77 11,90	2,30 7,44 2,94	1,10 3,57 2,50
Fe ₂ 0 ₃	0.07	9,17 0,20	10,30 0,21	0,18	0,19	0,10
S10 ₂	74,94	55,74 16,48	53,78 19,30	47,69 19,66	57,26 1 18,41 1 8,73	64,77 15,70 5,21
į.	Tuf 30A	Tartre 24	Pointe du Vieux-Fort y 101	J 301	Coulée du Plessis E 1101	13

20	Morne Montval	Saut d'eau du Matouba J 1201	Morne Dair	Grande Riviere aux Vieux habitants D 1301	Habitation Grivelière G 1501	Morne Soldat H 1702
5102	61,24	58,06	57,14	59,69	55,30	56,47
A1203	19,69	19,07	19,89	19,84	18,83	18,57
Fe ₂ 0 ₃	1 5,18	8,49	7,63	6,91	9,13	B.14
MnO	0	0,17	0,15	0.16	0.18	0.18
Mgū	0,85	1,44	2,08	1,48	2,22	2,13
C 70	7,24	7,72	8,54	8,29	8,32	8,39
Na ₂ 0	3,56	3,40	2,81	2,59	3,26	3,2)
K20	0,84	0,63	0,90	0,69	0,58	0,57
Tiu2	0,59	0,77	0,77	0,70	0,96	0,82
P205	0,26	0,23	0,22	0,24	0,30	0,27
W 19 100	0,73	0,51	0,93		0,28	1,03
Total	100,18	99,61	101,06	100,60	99,57	99,78
1 4	20,15	16,43	15,04	21,00	12,57	15,45
Or	4,96	3,13	5,31	4,07	3,52	3, 36
An	34.22	35,20	39,00	39,56	35,03	34,57
I Ab	30,12	26,70	23,77	21,91	27,58	27,10
Ne	į i	i i	1			
Le		i	į		1	
Ka	i	j	i		1	
l Co	0,38		- 1	0,33	i	
Diop	1					
Hed		0,62	0,94		2,01	0,15
Ens		0.70	0,64		1,51	0,11
ře	2,11	3,29	4,74	3,68	4,59	5,23
1 50	2,43	4.27	3,71	3,71	3,98	4,29
Fa	i		1		!	
Mt	3,00		1		i	
He	3,00	4,91	4,42	4,00	5,29	4,71
111	1,12	1,46	1,46			
Sp		1,40	1,46	1,32	1,82	1,55
Pe		1	!	!	į	
Ru	!	į	į			
Ap	0,61	0,54	0.52	0,56	0,71	0,63
H ₂ 0	1,05	1,03	1,39	0,41	0,83	1,53
i	1 1	i	i		0,03	
Sc	10.9	19. 3	19. 1	18. 4	22. 7	28.8
Fe	4. 8	5 8. 0 -	3 7. 4	7	2	-
Co	T. 5	13	15	7. 0	8. 7	7.6
Hi	-	1. 6	1. 0	. 6	17 2: 7	13
Rb	18	10	16	16	2. 7	11
Sr	241	253	286	263	283	248
Zr	128	97	116	138	93	81
5 b	. 05	. 02	. 18	. 89	. 05	. 84
Cs	. 28	. 25	. 68	. 23	. 27	. 15
Ва	136	96	111	135	85	110
La Ce	8. 1	6. 9	7. 9	7. 9	6.6	5. 6
Sn	20.8	14.6	22. 2	19. 1	17. 1	15.7
Eu	1. 22	1. 23	1. 21	4 73	4 22	4 04
Tb	. 71	. 72	. 71	1. 17 . 73	1.28	1. 21
Yb		. 12			. 00	. 61
Lu	(198)	-	-	_	-	-
Hf	3. 2	2. 5	3. 0	3. 0	2. 3	1. 9
Ta	. 22	. 19	. 20	. 20	. 16	. 14
Th	1.64 .50	. 92	1. 42	1.34	. 89	. 82
U	. 56	. 30	. 49	. 44	. 29	. 24

					00121 0				
				Morne à Jules		Int Vincent	Ponces a		
tation	Morne					ere Danoy	Carriès	e Danoy	Anse des Pères
1501	Soldat H 1702			C 1501	F 80Za ₁ scorie	F802a ₂ lave	F 802g ₁ faciës blanc	F 8029 ₂ faciës noir	P 301a faciès blanc
5,30	56,47		510,	61,17	58,74	58,16	68,03	57,64	120 102
8,83	18,57		٨١٥٠	18,57	17,24	17,16	15,49	17,95	64,39 15,11
9,13	8.14		Fe20	7,71	8,87	9,46	3,70	8,27	5,53
0.18	0,18		MnO	0	0,20	0,19	0,10	0,16	0,14
2,22	2,13		MgU	1,78	3,17	3,06	0,80	3,64	1,76
3,32	8,39		CaO	5,93	7,42	7,60	4,15	7,88	4,47
3,26	3,21		Hazo	3,35	2,73	2,93	3,55	2,43	2,75
0,58	0,57		K20	0,67	0,65	0,68	1,46	0,71	1,41
0,96	0,82		1102	0,66	0,83	0,93	0,33	0,67	0,47
	0,27		P ₂ ⁰ 5	0,19	0,15	0,14	0,08	0,09	0,11
0.28	1,03		-	0,01	0,40	0,64	1,89	0,54	3,21
	99,78						*:		
2.57	15,45		Total	100,03	100,39	101,00	100,43	100,00	99,02
3,52	3, 36								
.03	34.57								
,58	27.10		Q	22,47	16,59	16,82	30,99		29,67
į			Or An	3,95 28,17	3,84 32,86	4,01	8,62		8,33
1			Ab	28,34	23,10	31,79	20,06 30,03		21,45
1			Ne Le	8		-			23,26
1			Ka Co	2,00	-	2	(-1)		-
.01	0,15		Wo	2,00	Ū	(64)	0,71		1,19
,51	0,13		Diop		1,57	2,57			-
,59	5,23		En	4,43	0,84 7,16	6,42			-
.98	4,29		Fe Fo	4,00	4,41	4,28	2,07		4,38
,,,,	4,23		Fa	Ī.,	-		2,		3,14
i			Ht He	4,46	5,14	5,48	2,14		3,20
,29	4,71	f 9	He II	1,25	1,57	1,76	0,62		-
	.,		Sp Pe	1 × 2 × 2	-	-	200		0,89
.82	1,55	19	Ru		-	-	5		17.
			H ₂ O	0,44	0,35	0,33	0,18 3,01		0,26 3,21
,71	0,63	v v	Total	100,05	100,41	101,00	100,47		99.03
,83	1,53		Sc	9. 4	22. 4	23. 0	9. 0	20.7	99,02 14 . 9
. 7	20 0	×	Cr	9	14	14	4	11	6
2. 7	20.8		Fe	4. 1	8. 3	9. 6	3. 4	8. 0	5. 4
. 7	7.6		Co	_4	17	18	4	20	10
17	13		Ni Rb	23	3. 6	3. 9	. 5	5. 0	4. 0
: 7	. 6		Sr	154	13 210	14 229	30	17	29
9	11		Žr	126	93	95	177 153	198	159
83	248		Sb	. 14	. 05	. 05	. 10	92 . 07	120
93	81		Cs	. 85	. 45	. 48	1.83	. 55	. 11 . 98
05	. 84		Ra ·	165	185	123	234	116	218
27	. 15		La	9.6	6. 7	6. 7	11.4	6. 4	8. 6
85	110		Ce	26. 2	19.4	15.8	25. 8	11. 0	20. 2
. 6 . 1	5. 6 15. 7	9	Sa	4	-	-	-	1000	-
- 1	13.7		Eu	1. 20	1. 10	1. 12	1.16	. 99	. 80
20	1. 21		T b Y b	. 86	. 58	. 59	. 78	. 56	. 41
66	. 61		Lu	_	-	_	-	-	
-	-		Hf	3.8	2. 4	2. 4	4. 2	2.5	
-,	-	(E)	Ta	. 25	. 19	. 19	. 31	2. 5	3. 8 . 26
. 3	1.9		Th	1.87	1. 47	1. 38	2. 85	. 18 1. 46	3.00
16	. 14		U	. 64	. 41	. 42	. 88	. 44	. 78
89 29	. 62 . 24						and reasons.		
43	. 47								

.

Anse à la Fontaine		59.86	16,56	45,8	0	11'7	2,79	0,77	0.19	1,12	100,18	20,49	22,79	r r r		0,0 62,0	E1,4	46.4	1,39	1.1	1,0,1	100,16	19.2	 	2.8	215	187	00 4	180.5	. 1	1. 81		3.1	2.55	
Anse du Horne Rouge		58,11	16,60	7,65	91,0	6 \$	3,19	-	89.°°	3,62	100,89	16,33	28,02			1,74 0,86	3,90	4,55	1,29		4,12	100,88													
0 1204 Rocroy		60,73	16,77	7,82	71,0	6.45	16'1	08'0	0,72	2,01	100,13	26,38	30,88		\$ -	9.14	4,29	4,59	1,36	.,	2,48	100,83													
3 1007/8 Riviers Moirs	20108	59,31	16,95	7,51	0,18	6,14	2,57	1,08	0,70	2,97	100,43	21,46	22,22		0,83	71.1	4,13	4,34	1,32	1 1	*,°°	100,42	17.9	, w	2.4	172	115	67.	2 00 10	. 1	. 61		3.1	2. 32	
3 1007/A	factes ciair	59,90	16,99	7,63	61,0	67.5	3,0,6	1,17	0,71	1,08	100,44	18,37	29,25			2,40 6,03 6,05	3,73	24,4	1,34	, , ,	1,53	100,44													
	F901 b ₁	60,81	16,74	7,91	0 69 6	6,55	3,2	1,13	69.0	0,16	100,61	22,36	30,93	1 1 1		6,0°	10,4	85,4	1,31		1,85	100,60	17.2	7.2	15	53	100	 	137	25.3	. 61	1.1	3.2	2.62	Ţ.
PINTADE	F901 b2 Carrier	29,19	16,23	7,62	0,07	6,16	2,77	1,19	69'0	0,14	99,25	24,70	28,33			0,51	3,71	4,42	1,31	ű.	1,85	91,66	17.1	7.2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	128	162	9.0	9 2 9	25. 6	96.		3.5	2.93	70
ě.	Calbassiers		15,95	7,82	2.69	5,36	2,95	1,06	85,0	1,77	08,86	20,50	24,96	(E (S)		5,90	3,83	46,4	21,15	1 10	2,2	86'66	29. 5	8.5	% F8	22	181	78.	8 .0 .0	r	1.18	. ·	2.8	2.35	89
WALTSES CHIHIQUES	Riv. des Pères factès foncé	9,40	17,10	0/1/0	2,97	6,75	2,58	1,1	97.0	1,51	100,11	20,14	21,53		0,20	7,05	£1,4,13	94.4	04,1	0.47	1,98	100,15	21. 3	· 89	8 6	125	200	. 78	144	16.9	1. 81		2.5	2. 23	2
PAN	Pères		17,13	65.0	2,92	08,3	2,99	56,0	0,71	1,61	66'66	17,99 5,61	25,30		1,10	6,75		4,39	*. *.	0,42	2,08	86'66	17.7	8. 2.8	3. 6	18	86		7.1	18.7	. 52	ы	4.6	1.91	27.
	£ 1103 €, scorie	85,58	66,71	7,70	2,55	7,05	2,15	0.76	0,16	2,28	8,11	22,01	33,93 18,19	, , , , , ,	1,28	6,35	R * 1	£	1,40		2,82	11'66	200	- es	N Co	8,0	17.	CS	8 J	S &	T E	5 5	\$ 5 T	:£:	
OETTE	£ 1103 c ponce	50,36	19,73	¥8,4	08,4	10,16	66,0	0,78	0,22	2,66	100,13	25,52	86,7 98,7		0,36	11,78	\$ *	5,72	8 7	0.52	3,26	100,16													
ANALYSES CHIHIQUES - BLANCKETTE	£ 1103 b ponce	3,3	14,89	26,6	0,82	60,4	2,72	* 5	0,11	4,74	60'66	8,09	23,01	1.75		5,	48,2	3,08	1,02	0.26	5,06	99,30													
WAL Y	£ 1103 a ponce	96,85	16,08	5,65	2,15	96,99	2,71	92.0	0,17	1,78	100,19	20,60	22,93	64.0	r:r	5,35		64,4	3, 1, 1	04,0	2,23	61,001		•											
		2015	41 ₂ 03	Fe20,	- Page	Ca0	220	110,	P.0.	, Jd	Total	065	5 2 2	3 2 0	Dlop	¥5.5	55	£ £	Sp.	2 ₹	H ₂ 0	Total													

Annexe II Description des affleurements de ponces étudiées en géochimie

1. Morne à Jules .

Affleurement d'une dizaine de mètres de hauteur constitué de deux écoulements ponceux, séparés par un niveau de retombées aériennes de cendres et de ponces.

2. Carrière Danoy. (nuée Saint-Vincent, ponces à quartz, ponces andésitiques (coupe n° 15)

2.1. Nuée Saint-Vincent

- Puissance du dépôt 8-9 m, en une seule venue.
- Dépôt constitué de blocs de nature et de taille variées , baignant dans une matrice cendreuse gris sombre, abondante. Les blocs sont représentés par :
 - (1). des éléments arrondis ou argileux, de lave claire andésitique (arrachés au substratum),
 - (2). des scories de teinte sombre type F 802a,
 - (3). des laves plus massives type F 802a,
- La nuée est surmontée directement par les ponces dacitiques à quartz.

2.2. Les ponces dacitiques à quartz .

- Trois unités ponceuses d'épaisseur métrique séparées par des niveaux fins de retombées aériennes
- Ponces de petites tailles (5cm maximum) baignant dans une matrice cendreuse abondante (rapport volume blanche prédominent largement, mais quelques individus gris ou rubanés sont présents.

Les ponces dacitiques sont séparées des ponces de Pintade par un lahar.

2.3 Ponces de Pintade .

L'épaisseur moyenne des ponces mises en place par écoulement est d'une vingtaine de mètres, parfois plus quand elles sont canalisées. Les affleurements sont caractérisés par :

- absence de litage et de granoclassement,
- présence de states d'épaisseur métrique à décamétrique , correspondant à une seule venue,
- présence de pipes de dégazage dans certaines coulées,

Les ponces baignent dans une matrice cendreuse plus ou moins abondante selon l'écoulement. Leur dimension varie d'une coulée à l'autre ; elles peuvent atteindre 30 à 40 cm de diamètre.

Entre la Pointe de l'Hermitage et l'anse du Val de l'Orge, les ponces de Pintade forment une falaise d'une vingtaine de mètres de hauteur. La ponce de Rocroy (D 1204) provient de cette zone (fig. 16)

4. Carrière Blanchette.

La puissance du dépôt est de 7 à 8 mètres, avec alternance pluridécimétrique de niveaux ponceux ou scoriacés. Les ponces et les scories sont toutes de petite taille (4cm maximum)

De bas en haut, la coupe est la suivante :

- 3 niveaux ponceux d'à peu près même épaisseur (20 à 40 cm) (E 1103 a, E1103 b, E 1103 c),
- 1 niveau de cendres noires pulvérulentes, d'épaisseur 80 cm,
- 1 niveau de scories jointives (40 cm d'épaisseur) (E 1103e),
- 1 niveau cendreux blanc.
- 1 dernier niveau ponceux blanc, surmonté d'un lahar.

5. Ponces bicolores de Vieux-Habitants. (carrière du Bouchu)

Coulées de ponces, en plusieurs venues, affleurement d'une hauteur totale d'une quinzaine de mètres. Les ponces sont de taille pluricentimétrique, blanches, noires, ou rubanées.

<u>D 1401 b : ponce rose à blanche en paline vésiculée, blanche en cassure, porphyrique avec phénocristaux millimétriques de feldspaths et de pyroxènes automorphes. Quelques individus de feldspaths atteignent 2-3 mm. La mésostase représente 80 % de la roche ; </u>

<u>D 1401 n :</u> scorie vésiculée, décimétrique, noire en cassure et patine, porphyrique ; phénocristaux millimétriques deplagioclases et de pyroxènes automorphes ; la pâte représente 30 à 50 % de la roche ; quelques individus sont moins vésiculés et contiennent moins de cristaux (la pâte représente 70 à 80 % de la roche)

Annexe III Description des échantillons datés par K.Ar et thermoluminescence

1A. Coulée de l'Habituée.

650,75 E ; 1771,4 N ; 100 m Age zéro pour K-Ar roche noire en pature et cassure porphyrique à phénocristaux de pyroxènes et plagioclases millimétriques

1. Coulée Schoelcher.

647 E ; 1 768,07 N ; 240 m Age zéro pour K-Ar andésite grise, assez vésiculée, roche porphyrique à phénocristaux de plagioclases et de pyroxènes

3A. Ponces datées à 22 000 ANS BP. Embouchure du Carbet

652,8 E ; 1772,20 N, 20 m ponces blanches, de taille décimétrique

4. Ponces de l'éruption du XVIXè siècle.

 $643,4~{\rm E}$; $1773,62~{\rm N}$; $1020~{\rm m}$ ponces bicolores à bandes grises et noires de taille décimétrique altérées en surface. roche porphyrique à phénocristaux de plagioclases et de pyroxènes.

N 1105. Morne Goyavier.

642,45 E ; 1773,70 N ; 1040 m Coulées de Trois-Rivières - Carmichaël Roches grise en patine et cassure Roche porphyrique à phénocristaux de plagioclases et ortho et clinopyroxènes millimétriques automorphes Magnétites présentes à tous les stades de la cristallisation. Pâte microcristalline

K 1401. Fond Bernard.

640,4 E ; 1775,9 N ; 640 m
Coulées de Trois-Rivières
Roche grise en cassure
Roche porphyrique - phénocristaux de plagioclases automorphes,
contenant de nombreuses inclusions (dusty zone) et de pyroxènes,
millimétriques.
Les clinopyroxènes peuvent être entourés par les orthopyroxènes
Les magnétites sont à tous les stades de la cristallisation
Mésostase microcristalline

S 1201. 3è chute du Carbet.

647,25 E ; 1774,8 N ; 420 m cycle récent , lave andésitique verdâtre en patine, noire en cassure. roche porphyrique à phénocristaux de plagioclases millimétriques et pyroxènes (ortho et clinopyroxènes) magnétites à tous les stades de la cristallisation. mésostase microcristalline.

J 1201. Saut d'eau du Matouba-Matouba.

639 E ; 1774,9 N ; 520 m cycle récent ? lave de couleur grise, massive débit général en larges lauzes. roche peu porphyrique, contenant quelques phénocristaux de plagioclases ne dépassant pas le demi-millimètre.

D 1301. Grande Rivière des Vieux-Habitants.

633,25 E ; 1775,8 N ; 60 m Pitons de Bouillante -Sans-Toucher Andésite grise en patine et cassure roche porphyrique à phénocristaux de plagioclases plurimillimétriques et de pyroxènes (ortho et clinopyroxènes) millimétriques, dont certains sont altérés.

G 1501. Habitation Grivelière.

636,10 E ; 1777,5 N 240 m Pitons de Bouillante-Sans-Toucher roche à patine rouille, cassure gris clair, fraîche, roche porphyrique à phénocristaux de plagioclases.

H 1702. Morne Soldat.

637,2 E ; 1779,6 N ; 320 m Pitons de Bouillante-Sans-Toucher lave rouille enpatine gris clair en cassure, fraîche, roche aphyrique. Les minéraux sont des plagioclases (de taille de l'ordre du 1/10° de mm) et les pyroxènes (plus nombreux)

E 1101. Coulée du Plessis.

634,25 E ; 1773,8 N ; 60 m Pitons de Bouillante-sans-Toucher lave foncée en patine, de cassure gris clair débit conchoïdale lave aphyrique avec quelques microlites de pyroxènes visibles.

30 A. Le Tuf.

635,7 E ; 1775,35 N ; 300 m chaîne andésitique de Bouillante échantillon à alternance d'obsidiennes (lapilli) de verre blanc soufflé, avec quelques phénocristaux de plagioclases.

La datation a été effectuée sur le verre brun.

D 1402a. Morne Davi.

633 E ; 1776,4 N, 30 m Pitons de Bouillante - Sans-Toucher roche noire en cassure et patine, légèrement vacuolaire, roche porphyrique à phénocristaux de plagioclases (millimétriques) et pyroxènes automorphes, mésostase vitreuse

24. Dyke de Tarare - Morandais.

633,3 E ; 1778,7 N ; 65 m chaîne andésitique de Bouillante/Pitons de Bouillante-Sans-Toucher lave marron en patine et en cassure Débit en larges lauzes roche aphyrique

J 101. Pointe du Vieux-Fort.

638,85 E ; 1764 N ; 20 m

Monts Caraïbes
lave grise en cassure et patine
roche porphyrique à phénocristaux de plagioclases automorphes
plurimillimétriques, et de pyroxènes automorphes inframillimétriques.

magnétites.

J 301. Pointe Mazarin.

678,65 E ; 1765,20 N ; 20 m
Monts Caraïbes
lave grise en cassure et patine
roche porphyrique à nombreux pnénocristaux automorphes de
plagioclases millimétriques, et pyroxènes inframillimétriques.

13. Montval.

635,5 E ; 1775,75 N ; 420 m chaîne andésitique de Bouillante ponces à quartz, pouvant être altérées, de couleur jaune à ocre roche porphyrique à phénocristaux de pyroxènes millimétriques, quartz plurimillimétriques de forme quelconque. Présence d'amphiboles.

P 301a Anse des Pères.

 $644,05~{\rm E}$; $1765,5~{\rm N}$; $5~{\rm m}$ ponces grises à noires en patine, blanche en cassure, roche porphyrique : phénocristaux de quartz, pyroxènes et rares feldspaths

F 802g₁ <u>Carrière Danoy</u>.

634,2 E ; 1770,90 N ; 40 m ponces de petite taille, patine ocre, cassure blanche, aspect soyeux, roche porphyrique ; phénocristaux de quartz bipyramides, pyroxènes et plagioclases.

ANNEXE IV : ANALYSES CHIMIQUES DES VERRES OBTENUS A LA MICROSONDE

	Nuée Saint-	Vincent	Dacites à quart Carrière Danoy	z A	Dacites à quart nse des Pères	z	ler niveau de ponces	Blanchette 3e niveau de ponces	scories
11	1,10	1,48	0,41	0,18	0,72	0,74	1,27	1,02	
He	0,67	1,26	0,45	0,01	0,57	0,56	0,97	1,82	1,10
Mt	3,54	4,80	1,13	2,00	1,96	1,54	5,79	1,35	1,01
Fe	-4			19.169			F 70	8,41	3,89
Hed Ens	2,04	3,11	0,37	0,24	0,92	0,87	4,93	2,66	1,36
Diop								-,	
Co	4,18	3,83	3,41	2,92	1,79	4,04	1,45	4,62	4,51
Ab	17,17	9,90	19,96	14,13	19,80	4,04	1,45	20,04	
An	15,72	20,98	6,31	6	12,70	11,31 9,05	18,27	23,94	27,66
Or	5,90	6,26	13,35	17,13	13,88	11,16	25,15	27,99	44,50
Q	48,91	47,95	50,66	51,51	47,38	57,02	5,67	4,01	3,66
				51 51		57.00	34,14	23,42	12,35
TOTAL	99,27	99,60	96,02	94,17	99,70	96,33	97,68	98,26	100,09
Na 0 K 0 T10 2 P 0 5 H 2 0	U	Ü							
12 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P 02	0,38	0	0	o o	0	0	0	0	0
720	0,58	0,58	0,22	0,10	0,38	0,39	0,67	0,96	0,58
2	1,00	1,06	2,26	2,90	2,35	1,89	0,96	0,68	0,62
Na O	2,03	1,17	2,36	1,67	2,34	1,07	2,16	2,83	3,27
MgO CaO	3,17	4,23	1,47	1,21	2,56	2,28	5,07	6,84	10,14
MnO	0,82	1,25	0,15	0,10	0,37	0,35	1,98	1,93	1,39
	4,22 0,23	0,15	0,	0,08	0,09	0,11	0,16	0,25	0,07
A1 ₂ 0 ₃ Feo	14,37	6,19	1,68	1,89	2,61	2,20	6,70	9,65	4,99
SiO2	72,56	14,60	12,06	11,01	12,84	12,00	15,27	15,65	22,36
G ± 0.0	70 56	69,74	75,99	75,07	75,98	75,89	64,20	58,74	56,30
					faciës rubané	faciès rubané			
	1	2	faciès blanc	faciès blanc		partie claire			
	F 802a ₁ (1)	F 802á, (1)	F 802g ₁ (1)		P 301b (1)	. P301b (1)	0 1100 0(1/	E 1103 c (1)	E 1103e

(1) verre de la mésostase

ANALYSES CHIMIQUES DES VEFRES (ANALYSES REPRESENTATIVES)

	E 1103 e(1)	F 901b ₁ (1) faciès blanc	F 901b ₁ (2) faciès blanc	F 901b ₁ (3) faciès blanc	F 901b ₂ (4) faciès foncé	H 901b(1) faciès clair	H 901b (5) faciès clair	H 901a (1) faciès fonce	H 901a (4) é faciès foncé
Sio	50,46	75,13	73,18	75,65 .	75,56	70,92	73,40	73,69	68,81
A1 .8.	4,70	13,46	12,93	13,59	12,27	13,63	12,56	13,34	18,47
Al ₂ 6 ₃	14,32	3,28	2,78	3,56	2,29	4,05	3,97	3,58	2,80
MnO	0,50	0,12	0,11	0,12	0,08	0,12	0,08	0,15	0,01
MgO	15,36	0,64	0,10	0,42	0,47	0,79	0,32	0,62	0,52
CaO	12,88	2,61	1,91	2,40	2,07	3,42	2,37	2,54	4,90
	0,33	1,66	1,91	1,55	2,20	1,66	2,04	1,89	1,83
к.б	0,09	1,65	2,37	1,59	2,65	1,77	1,82	1,55	1,15
Nago Kgo Tio ₂	0,70	0,48	0,50	0,65	0,36	0,48	0,40	0,61	0,46
TOTAL	100,42	99,28	96,00	99,80	98,12	97.,14	97,25	98,23	99,16
Q	9,10	52,61	48,75	54,78	47,48	45,98	49,01	50,39	42,48
Or	0,53	9,75	14,00	9,39	15,65	10,45	10,75	9,15	6,79
An	11,07	12,94	9,47	11,90	10,26	16,96	11,75	12,60	24,30
Ab	2,79	14,04	16,16	13,11	18,61	14,04	17,26	15,99	15,48
Co		4,19	3,75	4,95	2,01	2,76	2,92	3,93	5,30
Diop	41,11								
Hed							0.70	1 54	1,29
Ens	19,19	1,59	0,24	1,04	1,17	1,96	0,79	1,54	1,49
Fe							2.25	2 55	1,69
Мt	15,00	2,54	1,90	2,34	1,66	3,35	3,35	2,55 0,88	0.90
He	0,26	0,67	0,74	1,02	0,55	0,68	0,62	1,15	0,87
11	1,32	0,91	0,94	1,23	0,68	0,91	0,75	1,13	0,07

81 anchette scorie

Ponces de Pintade

Ponces de Pintade Rivière des Pères

ANALYSES CHIMIQUES DES VERRES (ANALYSES REPRESENTATIVES)

	D 1204 (1)	D 1204 (2)	p 401a (1) faciès clair	P 401 b (5) faciès clair	P 401b (1) faciès foncé	P 401b (4) faciès foncé	X 901 (1)
SiO AI203 Feo Mno CaO Na_O K2O	70,59 14,71 2,89 0,12 0,49 1,89 3,93 0,93 0,24	69,19 15,18 1,95 0,17 0,33 2,96 3,86 1,53 0,36	72,29 13,09 2,64 0,16 0,48 2,66 2,29 2,01 0,39	76,30 11,11 2,22 0,11 0,30 1,61 2,02 2,30 0,38	73,57 13,02 2,38 0,03 0,52 2,69 2,77 2,18 0,43	67,49 16,80 1,85 0,03 0,49 1,94 4,45 5,32 0,04	71,61 14,80 4,46 0,04 0,91 3,23 2,60 1,77 0,38
TOTAL	96,04	95,44	96,19	96,52	97,75	98,54	100,14
Q Or An Ab Co Diop	39,19 5,79 9,37 33,25 3,74	34,04 9,04 14,68 32,66 1,79	44,86 11,87 13,19 19,37 2,31	51,85 13,59 7,98 17,09 2,37	42,57 12,58 12,34 23,43 1,21	16,35 31,43 9,62 37,65 0,19	41,43 10,45 16,02 22,00 2,73
Hed Ens Fe Mt He Il	1,22 2,75 0,23 0,45	0,82 1,57 0,35 0,68	1,19 2,19 0,43 0,74	0,74 1,64 0,51 0,72	1,29 1,36 0,81 0,81	1,22 1,94 0,02 0,07	2,26 3,83 0,66 0,72

Ponces de Pintade Rocroy

Ponces de Pintade Anse du Morne Rouge

Ponces de Pintade Anse à la Fontaine

ANALYSES CHIMIQUES (ANALYSES REPRESENTATIVES)
DES VERRES

71,21 15,03 4,82 0,13	71,58 14,33 4,52	72,13 14,68	J 1007/A1 (2)	J 1007/B2 (4)	J 1007/B2 (1) faciès foncé 72,23	7A (1)
15,03 4,82 0,13	14,33 4,52	14,68		75,51	70.00	
4,82 0,13	4,52	14,68				CO 15
0,13	4,52		13,38	13,69	14,06	68,15
		4,65	2,82	1,62		14,16
1 00	0.19	0,12	0	0,04	4,20	5,06
1,08	0,89	0,76	0,07	0,04	0,01	0,20
3,73	3,43	3,83	2,16		0,95	0,98
1,51	0,96	1,31	1,37	1,92	3,16	3,90
				1,93	2,42	3,50
						1,65
-,	0,55	0,04	0,59	0,44	0,54	0,62
99,70	98,11	99,30	97,16	97,63	99,78	98,57
47,69	52,30	51,99	57.48	51 . 72	12 69	21 02
7,91	7,74	4.90				31,93
18,50	17,01					9,75
12,77						18,05
4.31						29,61
	2322	.,00	3,77	4,74	2,27	•
						1
2,68	2.21		0.17	0.62	2.25	
W 185092	0.000	-1	0,17	0,02	2,36	1,97
4.19	4.04	3.53	1 31	0.50		
						4,23
0,93	1	1,21	1,12	0,83	1,05	0,81 1,17
	47,69 7,91 18,50 12,77 4,31 2,68 4,19 0,67	1,34 1,31 0,49 0,53 99,70 98,11 47,69 52,30 7,91 7,74 18,50 17,01 12,77 8,12 4,31 5,09 2,68 2,21 4,19 4,04 0,67 0,55	1,34	1,34	1,34 1,31 0,83 1,32 2,11 0,49 0,53 0,64 0,59 0,44 99,70 98,11 99,30 97,16 97,63 47,69 52,30 51,99 57,48 51,72 7,91 7,74 4,90 7,80 12,46 18,50 17,01 19,00 10,71 9,52 12,77 8,12 11,08 11,59 16,33 4,31 5,09 4,66 5,77 4,74 2,68 2,21 1,89 0,17 0,62 4,19 4,04 3,53 1,31 0,59 0,67 0,55 1,01 1,17 0,78	1,34 1,31 0,83 1,32 2,11 1,90 0,49 0,53 0,64 0,59 0,44 0,54 99,70 98,11 99,30 97,16 97,63 99,78 47,69 52,30 51,99 57,48 51,72 42,69 7,91 7,74 4,90 7,80 12,46 11,22 18,50 17,01 19,00 10,71 9,52 15,67 12,77 8,12 11,08 11,59 16,33 20,47 4,31 5,09 4,66 5,77 4,74 2,27 2,68 2,21 1,89 0,17 0,62 2,36 4,19 4,04 3,53 1,31 0,59 2,97 0,67 0,55 1,01 1,17 0,78 1,05

Ponces de Pintade Rivière Noire

Ponces de Pintade Calbassiers

ANALYSES CHIMIQUES DES VERRES (ANALYSES REPRESENTATIVES)

⁽¹⁾ verre de la mésostase

⁽²⁾ verre inclus dans les clinopyroxènes
(3) verre inclus dans les magnétites
(4) verre inclus dans les plagioclases

⁽⁵⁾ verre inclus dans les orthopyroxènes

⁽¹⁾ verre de la mésostase

⁽²⁾ verre de la mesostase (2) verre inclus dans les clinopyroxènes (3) verre inclus dans les magnétites (4) verre inclus dans les plagioclases (5) verre inclus dans les orthopyroxènes

⁽¹⁾ verre dans la mésostase
(2) verre inclus dans les clinopyroxènes
(3) verre inclus dans les magnétites
(4) verre inclus dans les plagioclases
(5) verre inclus dans les orthopyroxènes

BIBLIOGRAPHIE

- AITKEN, M.J., BOWMAN, S.G.E. (1975). Thermoluminescent dating: assessment of α particules contribution. Archaeometry, 17 (1), p. 132-138.
- ANDERSON, A.T. (1976). Magma Mixing: petrological process and volcanological tool. J. Volcanol. Geotherm.Res., 1: 3-33.
- ANDERSON, T.H., SCHMIDT, V.A. (1983). The evolution of Middle America and the Gulf of Mexico. Caribbean Sea region during Mesozoïc time. Geol. Soc. of America Bull., v. 94, p. 941-966, 18 figs., 1 table, Août 1973.
- ASH-FLOW TUFFS (1979). Edited by C.F. CHAPIN, et W.E. ELSTON
- AUBOIN, J., BLANCHET, R., STEPHAN, J.F., TARDY, M. (1977). Tethys (Mesogée) et Atlantique: données de la géologie. <u>C.R. Acad. Sc., Paris</u>, t. 285, (24 Octobre 1977).
- ARCULUS, R.J. (1976). Geology and geochemistry of the alkali-andesite association of Grenada, Lesser Antilles island arc. <u>Geol. Soc. Americ.Bull.</u>, 87, 612-624.
- BAKSI, A.K. (1973). Quantitative Unspiked Argon Runs in K.Ar dating. <u>Can. Journal of Earth Sciences</u>, vol. 10 (9), 1973.
- BAKSI, A.K. (1973). K.Ar Dating-Loading Techniques in Argon Extraction works and Sources of Air Argon Contamination. <u>Can.Journal of Earth Sciences</u>, vol.10, (11). 1973.
- BAKSI, A.K. (1974). Isotopic fractionation of a loosely held atmospheric argon component in the Picture Gorge Basalts. E.P.S.L., 21 (1974) 431-438.
- BALLARD, R.D., BRYAN, W.B., DAVIS, K., DEBOER, J., DELONG, S., DICK, M.J.B., EMERY, K.O., FOX, P., SPYDELL, R., STOUP, J., THOMPSON, G., WRIGHT, R., UCHIPI, E. (1979). Geological and geophysical investigation of the Mid Cayman Rise spreading center: initial results and observations. Proc.2nd. Maurice Ewing symposium A.G.U.
- BASALTIC VOLCANISM STUDY PROJECT (1981). Basaltic volcanism on the Terrestrial Planets., Pergamon Press. Inc., New York, 1286 pp.
- BAUBRON, J.C. (1974, 1980). Ages conventionnels sur roche totale par la méthode K.Ar. Analyses BRGM, non publié.
- BAUBRON, J.C., BOUYSSE, P., MAURY, R., WESTERCAMP, D. (1979). L'ilot de Redonda, un jalon de l'arc volcanique récent des Petites Antilles. Bull. B.R.G.M., IV, n° 3/4, 1979, pp. 273-283.
- BECKINSALE, R.D., GALE, M.H. (1969). A reappraisal of the de-cay constants and braching ratio of 40K. <u>Earth and Planet. Sci. Letters</u>, 6/4, 289-294.
- BELL, W.J. (1977). Thermoluminescence dating : revised dose-rate data. Archeometry, 19, 99.
- BELL, W.T. (1979). Thermoluminescence dating : radiation, dose-rate data. Archeometry, 21,2, 243-245 (1979).
- BELLIZZIA, A., BLANCHET, R., BECK, C., STEPHAN, J.F. (1980). La chaîne caraïbe du Mésozoïque à l'Actuel, tectogenèse et modèle d'évolution géodynamique. Colloque C5: Géologie des chaînes alpines issues de la Téthys (1980).

- BELLON, H. (1974). Ages conventionels sur roche totale par la méthode K.Ar. Analyses, Univer. Paris-Sud Orsay, non publié.
- BERGER, E. (1981). Enclaves ultramafiques, mégacristaux et leurs basaltes-hôtes en contexte océanique (Pacifique Sud) et continental (Massif Central français). Thèse d'état - Orsay(1981).
- BIJU-DUVAL, B., MASCLE, A., MONTADERJ., L, WANNESSON, J. (1978). Seismic investigations in the Colombia, Venezuela, and Grenada basins and on the Barbados Ridge for the future IPOD Drilling. Geologie en Mijnbow, vol. 57 (2), pp. 105-116 (1978).
- BIJU-DUVAL, B. (1980). De la Téthys aux mers intra-alpines actuelles. Introduction. Colloque C5 PP. 232-237.
- BOUDON, G. (1979-1980). Levés géologiques sur le massif de la Soufrière de Guadeloupe. Rapport interne IPG, non publié.
- BOUDON, G. (1981). Reconstitution des différents épisodes éruptifs du volcanisme quaternaire de la Guadeloupe. Rapport interne I.P.G., non publié.
- BOUYSSE, P. (1979). Caractères morphostructuraux et évolution géodynamique de l'arc insulaire des Petites Antilles. <u>Bull. B.R.G.M.</u>, IV, 1979, pp. 185-210.
- BRIDEN , J.C., REX, D.C., FALLER, A.M., TOMBLIN, J.K., (1978). K/Ar geochronology and paleomagnetism of volcanic rocks in the Lesser Antilles island arc. Philos. Trans. r. Soc., London, 291, A 1383, 485-528.
- BROWN, G.N., HOLLAND, J.G., SIGURDSSON, H., TOMBLIN, J.F., ANGULUS, R.J. (1977). Geochemistry of the Lesser Antilles volcanism island arc. Geoch. cosmochimica Acta, 41, pp. 785-801.
- BUNCE, T.E., PHILLIPS, J.D., CHASE, R.L., BOWIN, C.O, (1970). The Lesser Antilles arc and the eastern margin of the Caribbean Sea. In: The Sea, vol. 4, Part 2, A.E., MAXWELL Ed., (Wiley. Inter science N.Y.) 359-385.
- BUTTERLIN, J. (1977). Geologie structurale de la région des Caraïbes. Mexique, Amérique Centrale, Antilles (Cordillère caraïbe). Ed. Masson, Paris.
- CASSIGNOL, C., DAVID, B., GILLOT, P.Y., (1977). Contribution au dosage de l'Argon dans l'échantillon de glauconite Gl-O. Geostandarts newletter, vol. I, n°2, Oct. 1977.
- CASSIGNOL, C., CURNETTE, Y., DAVID, B., GILLOT, P.Y. (1978). Technologie potassium-argon, Rapport CEA-R, 4908, 1978.
- CASSIGNOL, C. (1979). Quelques recherches sur la méthode potassium-argon. <u>Bull.</u> Assoc. franç. étude. quat., 1979, 1.2., p. 27-33.
- CASSIGNOL,; C., GILLOT, P.Y. (1982). Range and effectiveness of unspiked potassium-argon dating experimental groundwork and applications. <u>In numeral dating in stratigraphy</u> ed. by G.S. Odin, 1982, John Wiley and Sons.

- CHEVALLIER, L., VATIN-PERIGNON, N. BLANC, F. (1983). Les cycles éruptifs récents dacitiques de la Soufrière de Sainte-Lucie Petites Antilles. Dynamisme, structures et chronologie. PIRPSEV ,1983.
- CLARK, T.F. (1978). Buoyant orean floor and the evolution of the Caribbean. Journal of geophysical research, vol. 83, n° B8, pp. 3949-3954.
- CLARK, T.F. (1978). Heat flow in the eastern Caribbean . <u>Journal of geophysical</u> research, vol. 83, n° B 12.
- CLOCCHIATTI, R., MERVOYER, B., (1976). Contribution à l'étude des cristaux de quartz de la Guadeloupe. Bull. BRGM, 2nd série, section 4, 311-324.
- COCUSSE, P.L. (1983). La Soufrière de Guadeloupe. Etude pétrologique. <u>D.E.A.</u>. Lille, 1983.
- CURTIS, G.H. (1966). The problem of contamination in obtaining Accurate Dates of young geologic Rocks. In Potassium Argon dating, compiled by O.A. SCHAEFFER and J. ZAHRINGER. Ed. Springer Verlag, Berlin, Hedeilberg, 1 vol., 234 p., New York.
- DAGAIN, J. (1981). La mise en place du massif volcanique Madeleine-Soufrière, Basse Terre de Guadeloupe, Antilles. <u>Thèse 3è Cycle</u>, Université de Paris-Sud, Orsay, 1981.
- DALRYMPLE, G.B., MOORE, J.G. (1968). Argon 40: Excess in submarine Pillow Basalts from Kilauea Volcano, Hawaï. Science 161 (1968) 1132-1135.
- DALRYMPLE, G.B. (1969). 40/36 Ar Analyses of historic lava flows. <u>E.P.S.L.</u> 6 (1969) 47-55.
- DALRYMPLE, G.B., LANPHERE, M.A. (1969). Potassium-Argon dating. Principles, techniques and applications to geochronology. W.H. FREMAN AND COMPANY, Ed., 1 vol., 258 p., San Francisco.
- D'ARCO, PH. (1982). Contribution à l'interprétation géothermométrique et géobarométrique des paragenèses calco-alcalines de l'arc des Petites Antilles; cristallisation fractionnée de la série du Quill, Ile de Saint-Eustache). Thèse 3è Cycle, Brest, 1982.
- DEMEULEMEESTER, P. (1982). Contribution à l'étude radiométrique à l'argon et au strontium des massifs cristallins externes (Alpes françaises). Distribution cartographique des âges sur biotites et amphiboles. Thèse 3è Cycle, Grenoble, 1982.
- DOREL, J. (1978). Seismicité et structure de l'arc des Petites Antilles et du bassin atlantique. Thèse d'Etat, Université Pierre et Marie Curie (1978).
- ENGEL, A.E., ENGEL, C.J., HAVENS, R.G. (1965). Chemical characteristics of oceanic basalts and the upper mantle. <u>Geol. Soc. Americ. Bull</u>, vol. 76, pp. 719-734.
- EWART, A. (1976). Mineralogy and chemistry of modern orogenic lavas. Some statistics and implications. Earth. Planet. Sci.Letters, vol. 31, 417-432.

- FLEMMING, S.J. (1970). Study of thermoluminescence in supplementing radiocarbon dating. Archaeometry, 9, 1970
- GADALIA, A. (1983). Prospection géothermique de la zone Bouillante-Vieux Habitants (Guadeloupe). Exploitation géologique. Rapport interne BRGM (1983).
- GERLACH, D.C., GROVE, T.L. (1982). Petrology of Medecine Lake Highland volcanics: Characterisation of Endmembers of Magma Mixing. Contrib. Mineral. Petrol. (1982) 80: 147-159.
- GILLOT, P.Y. (1974). Chronométrie par la méthode potassium-argon de laves des Causses et du Bas-Languedoc : interprétations. Thèse Université Paris-Sud, Orsay, 1974.
- GILLOT, P.Y., CHIESA, S., PASQUARÉ, G., VEZZOLI L. (1982). 33 000 yr K-Ar dating of the volcano-tectonic horst of the Isle of Ischia, Gulf of Napoli. Nature, vol. 299, n° 5880, 242-244 (1982).
- GILLOT, P.Y., NATIVEL, P. (1982). K.Ar chronology of the ultimate activity of Piton des Neiges volcano, Réunion island, Indian océan. <u>Journal of volcanology and geothermal Research</u>, 13 (1982), 131-146.
- GILLOT, P.Y., VALLADAS, G., REYSS, J.L. (1978). Dating of lavas flow using a granitic enclave. Application to the Laschamp magnetic event. PACT, 3, 1978.
- GOURINARD, Y. (1975). Méthode potassium-argon et chronologie quaternaire. <u>Bull.</u> Assoc. franc. étude quat., 1975, 2, p. 83-89.
- GROVE, T.L., GERLACH, D.G., SANDO, W.T., (1982). Origin of Calc.Alkaline series lavas at Medicine Lake volcano by fractionation, assimilation and mixing. Contrib. Mineral. Petrol. (1982), 80: 160-182.
- GUERIN, G., GILLOT, P.Y., LE GARREC, M.J., BROUSSE, R. (1981). Age subactuel, des dernières manifestations éruptives du Mont-Dore et du Cezallier. <u>C.R.</u> Acad. Sc. Paris, t. 292 (19.03.1981).
- GUERIN, G., PETIT, R.H. (1983). Datation par thermoluminescence des laves de la Guadeloupe : quelques problèmes. C.R. Acad. Sci., 1983.
- GUERIN, G., VALLADAS, G. (1980). Thermoluminescence dating of plagioclases.

 Nature 206, vol. 2 (86), p. 697-699.
- HAMILTON, E.I. (1965). Applied geochronology. <u>Academic Press, Inc., Londres, Ltd.</u>
- HOUTZ, R.E., LUDWIG, W.L. (1977). Structure of the Colombia Basin , Caribbean sea, from the profiler-sonobuoy measurements. <u>J.G.R.</u>, vol. 82, n° 30.
- KEARY, P., PETER, G., WESTBROOK, G.K. (1975). Geophysical maps of the eastern Caribbean. Journal of the geophysical society, vol. 131, part 3, may 1975.
- KRUMMENACHER, D. (1970). Isotopic composition of argon in modern volcanic rocks. E.P.S.L. 8 (1970), 109-117.

- KUNO, H. (1950). Petrology of Hakone volcano and the adjacent areas, Japan. Geol. Soc. Am. Bull., 61: 957-1020.
- LACROIX, (1936). Les caractères lithologiques des Petites Antilles. Livre jubilaire cinquantenaire. Soc. Géol. Belgique, Liège, 1924, p. 969-976.
- LADD, J.W. (1976). Relative motion of South America and Caribbean tectonics. Geol. Soc. Americ. Bull, 87, pp. 969-979.
- LADD, J.W., WATKINS, J.S. (1978). Active margin structure within the north slope of the Muertos trench. Geologie en Mijnbown, sp. issue, vol. 57 (2), pp. 225-260.
- LADD, J.W., WATKINS, J.J. (1978). Tectonic development of the trench arc complexes on the norhtern and southern margins of the Venezuela Basin. In J.S. WATSKINS et al. editors: "Geologic investigations of continental slopes and rises". Studies in Geology Americ. Assoc. Petrol. Geol (TUBA).
- LADD, J.W. (1980). Caribbean plate Tectonics. <u>Colloque C5</u>, géologie des chaînes alpines issues de la Téthys., pp. 244-248.
- LUDWIG, W.I., HOUTZ, R.E., EDWING, J.I. (1975). Profiler sonobuoy measurements in Columbia and Venezuela Basins, Caribbean sea. Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull., vol. 59, n°1, pp. 115-123.
- LURH, J.F., CARMICHAEL, I.S.E. (1980). The Colima Volcanic complex, Mexico. Contrib. Mineral. Pétrol., 71, 343-372 (1980).
- LUYENDYCK, B.P. (1970). Dips of downgoing lithospheric plates beneath island arcs. Geol. Soc. Americ. Bull., vol. 81, pp. 3411-3416.
- MAC DOUGALL, I., POLACH, H.A., STIFF, J.J. (1969). Excess radiogenic argon in young subaerial basalts from the Auckland volcanic field, New Zealand. Geochimica and Cosmochimica Acta, 1969, vol.33, pp. 1485-1520.
- MAC DOUGALL, I., WATKINS, N.D., KRISTJANSSON, L. (1976). Geochronology and paleomagnetism of a miocene-pliocene lava sequence at Bassastadaa, Eastern Iceland. American Journal of Science, vol. 276, 1978, pp. 1098-1095.
- MALFAIT B.T., DINKELMAN, M.G. (1972). Circum Caribbean tectonic and igneous activity and the evolution of the Caribbean plate. Geol. Soc. Americ. Bull., vol. 83, n°2, pp. 251-272.
- MARTIN-KAYE, P.H.A. (1956 à 1961). Geological survey of the Windword Islands. Rapports d'avancement non publié des <u>Géologues du Gouvernement</u>, n° 1-12.
- MARTIN-KAYE, P.H.A. (1969). A summary of the geology of the Lesser Antilles. Overseas geol. miner. Resources, G.B., 10, pp. 172-206.
- MASCLE, A., BIJU-DUVAL, B., LETOUZEY, J., BELLIZZIA, A., AUBOUIN, J., BLANCHET, R., STERHAN, J.F., BECK, C. (1979). Estructura y evolucion de los margines este y sur del Caribe. Analisis de los problemas del Caribe. Bull. BRGM, (2), IV, 314, 1979.

- MATTSON, P.H. (1979). Subduction, buyoant braking, flipping and strikeslip fault in the Northern Carribean. J. Geol., U.S.A., 87, pp. 293-304.
- MATTSON, P.H., LEWIS, J.F. (1980). Structural trends and tectonic history of the Northern Caribbean. <u>Colloque C5</u>, Géologie des chaînes alpines issues de la Téthys, pp. 30-37.
- MAURY, R.C. (1976). Contamination (par l'encaissant et les enclaves) et cristallisation fractionnée des séries volcaniques alcalines, continentales (Massif Central français) et océaniques (Pacifique Central) : l'origine des laves acides. <u>Thèse d'Etat</u>, Orsay, 1976.
- MURPHY, A.J., SYKES, L.R., DONNELLY, T.W. (1970). Preliminary survey of the microseismicity of the northern Caribbean. <u>Geol. Soc. Americ. Bull.</u> (81), pp. 2459-2464.
- MOLNAR, P., SYKES, L. (1969). Tectonics of the Caribbean and Middle America regions. Geol. Soc. Amer. Bull., 80 (9), pp. 1639-1686.
- ODIN, G.S. et collaborateurs (1976). La glauconite G1-0, étalon interlaboratoires pour l'analyse radiochronologique. <u>Analusis</u>, 1976, v.4, n°6, pp. 287-291.
- O'HARA, M.J. (1977). Geological evolution during fractionnal crystallisation of a periodically refilled magma chamber. Nature, 266: 503-507.
- PATERNE, M.(1980). Chronologie des éruptions du massif de la Soufrière (Guadeloupe-Petites Antilles). Essai de comparaisons des périodes d'activité volcanique de quelques régions volcaniques. Thèse 3è Cycle, Bordeaux (1980).
- PELLETIER, B. (1976). Contribution à l'étude du volcanisme d'arcs insulaires en Martinique. Bull. BRGM IV (4), 1976, pp. 267-296.
- PISANI, C., DELLA PORTA, P. (1967). A non evaporable getter cartridge for use in UHV systems and in Appendage pumps. Al nuovo Cimento, suppl., vol.5, pp. 261-273, 1967.
- PITMAN, W.C., TALWANI (1972). Sea floor spreading in the north Atlantic. Geol. Soc.Americ. Bull., 83, pp. 619-646.
- PRESCOTT, J.R., STEPHAN, L.G. (1982). The contribution of cosmic radiation to the environmental dose for TL dating. PACT, vol.6, p. 17.
- REA, W.J., BAKER, P.E. (1980). The geochimical characteristics and conditions of petrogenesis of the volcanic rocks of the Northem Lesser Antilles. A review. <u>Bull. volc.special review</u>, vol. 43 (2), 1980, pp. 325-336.
- REUBER, I. (1982). Générations successives de filons grenus dans le complexe ophiolitique d'Antalya (Turquie). Origine, évolution et mécanisme d'injection de liquides. Thèse, Université de Strasbourg.
- ROEDER, D.H. (1975). Tectonics effect of dip changes in subduction zones. Americ. $\underline{\text{J.S.}}$, 275, pp. 252-264.

- SAKUYAMA, M. (1979). Evidence of magma mixing petrological study of shiroumaoike calc-alkaline andesite volcano, Japan. <u>J. volc. géoth. Research</u>, 5, 1979, pp. 179-208.
- SAUNDERS, J.B. et al. (1974). Cruise synthetics. Leg 15. Initial reports of the D.S.D.P. (JOIDES). Nath. Sci. Found. Washington, vol. XV, pp. 1077-1111.
- SAUNDERS, J.B. (1980). The development of the Caribbean with special reference to the southern margin and Venezuela Basin. Colloque C5: Géologie des chaînes alpines issues de la Téthys (1980), pp. 236-243.
- SCHELL, B.A., TARR, A.C. (1978). Plate tectonics of the northeastern Caribbean sea region. Geol. en Minjbouw, sp. issue, vol. 57 (2), pp. 319-322.
- SEMET, M., VATIN-PERIGNON, N., VINCENT, P., JORON, J.L. Magma mixing once moore, its involment in triggering the 16 th. century volcanic activity at the Soufrière, Gaudeloupe (FWI). (à paraître).
- SEMET, M. (1982). La Soufrière de Guadeloupe : présentation générale et programme PIRPSEV 1982. Programme PIRPSEV, 1982.
- SMITH, A.L., ROOBOL, M.J., GUNN, M.J. (1980). The Lesser Antilles. A discussion of the island arc magmatism. <u>Bull. volc. special issue</u>, vol. 43, n°2, 1980, pp. 287-302.
- SPARKS, J.R.J., SIGURDSSON, H., WILSON, L. (1977). Magma mixing: a mechanism for triggering acid explosive eruptions. Nature, 267, 5609, pp. 315-318.
- STEIGER, R.H., JAGER, E. (1977). Subcommission on geochronology: convention of the use of decay constants in geo and cosmochronology. <u>Earth and Planet</u>. <u>Sci. Letters</u>, 36, 1977, pp. 359-362.
- STEINBERG, M., TOURAY, J.C., TREUIL, M., MASSARD, P. (1979). Geochimie, principes et méthodes. Tome II : cristallochimie et éléments en traces. <u>Doin ed.</u>, Paris, 1979.
- TOKSOZ, N. (1980). La subduction de la lithosphère. Dans "La dérive des continents" diffusion Belin.
- TOMBLIN, J.F. Dacites of the Lesser Antilles. In <u>Trondhjemites</u>, dacites and related rocks, ed. F. Barker, pp. 601-608.
- TREUIL, M., VARET, J. (1973). Critères pétrologiques, géochimiques et structuraux de la genèse et de la différenciation des magmas basaltiques : exemple de l'Afar. Thèse de Doctorat d'Etat, orsay, 1973.
- VALLADAS, G., GILLOT, P.Y. (1978). Dating of the Olby lava flow using heated quartz pebbles : some problems. PACT, 2, 1978.
- VALLADAS, G. (1979). La datation des roches par la thermoluminescence. Applications. Bull. Assoc. from. Etude Quat., 1979, 1-2, pp. 43-52.

- VALLADAS, G. (1979). Some observations of the thermoluminescence response dependance of quartz on dose rate. Processings of the 19th International symp. Archaeometry and archaelogical prospection, London, 28-31, march 1979.
- VALLADAS, G., FERREIRA, G. (1980). On the dose-rate dependance of the thermoluminescence response of quartz. Nuclear Inst. and Meth., 175, p. 216-218.
- VATIN-PERIGNON, N., BLANC-PETIT, F. (1983). Preliminary results about the last eruptive Cycle in the Madeleine-Soufrière Massif (Southern Guadeloupe. French West. Indies. Terra cognita, 3, 1983, pp. 153-154.
- VINCENT, P.M., VATIN-PERIGNON, N., SEMET, M., CHEMINEE, J.L. (1979). Le dôme de la Soufrière (Guadeloupe) : son âge et son mode de mise en place. C.R. Acad. Sc. Paris, t. 288, 1979.
- WALSCH, A. (1955). The application of absorption atomic spectra to chemical analyses. Spectrochimica acta, 7, 108.
- WESTBROOK, G.K. (1975). The structure of the crust and upper mantle in the region of Barbados and the Lesser Antilles. Geophys. J.R., Act. Soc., 1975, 43, 201-242.
- WESTERCAMP, D. (1977). Levés géologiques, évaluation et zonation des risques volcaniques à la Soufrière de la Guadeloupe. Rapport interne BRGM, 77 Ant. 29, pp. 1-32.
- WESTERCAMP, D. (1977). Evolution des séries volcaniques de Martinique et des arcs insulaires des Petites Antilles dans leur contexte structural. 8th. Carib. geol. conf. Curação, résumé, pp. 227-228.
- WESTERCAMP, D. (1979). Diversité, contrôle structural et origine du volcanisme récent dans l'arc insulaire des Petites Antilles. Bull. BRGM, 2è série, IV, 3/4, pp. 211-226.
- WESTERCAMP, D. (1980/81). Assessment of volcanic hazards at Soufrière de Guadeloupe, FWI. Bull. BRGM, IV (2) - 1980-81, pp. 187-192.
- WESTERCAMP, D., MERVOYER, B. (1976). Les séries volcaniques de la Martinique et de la Guadeloupe, Petites Antilles françaises. Rapports stratigraphiques et pétrographiques. Bull. BRGM, 2è série, 4, pp. 229-242.
- WESTERCAMP, D., TOMBLIN, J.F. (1979). Le volcanisme récent et les éruptions historiques de la partie centrale de l'arc insulaire des Petites Antilles. Bull. BRGM, section IV, n° 3/4, 1979, pp. 293-319.
- WESTERCAMP, D., TAZIEFF, H. (1980). Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, La Désirade. Guides géologiques régionnaux (ed. Masson), 1980.
- ZIMMERMAN, C., KUDO, A.M. (1976). The role of pargasitic horneblende in andesite genesis, Rio Grande Rift, New-Mexico. Geol. Soc. Amer., Abstr., 10, p. 522.
- ZIMMERMAN, D.W., (1971). TL dating using fine grains from pottery. Archeometry, 13, (1), p. 29.

THESE DE 3º CYCLE

Titre de l'ouvrage :

CORRELATIONS CHRONOLOGIQUES ET GEOCHIMIQUES DES FORMATIONS VOLCANIQUES DU SUD DE LA BASSE-TERRE DE GUADELOUPE (PETITES ANTILLES)

- début du cycle récent -

Nom de l'auteur : Françoise BLANC

Etablissement : Université Scientifique et Médicale de Grenoble

RESUME

Cette étude, effectuée dans le cadre des Observatoires Volcandues de l'Institut de Physique du Globe de Paris et des programmes de Recherche du CNRS sur l'Histoire des volcans actifs, contribue à la chronologie des événements récents du Sud de la Basse-Terre de Guadeloupe (Petites Antilles) pour laquelle des lacunes importantes subsistaient du fait de mauvaises conditions d'affleurements.

Les méthodes employées sont : 1) le potassium-argon (CFR, Gif), 2) la thermoluminescence (CFR, Gif) et 3) la géochimie des majeurs et des traces utilisée en tant que critère de corrélation des différents dépôts (Grenoble, Saclay).

- 1) La méthode du potassium-argon, dans son adaptation aux périodes récentes (inférieure à 1 Ma) a permis d'obtenir l'âge des coulées de laves massives basaltiques à andésitiques, appartenant au cycle Pitons de Bouillante — Sans-Toucher, aux Monts Caraïbes et à la phase initiale du cycle récent Madeleine — Soufrière.
- 2) La méthode de la thermoluminescence sur quartz a été utilisée pour la datation de certains niveaux ponceux dacitiques à quartz appartenant à la Chaîne andésitique de Bouillante et au cycle récent Madeleine Soufrière.
- 3) Les éléments majeurs, incompatibles (La, Th) et de transition (Sc, Co) des niveaux ponceux et les analyses des phases minérales à la microsonde ont permis d'établir ou de préciser des corrélations jusqu'ici rendues aléatoires par les conditions de terrain, de regrouper dans un même cycle des niveaux attribués à des cycles différents, et de déceler des indices de mélanges magmatiques.

Les résultats obtenus modifient la chronologie de la Basse-Terre comme suit :

- Ia fin du cycle des Pitons de Bouillante Sans Toucher est aux environs de 600 000 ans,
- celle de la Chaîne andésitique de Bouillante est proche de 244 000 ans,
- et le début de l'activité des Monts Caraïbes se situe aux environs de 500 000 ans.

Le résultat le plus important concerne le début du cycle récent Madeleine — Soufrière pour lequel une phase Carmichäel est datée entre 150 000 et 100 000 ans ; son activité débute par un épisode explosif (ponces à quartz de l'anse des Pères et ponces andésitiques de Pintade) et se poursuit par un épisode effusif de grande importance (coulées de Trois Rivières, groupes nord et sud). Entre la fin de la phase Carmichäel et le début de la phase Madeleine, une période d'accalmie est mise en évidence ; sa durée est voisine de 70 000 ans.

MOTS-CLES

Chronologie ; corrélation ; formation volcanique ; potassium-argon ; thermolumicescence ; géochimie ; microsonde ; mélande magmatique ; phase Carmichäel ; cycle récent Madeleine — Soufrière ; Basse-Terre de Guadeloupe ; Petites Antilles.

UNIVERSITE DE GRENOBLE
INSTITUT DE GEOLOGIE
DOCUMENTATION
RUE MAURICE GIGNOUX
E 38031 GRENOBLE CEDEX
TEL. (76) 87.46.43