



HAL
open science

Spectroscopie haute résolution de spectres rotationnellement denses dédiée à la détection en phase gazeuse de molécules d'intérêt environnemental et défense

Anthony Roucou

► **To cite this version:**

Anthony Roucou. Spectroscopie haute résolution de spectres rotationnellement denses dédiée à la détection en phase gazeuse de molécules d'intérêt environnemental et défense. Physique [physics]. Université du Littoral Côte d'Opale, 2018. Français. NNT : 2018DUNK0482 . tel-02001872

HAL Id: tel-02001872

<https://theses.hal.science/tel-02001872v1>

Submitted on 31 Jan 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D'OPALE

ÉCOLE DOCTORALE : SMRE (ED 104)

Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère
Maison de la Recherche en Environnement Industriel de Dunkerque

THÈSE DE DOCTORAT

DISCIPLINE : Physique
soutenue le 17/10/2018 par
Anthony ROUCOU

SPECTROSCOPIE HAUTE RÉOLUTION DE SPECTRES
ROTATIONNELLEMENT DENSES DÉDIÉE À LA DÉTECTION EN
PHASE GAZEUSE DE MOLÉCULES D'INTÉRÊTS
ENVIRONNEMENTAL ET DÉFENSE

Composition du jury :

Rapporteurs :	Pierre ASSELIN	Chargé de recherche CNRS (MONARIS - UMR 8233, Sorbonne Université, Paris)
	María Luisa SENENT DIEZ	Directeur de recherche (IEM - Spanish National Research Council (CSIC), Madrid)
Examineurs :	Laurent MARGULÈS	Professeur (PhLAM - UMR 8523, Faculté des Sciences et Technologies, Université Lille Nord de France, Villeneuve d'Ascq)
	Lam NGUYEN	Maître de conférences (LISA - UMR 7583, Université Paris-Est Créteil, Université Paris Diderot, Créteil)
Directeur de thèse :	Arnaud CUISSET	Professeur (LPCA - Université du littoral Côte d'Opale)
Co-directeur de thèse :	Gaël MOURET	Professeur (LPCA - Université du littoral Côte d'Opale)
Membre invité :	Philippe ADAM	Responsable du domaine scientifique photonique DGA/DS/MRIS (Ministère des Armées)

Abstract

In recent decades, molecular spectroscopy has benefited from the progress of spectrometers, particularly in terms of selectivity and sensitivity, and from the continuous advancement of the analysis methods and quantum chemistry calculations. Today, rotational spectroscopy is moving towards the analysis of more complex molecular systems spectrally characterized by a high density of lines. The spectral congestion of the species studied in this thesis is not only explained by low rotational constants, but also by the presence of vibrational states excited at room temperature, a high isotopic richness, a high degree of line splitting due to large amplitude motions or by a complex conformational landscape. This thesis thus illustrates various scenarios through the studies of thionyl chloride, nitrotoluenes and methoxyphenols. The rovibrational spectra of the ν_2 and ν_5 bands of the isotopologues of thionyl chloride were measured in far-infrared at the SOLEIL synchrotron and analyzed using a semi-automatic approach based on evolutionary algorithms.

The isomers of nitrotoluene have been targeted for military application as explosive taggants (TNT), the pure rotation spectra were measured in the microwave region in molecular jet and in the millimeter-wave region at room temperature. The millimeter-wave spectrum of 3-nitrotoluene was especially weak and congested with very large internal rotation splittings (up to several GHz) due to a very weak rotational barrier ($V_3 = 6.7659(24)\text{cm}^{-1}$). The detection limit was estimated and a linelist established. The 2-nitrotoluene and 4-nitrotoluene millimeter-wave spectra have been also partially analyzed.

Finally, methoxyphenols emitted during biomass fires have also been studied as they are secondary organic aerosol precursors for their future atmospheric detection. Combined with quantum chemistry calculations, the analysis of the millimeter-wave spectrum of the 3-methoxyphenol measured at room temperature permitted the relative stability of four conformers to be determined.

Keywords : rotationally dense spectra, evolutionary algorithms, internal rotation, conformational landscape, environmental and defense interest molecules

Résumé

Ces dernières décennies, la spectroscopie moléculaire a bénéficié du progrès des spectromètres, notamment en terme de sélectivité et sensibilité, et de méthodes d'analyse et de calculs de chimie quantique toujours plus avancés. Désormais, la spectroscopie rotationnelle s'oriente vers l'analyse de systèmes moléculaires plus complexes caractérisés spectralement par une forte densité de raies. La congestion spectrale des espèces étudiées dans ma thèse s'explique non seulement par de faibles constantes rotationnelles mais aussi par la présence d'états vibrationnels excités à température ambiante, une forte richesse isotopique, un haut degré de splittings dus aux mouvements de grande amplitude ou encore par un paysage conformationnel complexe. Cette thèse illustre ainsi divers scénarii à travers les études du chlorure de thionyle, des nitrotoluènes et des méthoxyphénols.

Les spectres rovibrationnels des bandes ν_2 et ν_5 des isotopologues du chlorure de thionyle ont été mesurés dans l'infrarouge lointain au synchrotron SOLEIL et analysés en utilisant une approche semi-automatique basée sur des algorithmes évolutionnaires.

Les isomères du nitrotoluène ont été ciblés pour leur intérêt défense comme traceurs d'explosif (TNT), les spectres de rotation pure ont été mesurés dans les régions micro-ondes en jet moléculaire et millimétrique à température ambiante. Le spectre millimétrique du 3-nitrotoluène était particulièrement faible et congestionné avec des splittings dûs à la rotation interne très importants (jusqu'à plusieurs GHz) en raison d'une barrière de rotation très faible ($V_3 = 6.7659(24) \text{ cm}^{-1}$). La limite de détection a été estimée et une liste de raies établie. Les spectres millimétriques des 2-nitrotoluène et 4-nitrotoluène ont également été partiellement analysés.

Enfin, les méthoxyphénols émis lors de feux de biomasse ont également étudiés comme précurseurs d'aérosols organiques secondaires pour leur détection atmosphérique future. Associée à des calculs de chimie quantique, l'analyse du spectre millimétrique du 3-méthoxyphénol mesuré à température ambiante dans la région millimétrique a permis de déterminer la stabilité relative de quatre conformères.

Mots clés : spectres rotationnellement denses, algorithmes évolutionnaires, rotation interne, paysage conformationnel, molécules d'intérêts environnemental/défense

Remerciements

Je souhaite remercier mon directeur de thèse Arnaud CUISSET pour la confiance qu’il m’a accordée tout au long de mon cursus universitaire et plus particulièrement pendant ma thèse. Je le remercie pour son accueil, sa bonne humeur, ses conseils et son implication dans mon projet professionnel. Je souhaite également remercier Gaël MOURET en tant que co-directeur pour son soutien et sa confiance. Je remercie tout particulièrement Guillaume DHONT et Franck HINDLE pour leur pédagogie et leur sympathie ainsi que chaque membre et post-doc de l’équipe THz du LPCA.

Je remercie Manuel GOUBET l’Université Lille-Nord de France pour son implication dans mes travaux de thèse, de m’avoir permis d’utiliser le spectromètre micro-onde à Transformée de Fourier du PhLAM et pour ses calculs de chimie quantique. Je remercie aussi chaleureusement Marie-Aline MARTIN DRUMEL et Olivier PIRALI de l’Institut des Sciences Moléculaire d’Orsay pour leur aide et leur disponibilité. Je remercie Isabelle KLEINER de l’Université Paris-Est Créteil de m’avoir appris à traiter les effets de rotation interne à l’aide de son programme BELGI. Je la remercie également pour son accueil, sa pédagogie et pour les nombreux échanges que nous avons eus. Je remercie Leo MEERTS de l’Université Radboud de Nimègue pour avoir partagé ses connaissances sur les algorithmes évolutionnaires et de m’avoir permis l’utilisation du serveur de calculs de l’Université de Nimègue. Je remercie également Dominique VERHAGHE du LISIC de Calais pour avoir permis l’installation du programme de Leo MEERTS sur le serveur de calcul de l’Université du Littoral Côte d’Opale (CALCULCO).

Je souhaite remercier mes financements de thèse, la région Haut-de-France et la Direction Générale de l’Armement (DGA). Je remercie le comité du GdR SPECMO pour avoir financé trois semaines de déplacement au LISA (Université Paris-Est Créteil) qui m’ont permis de travailler en collaboration avec Isabelle KLEINER. Je remercie également le réseau Franco-Néerlandais pour avoir sélectionné mon projet pour la bourse d’excellence EOLE (session printemps 2015) et pour avoir ainsi permis de travailler en collaboration avec Leo MEERTS.

J’aimerais aussi remercier Sabeth BTEICH et Daniele FONTANARI avec qui j’ai pu échanger sur le plan scientifique et personnel. Je remercie l’ensemble des personnes qui ont

su contribuer au bon déroulement de ma thèse, l'ensemble des doctorants, post-doctorants, ATER et chercheurs des différents laboratoires du site de Dunkerque (LPCA, UCEIV, UD-SMM, CCM et LOG) pour leur accueil ayant permis de m'intégrer facilement.

Enfin, j'aimerais exprimer toute mon affection à Marie-France et à Michel pour leur soutien et je remercie Thomas pour sa présence à mes côtés pendant ces trois années de doctorat.

Glossaire

AILES	Advanced Infrared Line Exploited for Spectroscopy
AOS	Aérosol organique secondaire
BELGI	BELGian Internal
CCM	Centre Commun de Mesures
CNQ	Couplage nucléaire quadrupolaire
CP-FT	Chirped Pulse-Fourier Transform
DGA	Direction Générale de l'Armement
DNT	Dinitrotoluène
CSIC	Consejo Superior de Investigaciones Científicas
IEM	Instituto de Estructura de la Materia
FFT	Fast Fourier Transform
FP	Fabry-Pérot
FTIR	Fourier Transform Infrared
FTMW	Fourier Transform Microwave
GC-FID	Chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme (Gas chromatography-flame ionization detector)
GC-MS	Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectroscopie de masse (Gas chromatography-mass spectrometry)
LDD	Limite de détection
LISA	Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques
LISIC	Laboratoire d'Informatique Signal et Image de la Côte d'Opale
LPCA	Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère
IAM	Internal Axis Method
IR	Infrarouge
IRL	Infrarouge lointain
IRM	Infrarouge moyen
MONARIS	Laboratoire des Molécules aux Nanos : Réactivité, Interactions, Structures
MP	Méthoxyphénol

NEP	Puissance équivalente de bruit (Noise-Equivalent Power)
NMR	Mesures par résonance magnétique nucléaire (Nuclear Magnetic Resonance)
NT	Nitrotoluène
PAM	Principal Axis Method
PES	Surface d'énergie potentielle (Potential Energy Surface)
PhLAM	Laboratoire de physique des Lasers, Atomes et Molécules
RAM	Rho-Axis Method
RAM36	Rho Axis Method for 3 and 6 fold barriers
REMPI	Ionisation multiphotonique améliorée par résonance (Resonance-enhanced multiphoton ionization)
RMS	Déviatiion standard (Root Mean Square)
S/B	Rapport signal-sur-bruit
SIMO	Spectromètre à impulsions microondes
slm	Litre standard par minute (standard litre per minute)
SMPS	Spectromètre de mobilité électrique (scanning mobility particle sizer)
SOLEIL	Source Optimisée de Lumière d'Energie Intermédiaire du LURE
TF	Transformée de Fourier
TNT	Trinitritoluène
UCEIV	Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant
ULCO	Université du Littoral Côte d'Opale
WRMS	Déviatiion standard adimensionnée (Weighted Root Mean Square)
XIAM	eXtended Internal Axis Method

Table des matières

Introduction générale	13
1 Les outils théoriques pour l'analyse de spectres rotationnels/rovibrationnels	17
1.1 Introduction générale	18
1.2 Description théorique des niveaux d'énergie rotationnels	19
1.2.1 Approximation du rotateur rigide	19
1.3 Hamiltonien effectif de rotation d'une toupie asymétrique	20
1.3.1 Représentation des niveaux d'énergie	22
1.3.2 Règles de sélection	22
1.4 Couplage nucléaire quadrupolaire	25
1.5 Hamiltonien de rotation-vibration (rovibration)	28
1.5.1 Approximation de l'oscillateur harmonique	29
1.5.2 Corrections anharmoniques	30
1.5.3 Règles de sélection	30
1.5.4 Structure rotationnelle des spectres de vibration	31
1.6 Couplage avec la rotation interne	32
1.6.1 Energie potentielle de rotation interne	33
1.6.2 Hamiltonien de rotation interne	33
1.6.3 Règles de sélection	39
1.7 Intensité de raies	40
1.7.1 Spectres d'absorption et d'émission	40
1.7.2 Loi de Beer-Lambert	41
1.7.3 Profil de raie	42
1.7.4 Intensité des raies d'absorption	44
1.7.5 Calcul des fonctions de partition	45
1.7.6 Bases de données	46
1.8 Outils informatiques pour l'analyse de spectre	47
1.8.1 Calculs de chimie quantique	47

1.8.2	Visualisation et attribution des spectres	50
1.8.3	Ajustement du modèle théorique par la méthode des moindres carrés	56
1.8.4	Ajustement semi-automatique du modèle théorique avec les algorithmes évolutionnaires	63
2	Outils expérimentaux et méthodologie	71
2.1	Introduction générale	72
2.2	Spectroscopie à impulsions micro-ondes (SIMO) par transformée de Fourier	73
2.2.1	Processus d'émission moléculaire du SIMO	73
2.2.2	Amplification du signal	75
2.3	Spectroscopie millimétrique/submillimétrique	77
2.3.1	Spectromètre d'absorption millimétrique/submillimétrique à chaîne de multiplication de fréquence du LPCA	77
2.3.2	Comparaison AM/FM	85
2.3.3	Comparaison des configurations en simple et double passage	87
2.3.4	Précision expérimentale et rapport signal-sur-bruit (S/B)	88
2.3.5	Traitement des effets FP par filtre à transformée de Fourier	89
2.4	Spectromètre d'émission millimétrique à dérive de fréquence du LPCA	91
2.5	Spectroscopie dans l'infrarouge moyen et lointain (IRM/IRL)	92
2.5.1	Dispositif expérimental	93
2.5.2	Gain en rapport S/B pour une source synchrotron	95
2.5.3	Calibration des spectres	95
2.5.4	Jet-AILES	96
3	Analyses rovibrationnelles du chlorure de thionyle (SOCl₂) à l'aide des algorithmes évolutionnaires (AEs)	97
3.1	Introduction générale	99
3.2	Présentation de la molécule	100
3.2.1	Propriétés spectroscopiques de SOCl ₂	100
3.2.2	État de l'art	102
3.3	Spectre expérimental	103
3.4	Analyse des bandes rovibrationnelles ν_2 et ν_5 de SOCl ₂	104
3.4.1	Application des AEs à un spectre synthétique	104
3.4.2	Préparation des spectres expérimentaux pour les AEs	106
3.4.3	Centre de bande et constantes rotationnelles de [32, 16, 35, 35] déterminés par les AEs	108
3.4.4	Analyse subséquente de [32, 16, 35, 35] par diagrammes de Loomis-Wood111	

3.4.5	Centre de bande et constantes rotationnelles de [32, 16, 35, 37]	113
3.4.6	Analyse subséquente de [32, 16, 35, 37] par diagrammes de Loomis-Wood	115
3.4.7	Comparaison des spectres calculés/experimentaux dans l'IRL	116
3.4.8	Précision relative des paramètres	119
3.4.9	Pouvoir prédictif de la méthode de calcul CCSD(T)	119
3.5	Analyse complémentaire du spectre submillimétrique	122
3.6	Ajustement global de SOCl ₂	125
3.7	Conclusions	128
4	Spectroscopie rotationnelle des nitrotoluènes : vers la détection haute-résolution de marqueurs/vapeurs d'explosifs.	131
4.1	Introduction générale	132
4.2	Méthodes expérimentales et méthodes de calculs	135
4.2.1	Propriétés spectroscopiques des mono-nitrotoluènes	135
4.2.2	Méthodes expérimentales	137
4.2.3	Calculs de chimie quantique	145
4.3	Résultats et discussions spécifiques au 3-NT	151
4.3.1	Analyse du spectre micro-onde refroidi par jet moléculaire	151
4.3.2	Analyse du spectre millimétrique à température ambiante	152
4.3.3	Constantes de couplage nucléaire quadrupolaire	158
4.3.4	Potentiel de rotation interne	160
4.3.5	Limites du modèle théorique	162
4.4	Influence de l'isomérie : étude préliminaire des 2-NT et 4-NT	167
4.4.1	Analyse préliminaire des spectre millimétriques à température ambiante	168
4.4.2	Influence de l'isomérie sur le potentiel de rotation interne	171
4.5	Limite de détection	173
4.6	Conclusions	174
5	Spectroscopie millimétrique de précurseurs d'AOS : les méthoxyphénols	177
5.1	Introduction générale	177
5.2	Mesures expérimentales du 3-MP dans la région millimétrique	180
5.3	Calculs de chimie quantique	182
5.4	Analyse du spectre millimétrique du 3-MP	185
5.5	Conclusions	191
	Conclusions générales	193

Bibliographie	195
Table des figures	209
Liste des tableaux	219
Annexes	225
A Spectroscopie rovibrationnelle des méthoxyphénols à basse température avec le dispositif Jet-AILES : résultats préliminaires	227
B Spectroscopie rotationnelle du guaiacol (2-MP) et du méquinol (4-MP) : résultats préliminaires	233
C Productions scientifiques	239

Introduction

La spectroscopie moléculaire à haute résolution présente des qualités majeures pour répondre aux problématiques de détection de molécules en phase gazeuse en utilisant des méthodes non-invasives, réversibles, hautement sélectives et sensibles. En particulier, elle consiste à sonder des transitions moléculaires rotationnelles ou rovibrationnelles en utilisant des sources électroniques et optiques couvrant des longueurs d'onde de la gamme micro-onde à l'infrarouge moyen et dispose d'une capacité unique à fournir une grande quantité d'informations avec un haut degré de précision. Elle permet notamment de fournir des listes de raies observées en laboratoire permettant d'alimenter les bases de données pour guider les observations atmosphériques et astrophysiques. En plus de permettre l'identification d'une molécule avec une très grande sélectivité, la compréhension des spectres au niveau quantique permet de déduire des propriétés physico-chimiques et structurales.

Bien que cette discipline expérimentale trouve ses fondements dans les ouvrages de spectroscopie atomique et moléculaire de Gerhard Herzberg écrits entre 1936 et 1966 [1, 2, 3, 4], d'importants développements instrumentaux ont permis de stimuler ce domaine scientifique depuis la fin du XX^{ème} siècle. Les avancées informatiques ont également contribué à améliorer considérablement les calculs de chimie quantique nécessaires à l'analyse des spectres et ont permis de développer des outils informatiques permettant d'ajuster les modèles théoriques à partir des spectres expérimentaux. Plus récemment, les avancées technologiques ont permis d'améliorer la sensibilité et la résolution dans les instrumentations ce qui a ouvert le champs à l'étude de nouvelles molécules, plus lourdes et plus complexes, dont les spectres sont très denses à température ambiante et dont l'analyse demande des outils de plus en plus performants.

Bien que de nombreuses interface graphiques ont été mises au point ces vingt dernières années pour faciliter l'analyse des spectres expérimentaux à partir d'un modèle théorique par la méthode des moindres carrés, elles ne permettent pas de s'affranchir de calculs de chimie quantique de haut niveau pour approcher au mieux le modèle théorique et nécessitent généralement plusieurs mois de travail. Afin de réduire le temps nécessaire à l'analyse d'un spectre, de nouvelles approches fondées sur l'utilisation d'algorithmes évolutionnaires (AEs)

ont été récemment adaptées à la spectroscopie haute-résolution par W. L. Meerts de l'Université Radboud à Nimègue (Pays-Bas) et M. Schmitt de l'Université de Dusseldorf (Allemagne) [5, 6, 7, 8]. Ces méthodes ne nécessitent plus d'attribuer les spectres raie-par-raie et correspondent à une optimisation directe et globale du modèle théorique en utilisant des processus aléatoires. Des études récentes ont montré qu'ils permettent une analyse semi-automatique des spectres rovibrationnels et rovibroniques denses. En effet, les AEs ont été utilisés par plusieurs groupes de recherche pour simplifier l'analyse de spectres électroniques résolus rotationnellement d'une grande variété de composés moléculaires tels que des biomolécules flexibles[9] ou des radicaux atmosphériques[10]. Il a également été récemment appliqué avec succès pour l'analyse d'un spectre rovibrationnel de sulfure de triméthylène enregistré avec le spectromètre FTIR couplé à la ligne de lumière FIR du synchrotron canadien [11] et dans le cadre de ma thèse pour l'analyse de spectres rovibrationnels du chlorure de thionyle enregistré avec le spectromètre FTIR couplé à la ligne de lumière AILES du synchrotron SOLEIL [12].

Différentes molécules ont été ciblées dans le cadre de ma thèse. Tout d'abord, le chlorure de thionyle a été ciblé pour son intérêt industriel et environnemental [12]. Largement utilisé dans les batteries au Lithium et comme oxydant pour la conversion des alcools et acides carboxyliques en leurs chlorures correspondants [13], sa durée de vie troposphérique est de quelques minutes en raison de son hydrolyse générant SO_2 et HCl . Cette molécule a également un intérêt potentiellement défense en raison de son utilisation dans la production de gaz sarin. Puis, les composés nitro-aromatiques du type nitrotoluène ont été ciblés pour leur intérêt défense comme traceurs du TNT [14]. En effet, la présence militaire dans les terrains en guerre requiert d'une part des méthodes préventives de détection de marqueurs d'explosifs suffisamment sensibles pour remplacer la détection canine sujet à la fatigue, d'autre part ces méthodes doivent être suffisamment sélectives pour détecter les traceurs d'explosifs sans équivoque. En effet, de grandes opportunités se présentent en spectroscopie millimétrique/submillimétrique pour détecter les marqueurs d'explosifs grâce au développement rapide des technologies utilisées en spectroscopie de laboratoire [15]. Bien que la spectroscopie rovibrationnelle haute résolution se révèle être un outil puissant pour la détection, l'identification et la quantification d'espèces moléculaires gazeuses d'intérêt atmosphérique et astrophysique, les méthodes optiques utilisées présentent un manque de sensibilité et/ou de sélectivité pour la détection de vapeurs explosives faiblement volatiles à température ambiante. Afin de contourner ce problème, divers marqueurs plus volatils sont présents dans de nombreux explosifs fabriqués industriellement et peuvent être ainsi ciblés pour leur détection [16]. Il s'agit ici d'étudier pour la première fois la structure rotationnelle de traceurs d'explosifs de type nitrotoluène ($P_{\text{vap.}} \simeq 100 - 300\text{mPa}$ à 300K) dans le but d'étudier l'applicabilité de cette méthode à la

détection du TNT ($P_{\text{vap.}} = 1.2\text{mPa}$ à 300K) in situ.

Enfin, les méthoxyphénols ont été ciblés en spectroscopie millimétrique pour leur intérêt environnemental[17]. Traceurs de feux de biomasse, des études récentes en chambre de simulation ont permis de mettre en évidence la formation d'aérosols organiques secondaires en présence des principaux oxydants de l'atmosphère dont l'impact sur le climat est avéré [18, 19]. La détection de ce type de molécules précurseurs biogéniques d'AOS permet une meilleure compréhension de la chimie atmosphérique. Plus généralement, l'étude des mécanismes physico-chimiques de l'atmosphère nécessite des analyses statistiques de données d'observation atmosphérique afin de développer des modèles régionaux et des projections climatiques. L'étude en laboratoire des spectres de rotation des méthoxyphénol s'inscrit dans les programmes CLIMBIO et CaPPA (1er Package : "From gas phase to aerosols : biogenic VOCs as precursor for particles") et permettra la modélisation des spectres pour leur détection future dans l'atmosphère.

Tout d'abord, le premier chapitre porte sur les outils théoriques et informatiques permettant de générer et de traiter au niveau quantique les spectres de rotation et de rovibration des espèces ciblées. L'ensemble de l'instrumentation utilisée pour mesurer les spectres dans les domaines micro-onde, (sub)millimétrique et infrarouge lointain/moyen est présenté dans le deuxième chapitre. Les chapitres suivants portent sur les résultats obtenus à partir de la mesure et de l'analyse des spectres : le chapitre 3 concerne l'analyse semi-automatique des spectres rovibrationnels du chlorure de thionyle à l'aide des algorithmes évolutionnaires (AEs), le chapitre 4 porte sur la détection dans le domaine millimétrique des isomères du mononitrotoluènes et le chapitre 5 porte sur l'étude des méthoxyphénols d'intérêt atmosphérique dans le domaine millimétrique.

Chapitre 1

Les outils théoriques pour l'analyse de spectres rotationnels/rovibrationnels

Sommaire

1.1	Introduction générale	18
1.2	Description théorique des niveaux d'énergie rotationnels	19
1.2.1	Approximation du rotateur rigide	19
1.3	Hamiltonien effectif de rotation d'une toupie asymétrique	20
1.3.1	Représentation des niveaux d'énergie	22
1.3.2	Règles de sélection	22
1.4	Couplage nucléaire quadrupolaire	25
1.5	Hamiltonien de rotation-vibration (rovibration)	28
1.5.1	Approximation de l'oscillateur harmonique	29
1.5.2	Corrections anharmoniques	30
1.5.3	Règles de sélection	30
1.5.4	Structure rotationnelle des spectres de vibration	31
1.6	Couplage avec la rotation interne	32
1.6.1	Energie potentielle de rotation interne	33
1.6.2	Hamiltonien de rotation interne	33
1.6.3	Règles de sélection	39
1.7	Intensité de raies	40
1.7.1	Spectres d'absorption et d'émission	40
1.7.2	Loi de Beer-Lambert	41
1.7.3	Profil de raie	42
1.7.4	Intensité des raies d'absorption	44

1.7.5	Calcul des fonctions de partition	45
1.7.6	Bases de données	46
1.8	Outils informatiques pour l'analyse de spectre	47
1.8.1	Calculs de chimie quantique	47
1.8.2	Visualisation et attribution des spectres	50
1.8.3	Ajustement du modèle théorique par la méthode des moindres carrés	56
1.8.4	Ajustement semi-automatique du modèle théorique avec les algo- rithmes évolutionnaires	63

1.1 Introduction générale

La spectroscopie à haute résolution spectrale permet d'étudier les transitions entre différents niveaux d'énergie rotationnels, rovibrationnels (rotation-vibration) ou rovibroniques (rotation-vibration-électronique) d'une molécule avec un haut degré de précision. Cette section a pour objectif d'introduire les concepts théoriques fondamentaux et les définitions nécessaires à la compréhension des spectres rotationnels et rovibrationnels, en particulier pour les toupies asymétrique en tenant compte des effets quadrupolaires hyperfins et du couplage avec la rotation interne. L'analyse spectrale consiste dans un premier temps à attribuer les raies observées à des transitions entre niveaux d'énergie théoriques calculés à partir du Hamiltonien de la molécule, et dans un second temps à ajuster les paramètres moléculaires de l'Hamiltonien modèle dont les valeurs propres correspondent au niveaux d'énergie quantifiés de la molécules grâce à un processus itératif jusqu'à reproduire les spectres à leur précision expérimentale. La modélisation d'un spectre rotationnel nécessite une description théorique correcte des niveaux d'énergie, de connaître les transitions possibles grâce aux règles de sélections et de calculer l'intensité des raies. Le calcul des niveaux d'énergie et l'ajustement des constantes se fait grâce aux outils informatiques décrits dans ce chapitre. Le résultat de l'analyse spectrale permet de générer des listes de raies pour la détection future de ces molécules mais aussi d'étudier les propriétés physico-chimiques comme leur structure ou leur dynamique interne.

La mécanique quantique fournit la théorie sous-jacente pour la spectroscopie moléculaire et a été traitée très largement dans les livres de référence écrit par Townes et Schawlow (1955)[20], Messiah (1961)[21], Cohen-Tannoudji et al. (1973)[22], Kroto (1975)[23], Sakurai (1985)[24], Landau and Lifshitz (1985)[25], Gordy et Cook (1984)[26], Merkt et Quack (1991)[27], et Brown et Carrington (2003)[28].

1.2 Description théorique des niveaux d'énergie rotationnels

L'énergie totale d'une molécule correspond à la somme de l'énergie de translation, de rotation, de vibration et électronique :

$$E_{tot} = E_{trans} + E_{elect} + E_{vib} + E_{rot} \quad (1.1)$$

Les différences d'énergie électronique, de vibration et de rotation diffèrent de plusieurs ordres de grandeur, $\Delta E_{elect} \gg \Delta E_{vib} \gg \Delta E_{rot}$ où ΔE_{rot} varie de 10^{-5} à 0.01 eV. L'énergie de translation E_{trans} n'est pas quantifiée et ne permet donc pas d'observer de transition. L'application de l'Hamiltonien de rotation \hat{H}_{rot} dans l'équation de Schrödinger conduit à l'énergie de rotation :

$$\hat{H}_{rot}\Psi = E_{rot}\Psi, \quad (1.2)$$

où Ψ est la fonction d'onde totale pouvant s'écrire dans l'approximation de Born-Oppenheimer comme :

$$\Psi = \Psi_{elect} \times \Psi_{vib} \times \Psi_{rot} \quad (1.3)$$

On s'intéresse tout d'abord à l'écriture de l'Hamiltonien \hat{H}_{rot} dans le cas de transitions de rotation pure entre niveaux d'énergie de rotation d'un même état vibrationnel dans les approximations du rotateur rigide et semi-rigide.

1.2.1 Approximation du rotateur rigide

L'Hamiltonien de rotation peut s'écrire à partir de l'énergie cinétique classique d'un corps rigide en rotation composé de N atomes de masse m et de coordonnée (x,y,z) par rapport au centre de masse de la molécule :

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\vec{\omega} \vec{r}_i)^2 = \frac{1}{2} \vec{\omega} \bar{\bar{I}} \vec{\omega} = \frac{1}{2} \frac{\hat{\mathbf{J}}^2}{\bar{\bar{I}}} \quad (1.4)$$

avec $\vec{J} = \bar{\bar{I}} \vec{\omega}$ le moment angulaire, $\vec{v}_i = \vec{\omega} \vec{r}_i$ la vitesse linéaire, \vec{r}_i le vecteur position, $\vec{\omega}$ la vitesse angulaire et $\bar{\bar{I}}$ le tenseur d'inertie donné par :

$$\bar{\bar{I}} = \begin{pmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^N m_i (y_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i x_i y_i & -\sum_{i=1}^N m_i x_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i x_i y_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + z_i^2) & -\sum_{i=1}^N m_i y_i z_i \\ -\sum_{i=1}^N m_i x_i z_i & -\sum_{i=1}^N m_i y_i z_i & \sum_{i=1}^N m_i (x_i^2 + y_i^2) \end{pmatrix}. \quad (1.5)$$

Le système d'axes principaux d'inertie de la molécule (Principal Axis Method - PAM) s'obtient par diagonalisation du tenseur 1.5 :

$$\bar{\bar{I}} = \begin{pmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{pmatrix}. \quad (1.6)$$

L'Hamiltonien rotationnel peut alors s'écrire tel que [26, 23] :

$$\hat{H}_{rot}^0 = \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{J}_x^2}{I_x} + \frac{\hat{J}_y^2}{I_y} + \frac{\hat{J}_z^2}{I_z} \right) = A\hat{J}_a^2 + B\hat{J}_b^2 + C\hat{J}_c^2 \quad (1.7)$$

où I_x , I_y et I_z sont les moments d'inertie principaux et \hat{J}_x , \hat{J}_y et \hat{J}_z les composantes de $\hat{\mathbf{J}}$ telles que $\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2$. Les constantes rotationnelles A , B et C sont définies dans le système d'axes principaux telles que $A \geq B \geq C$ où les coordonnées x, y, z sont identifiées aux axes a, b, c selon la représentation (voir table 1.1) de telle sorte que $I_a \leq I_b \leq I_c$ [29]. Le paramètre de Ray κ (voir équation 1.8) permet de déterminer la symétrie d'une molécule

TABLE 1.1 – Différentes représentations pour associant les axes a, b et c aux axes x, y et z. Les indices r et l correspondent au trièdre dextrogyre ou lévogyre, respectivement.

	Γ^r	Π^r	III^r	Γ^l	Π^l	III^l
x	b	c	a	c	a	b
y	c	a	b	b	c	a
z	a	b	c	a	b	c

à partir des constantes rotationnelles : $\kappa \simeq -1$ correspond à une toupie symétrique prolate (allongée, $A > B = C$), $\kappa = 0$ une toupie totalement asymétrique (aplatie, $A > B > C$) et $\kappa = +1$ à une toupie symétrique oblate ($A = B > C$).

$$\kappa = \frac{2B - A - C}{A - C} \quad (1.8)$$

On utilisera la représentation Γ^r pour traiter une toupie asymétrique proche prolate ($B \simeq C$) et la représentation III^r pour traiter une toupie asymétrique proche oblate ($A \simeq B$).

1.3 Hamiltonien effectif de rotation d'une toupie asymétrique

Bien que la description du rotateur rigide permet dans la plupart des cas une première interprétation des spectres rotationnels, un traitement théorique perturbatif est nécessaire

pour tenir compte de la déformation des distances internucléaires par la force centrifuge [26, 23, 20]. L'Hamiltonien du rotateur semi-rigide peut-être écrit en une série de puissances du moment angulaire \mathbf{J} sous la forme générale :

$$\hat{H}_{rot} = \hat{H}_{rot}^0 + \hat{H}_{dist} = H_2 + H_4 + H_6 + \dots \quad (1.9)$$

où $\hat{H}_{rot} = H_2$ pour le rotateur rigide d'ordre deux en $\hat{\mathbf{J}}$ et $\hat{H}_{dist} = H_4 + H_6 + \dots$ pour la distorsion centrifuge d'ordre quartique, sextique et plus en $\hat{\mathbf{J}}$. L'Hamiltonien effectif permettant de traiter une toupie asymétrique semi-rigide existe sous deux réductions (A ou S) proposées par Watson [30] qui permettent de ne garder que les termes indépendants du traitement perturbatif. Par exemple, les corrections d'ordre 4 en $\hat{\mathbf{J}}$ du traitement perturbatif correspondent à six constantes moléculaires basées sur les combinaisons en $\hat{\mathbf{J}}$ mais seulement cinq sont indépendantes et peuvent être ajustées [27].

L'Hamiltonien rotationnel complet d'une toupie asymétrique semi-rigide à l'ordre sextique en $\hat{\mathbf{J}}$, dans le système d'axes principaux, en représentation Γ^r et dans l'état vibrationnel v , est donné en réduction S et en réduction A par les équations 1.11 et 1.10, respectivement ([27]).

$$\begin{aligned} \hat{H}_{rot}^{vv(A)} = & A^{(A)} \hat{J}_a^2 + B^{(A)} \hat{J}_b^2 + C^{(A)} \hat{J}_c^2 - \Delta_J \hat{\mathbf{J}}^4 - \Delta_{JK} \hat{\mathbf{J}}^2 \hat{J}_a^2 - \Delta_K \hat{J}_a^4 + \\ & \frac{1}{2} \left[\delta_J \hat{\mathbf{J}}^2 + \delta_K \hat{J}_a^2, (\hat{J}_+^2 + \hat{J}_-^2) \right]_+ + \Phi_J \hat{\mathbf{J}}^6 + \Phi_{JK} \hat{\mathbf{J}}^4 \hat{J}_a^2 + \Phi_{KJ} \hat{\mathbf{J}}^2 \hat{J}_z^4 + \Phi_K \hat{J}_a^6 \\ & + \frac{1}{2} \left[\phi_J \hat{\mathbf{J}}^4 + \phi_{JK} \hat{\mathbf{J}}^2 \hat{J}_a^2 + \phi_K \hat{J}_a^4, (\hat{J}_+^2 + \hat{J}_-^2) \right]_+, \quad (1.10) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{H}_{rot}^{vv(S)} = & A^{(S)} \hat{J}_a^2 + B^{(S)} \hat{J}_b^2 + C^{(S)} \hat{J}_c^2 - D_J \hat{\mathbf{J}}^4 - D_{JK} \hat{\mathbf{J}}^2 \hat{J}_a^2 - D_K \hat{J}_a^4 + d_1 \hat{\mathbf{J}}^2 (\hat{J}_+^2 + \hat{J}_-^2) \\ & + d_2 \hat{\mathbf{J}}^2 (\hat{J}_+^4 + \hat{J}_-^4) + H_J \hat{\mathbf{J}}^6 + H_{JK} \hat{\mathbf{J}}^4 \hat{J}_a^2 + H_{KJ} \hat{\mathbf{J}}^2 \hat{J}_a^4 + H_K \hat{J}_a^6 \\ & + h_1 \hat{\mathbf{J}}^4 (\hat{J}_+^2 + \hat{J}_-^2) + h_2 \hat{\mathbf{J}}^2 (\hat{J}_+^4 + \hat{J}_-^4) + h_3 (\hat{J}_+^6 + \hat{J}_-^6), \quad (1.11) \end{aligned}$$

Watson [31] donne une table pour convertir les paramètres de la réduction A à la réduction S. Le choix de la réduction dépend de la symétrie du rotateur, une toupie asymétrique est généralement bien traitée avec une réduction A mais dans le cas d'une toupie proche symétrique, la réduction S permet un meilleur ajustement des constantes dans l'analyse de spectres. En effet, la constante δ_K de la réduction A est proportionnelle à $1/(A - B)$ (en représentation III^r) ou $1/(B - C)$ (en représentation Γ^r) et s'ajuste donc très difficilement si $A \simeq B$ (toupie symétrique oblate) ou $B \simeq C$ (toupie symétrique prolata), respectivement, ce

qui ne permet pas d'ajuster correctement le jeu de constantes. Ce choix est discuté en détails en référence [29].

1.3.1 Représentation des niveaux d'énergie

Les niveaux d'énergie rotationnels d'une molécule sont calculés en diagonalisant la matrice $\langle J', K'_a | H_{rot} | J'', K'' \rangle$ en utilisant les valeurs propres de \hat{J} , \hat{J}_z et $\hat{J}_\pm = J_x \pm iJ_y$ obtenues à partir des règles de commutation des opérateurs de moment angulaire :

$$\langle J, K | \hat{\mathbf{J}}^2 | J, K \rangle = J(J+1) \quad \langle J, K | \hat{J}_z^2 | J, K \rangle = K^2 \quad (1.12)$$

$$\langle J, K \mp 2 | \hat{J}_\pm^2 | J, K \rangle = \sqrt{[J(J+1) - (K \mp 1)(K \mp 2)][J(J+1) - K(K \mp 1)]} \quad (1.13)$$

avec $K = K_a$ pour une toupie proche prolata et $K = K_c$ pour une toupie proche oblate. Les niveaux d'énergie rotationnels d'une toupie asymétrique sont labellisés $J_{K_a K_c}$ avec le nombre quantique J et ses pseudo-nombres quantiques de projection K_a et K_c qui correspondent aux valeurs propres de \hat{J}_z sur les axes d'inertie a et c , respectivement, et représentent les limites prolata et oblate de la toupie symétrique. La représentation des niveaux d'énergie d'une toupie asymétrique en fonction de κ (équation 1.8) est donnée en exemple jusque $J = 3$ en figure 1.1.

1.3.2 Règles de sélection

Les règles de sélection sont les conditions menant à des moments de transition non nuls et permettent de savoir quels sont les niveaux d'énergie moléculaires pouvant entrer en résonance avec l'émission ou l'absorption d'un photon. Deux systèmes de coordonnées doivent être considérés : le système de coordonnées de laboratoire (espace fixe) représenté par (X, Y, Z) , et le système de coordonnées de la molécule qui est représenté par (x, y, z) et qui est en rotation par rapport à (X, Y, Z) . Le moment de transition dans le cas d'une radiation polarisée selon Z s'écrit comme :

$$\langle \Psi_{elect,f} \Psi_{vib,f} \Psi_{rot,f} | \mu_Z | \Psi_{rot,i} \Psi_{vib,i} \Psi_{elect,i} \rangle \neq 0, \quad (1.14)$$

avec μ_Z le moment dipolaire selon l'axe Z de l'espace fixe. En utilisant les cosinus directeur $\lambda_{Z\alpha}$ ($\alpha = x, y, z$), μ_Z peut être écrit en fonction coordonnées moléculaires (x, y, z) [26] :

$$\mu_Z = \sum_{\alpha} \lambda_{Z\alpha} \mu_{\alpha}, \quad (1.15)$$




FIGURE 1.1 – Représentation des niveaux d'énergie $J_{K_a K_c}$ d'une toupie asymétrique jusque $J = 3$ en fonction de κ [27].

ce qui permet de factoriser le moment de transition tel que :

$$\langle \Psi_{rot,f} | \sum_{\alpha} \lambda_{Z\alpha} | \Psi_{rot,i} \rangle \langle \Psi_{elect,f} \Psi_{vib,f} | \mu_{\alpha} | \Psi_{vib,i} \Psi_{elect,i} \rangle \neq 0, \quad (1.16)$$

La seconde intégrale $\langle \Psi_{elect,f} \Psi_{vib,f} | \mu_{\alpha} | \Psi_{vib,i} \Psi_{elect,i} \rangle$ est la condition pour laquelle un moment dipolaire non nul est nécessaire pour observer le spectre rotationnel. Pour observer des transitions de rotation pure dans l'état fondamental ou les états excités, la molécule doit donc posséder un moment dipolaire permanent (ou induit par la rotation [32]) non nul.

Les éléments de matrice de la première intégrale $\langle \Psi_{rot,f} | \sum_{\alpha} \lambda_{Z\alpha} | \Psi_{rot,i} \rangle$ permettent d'obtenir les règles de sélection sur J :

$$\Delta J = 0, \pm 1, \quad (1.17)$$

Les transitions $\Delta J = -1, 0, +1$ sont appelées branches P, Q et R, respectivement. Les règles de sélection sur K_a et K_c s'obtiennent à partir de la théorie des groupes en écrivant explicitement les fonctions d'onde de rotation et en analysant leur comportement par rapport

aux opérations de symétrie du groupe D_{2h} . L'ensemble des règles de sélection d'une toupie asymétrique est donné en table 1.2 [27], une représentation des transitions correspondantes est également donnée en figure 1.2.

TABLE 1.2 – Règles de sélection de la toupie asymétrique

Type de bande	valeur de K_a	ΔJ	ΔK_a	ΔK_c
type a ($\mu_a \neq 0$)	$K_a = 0$	$\Delta J = \pm 1$	pair	impair
	$K_a \neq 0$	$\Delta J = 0, \pm 1$	pair	impair
type b ($\mu_b \neq 0$)		$\Delta J = 0, \pm 1$	impair	impair
type c ($\mu_c \neq 0$)	$K_c = 0$	$\Delta J = \pm 1$	impair	pair
	$K_c \neq 0$	$\Delta J = 0, \pm 1$	impair	pair




FIGURE 1.2 – Représentation des niveaux d'énergie $J_{K_a K_c}$ d'une toupie asymétrique avec un exemple pour chaque type de transition (type a, type b, type c) et pour $\Delta J = +1$ et $\Delta J = 0$.

Enfin, il convient de rassembler les transitions entre niveaux d'énergie $J_{K_a K_c}$ en séries ou en branches caractérisées par des variations spécifiques de J , K_a et K_c . Pour une analyse en rotation pure, les branches sont notées $^g \Delta J_{\Delta K_a \Delta K_c}$, avec $g = a, b, c$ l'axe de projection du moment dipolaire intervenant dans la transition et $\Delta J = P, Q, R$ la variation de $\Delta J = -1, 0, +1$, un spectre de rotation pure étant caractérisé par l'observation de branches Q et R uniquement. La figure 1.3 illustre neuf spectres synthétiques d'une toupie asymétrique proche prolate obtenus à partir des règles de sélections pour des transitions de type a, b ou c, et de trois ensemble de constantes rotationnelles différent ($\mu_g = 5D$ ($g = a, b, c$), $T = 293K$, $J_{max} = 200$). Plus la molécule est lourde, plus les constantes rotationnelles sont faibles et plus le spectre est non seulement dense mais aussi faible en intensité en raison d'une fonction de partition rotationnelle plus importante (voir équations 1.80 et 1.76). On note que plus les constantes rotationnelles sont faibles, plus le maximum d'intensité est bas en fréquence et correspond à des valeurs de J plus grandes. .




FIGURE 1.3 – Spectres synthétiques d’une toupie asymétrique proche prolate obtenus à partir de trois ensembles de constantes rotationnelles pour des transitions de type a, b ou c. Tous les spectres sont calculés avec $\mu_g = 5D$ ($g = a, b, c$), à $T = 293K$ et pour $J_{max} = 200$.

1.4 Couplage nucléaire quadrupolaire

Bien que l’Hamiltonien de rotateur semi-rigide (1.11 et 1.10) suffit généralement à la description des niveaux d’énergie rotationnelle d’une toupie asymétrique, des termes d’interaction doivent être ajoutés afin de reproduire certains effets visibles dans les spectres. Les interactions entre le champ électrique et/ou magnétique de la molécule et les moments nucléaires a pour effet de diviser les raies en plusieurs composantes qu’on appelle structure hyperfine[33]. L’interaction la plus forte est celle entre le gradient de champ électrique moléculaire et le moment électrique quadrupolaire de certains noyaux, résultant de la distribution non sphérique des charges nucléaires.

Hamiltonien de couplage nucléaire quadrupolaire

Ce couplage se produit pour des noyaux avec un spin nucléaire $I \geq 1$ car un spin nucléaire $I(N) < 1$ ne génère pas de quadrupole [27]. L'Hamiltonien de couplage nucléaire quadrupolaire \hat{H}_Q s'ajoute à l'Hamiltonien d'une toupie asymétrique semi-rigide :

$$\hat{H}_{rot} = \hat{H}_{rot}^0 + \hat{H}'_{dist} + \hat{H}_Q. \quad (1.18)$$

Dans le cas d'un seul noyau interagissant avec la rotation, l'Hamiltonien introduit par Casimir [34] est donné par :

$$\hat{H}_Q = \frac{1}{2} \frac{eQq_{i,j}}{I(2I-1)J(2J-1)} \left[3(\hat{\mathbf{I}} \cdot \hat{\mathbf{J}})^2 + \frac{3}{2}(\hat{\mathbf{I}} \cdot \hat{\mathbf{J}}) - \hat{\mathbf{I}}^2 \cdot \hat{\mathbf{J}}^2 \right], \quad (1.19)$$

avec e la charge électrique du proton, Q le moment quadrupolaire du noyau et $q_{i,j}$ le gradient du tenseur de champ électrique. Les éléments du tenseur de couplage nucléaire quadrupolaire sont donnés par :

$$\bar{\chi}_{\alpha\beta} = eQq_{J\alpha\beta} \quad (1.20)$$

où α, β réfèrent aux axes d'inertie a, b et c. Les valeurs propres de l'Hamiltonien 1.19 sont obtenues grâce au schéma de couplage $\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{I}} + \hat{\mathbf{J}}$ définissant le moment angulaire total $|J - I| \leq F \leq J + I$ et menant à l'expression suivante [26] :

$$\hat{E}_Q = \frac{eQq_J}{2J(2J-1)I(2I-1)} \left[\frac{3}{4}C(C+1) - J(J+1)I(I+1) \right] \quad (1.21)$$

où

$$C = F(F+1) - J(J+1) - I(I+1). \quad (1.22)$$

L'équation 1.21 peut être réécrite sous la forme standard afin de faire apparaître les constantes nucléaires quadrupolaires du tenseur symétrique $\bar{\chi}$ dans le système d'axes principaux [20] :

$$\begin{aligned} \hat{E}_Q = \frac{2f(I, J, F)}{J(J+1)} & [\chi_{aa}\langle J_a^2 \rangle + \chi_{bb}\langle J_b^2 \rangle + \chi_{cc}\langle J_c^2 \rangle + \chi_{ab}\langle J_a J_b + J_b J_a \rangle \\ & + \chi_{bc}\langle J_c J_b + J_b J_c \rangle + \chi_{ac}\langle J_c J_a + J_a J_c \rangle] \end{aligned} \quad (1.23)$$

avec $f(I, J, F)$ la fonction de Casimir :

$$f(I, J, F) = \frac{\frac{3}{4}C(C+1) - I(I+1)J(J+1)}{2I(2I-1)(2J-1)(2J+3)}. \quad (1.24)$$

Compte tenu de la dépendance en $1/J(J+1)$ de l'équation 1.23, les niveaux d'énergie hyperfins tendent vers la dégénérescence à mesure que J augmente ($E_Q \rightarrow 0$) et la structure hyperfine est observée en général pour de basses valeurs de J dans les spectres micro-onde refroidis par détente adiabatique mais pas dans le domaine submillimétrique.

Par ailleurs, les constantes de couplage nucléaire quadrupolaires $\chi_{i,j}$ ($i, j = a, b, c$) peuvent être reliées à la géométrie moléculaire et à la structure électronique autour du noyau quadrupolaire. La diagonalisation du tenseur $\bar{\chi}$ défini dans le système d'axes principaux permet d'obtenir des constantes de couplage nucléaire dans le système d'axe $i, j = x, y, z$ directement relié au gradient de champ électrique autour du noyau q_{ij} [35]. L'asymétrie du gradient de champ électrique autour du noyau généralement supposé cylindrique autour de l'axe z peut alors être évalué à partir du paramètre η :

$$\eta = \frac{\chi_{xx} - \chi_{yy}}{\chi_{zz}}. \quad (1.25)$$

Dans le cas de molécules planes (plan ab) où χ_{ab} est le seul élément hors diagonal non nul, la diagonalisation du tenseur permet de connaître l'angle $\alpha_{a,z}$ entre l'axe de symétrie z du noyau et l'axe d'inertie a de la molécule :

$$\alpha_{a,z} = -\frac{1}{2} \arctan \left(-\frac{2\chi_{ab}}{\chi_{aa} - \chi_{bb}} \right). \quad (1.26)$$

On notera que le signe de χ_{ab} dépend du choix relatif pour le sens positif des axes a et b [36].

Règles de sélection

Les règles de sélection du nombre quantique F sont $\Delta F = 0, \pm 1$. Une représentation des niveaux d'énergie hyperfins et des transitions possibles est donnée en figure 1.4. Selon la règle de sélection, l'intensité de la transition hyperfine est une fraction de l'intensité totale de la raie rotationnelle [20]. La table 1.3 donne la dépendance en intensité de chaque type de transition, les raies $\Delta J = \Delta F$ sont les plus intenses.




FIGURE 1.4 – Représentation des niveaux d'énergie hyperfins pour un spin nucléaire $I = 1$. Les transitions hyperfines possibles sont données pour deux transitions $\Delta J = +1$ et $\Delta J = 0$, respectivement $2_{12} \leftarrow 1_{11}$ et $2_{21} \leftarrow 2_{11}$

TABLE 1.3 – Règles de sélection hyperfines et leur dépendance en intensité (référence [20]).

ΔJ	ΔF	Intensité	mutiplet pour $I = 1$
$J + 1 \leftarrow J$	$F + 1 \leftarrow F$	$\propto F$	3
$J + 1 \leftarrow J$	$F \leftarrow F$	$\sim 1/2J^2$ de l'intensité totale	2
$J + 1 \leftarrow J$	$F - 1 \leftarrow F$	$\sim 1/10J^4$ de l'intensité totale	1
$J \leftarrow J$	$F + 1 \leftarrow F$	$\sim 1/2J^2$ de l'intensité totale	2
$J \leftarrow J$	$F \leftarrow F$	$\propto F$	3
$J \leftarrow J$	$F - 1 \leftarrow F$	$\sim 1/2J^2$ de l'intensité totale	2

1.5 Hamiltonien de rotation-vibration (rovibration)

La spectroscopie rovibrationnelle infrarouge s'intéresse aux transitions rotationnelles entre deux états vibrationnels différents ou entre un état excité et l'état fondamental pour une bande dite "fondamentale". Il est également fréquent d'observer à température ambiante des transitions purement rotationnelles dans un état vibrationnel basse énergie excité thermiquement dans les spectres millimétriques/THz. Les transitions rovibrationnelles se distinguent des transitions de rotation pure dans l'état fondamental ou excités par une énergie de transition beaucoup plus importante permettant d'exciter vibrationnellement la molécule. La vibration de molécules polyatomiques a pour effet de modifier l'inertie de la molécule et donc affecte les constantes moléculaires des modes de vibration excités, les constantes de l'état fondamental et celles de chaque état de vibration excité sont donc différentes.

Afin d'étudier les spectres rovibrationnels, les calculs de chimie quantique doivent four-

nir les fréquences des modes de vibrations et leurs constantes rotationnelles avec une précision suffisante pour démarrer l'analyse. L'approche harmonique est une approximation généralement suffisante pour déterminer les constantes rotationnelles de l'état fondamental à l'aide des calculs, ce qui n'est pas le cas pour étudier les états de vibration excités. Les calculs anharmoniques sont nécessaires pour connaître la variation des constantes rotationnelles dans les états excités, les constantes de distorsion centrifuge et les fréquences et intensités des modes de vibration dans le modèle anharmonique (modes fondamentaux, bandes de combinaison et overtones).

1.5.1 Approximation de l'oscillateur harmonique

Pour une molécule à N atomes, $3N$ déplacements indépendants sont possibles dont 3 translations et 3 rotations de la molécule selon x , y et z . On considère donc $3N - 6$ modes de vibration indépendants correspondant à des mouvements entre différentes parties de la molécules ($3N - 5$ pour une toupie linéaire). L'énergie totale (potentielle et cinétique) de vibration dans les coordonnées normales Q_i où elle est diagonale est donnée par [37, 38] :

$$E = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N-6} \dot{Q}_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N-6} \kappa_i Q_i^2 \quad (1.27)$$

où κ_i est la constante de force de l'oscillateur harmonique dans les coordonnées normales pondérées en masse et où l'utilisation des coordonnées normales permet de faire disparaître les termes croisés dans l'expression de l'énergie potentielle. Dans les modes normaux de vibration, tous les atomes se déplacent à la même fréquence et vibrent en phase. Les coordonnées internes de vibration Q_i sont indépendantes et correspondent à $3N - 6$ oscillateurs harmoniques indépendants. L'énergie quantique totale associée à l'oscillateur harmonique est un résultat bien connu :

$$E_{vib} = \sum_i \left(v_i + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_i \quad \text{avec} \quad \omega_i = \sqrt{\kappa_i} \quad (1.28)$$

où $i = 1, 2, \dots, (3N - 6)$ et $v_i = 0, 1, 2, \dots$. Lorsque $v_i = 0$, l'énergie de vibration est non nulle, ce qui signifie qu'une molécule ne se trouve jamais dans sa configuration d'équilibre. L'intervalle d'énergie entre deux harmoniques d'un mode de vibration i est constant et vaut ω_i dans l'approximation harmonique. Cependant, la fonction potentielle V n'est bien approximée par une parabole qu'autour de la position d'équilibre. Afin de reproduire au mieux la structure énergétique de vibration d'une molécule, la contribution des termes d'anharmonicité doit être prise en compte.

1.5.2 Corrections anharmoniques

Les termes d'anharmonicité sont faibles devant les termes quadratiques et peuvent être obtenus par une approche perturbative en fonction des coordonnées massiques $q_i = \sqrt{m_i}\varepsilon_i$ pour chaque atome de masse m_i déplacé de ε_i par rapport à sa position d'équilibre :

$$V_{anharm} = \frac{1}{3!} \sum_{i,j,k} \left(\frac{\partial^3}{\partial q_i \partial q_j \partial q_k} V \right)_0 q_i q_j q_k + \frac{1}{4!} \sum_{i,j,k,l} \left(\frac{\partial^4}{\partial q_i \partial q_j \partial q_k \partial q_l} V \right)_0 q_i q_j q_k q_l + \dots \quad (1.29)$$

Bien que la part quadratique du potentiel puisse être diagonalisée dans les coordonnées normales, les termes d'ordre supérieurs sont non diagonaux dans les coordonnées normales ce qui rend les modes de vibration dépendants les uns aux autres. Les niveaux d'énergie vibrationnels quantiques (en cm^{-1}) s'écrivent alors :

$$E_{vib} = \sum_i \omega_i \left(v_i + \frac{1}{2} \right) + \sum_i \sum_{k \geq i} \chi_{ik} \left(v_i + \frac{1}{2} \right) \left(v_k + \frac{1}{2} \right) + \dots \quad (1.30)$$

où ω_i sont les fréquences et χ_{ik} les corrections anharmoniques généralement négatives. Les modes harmoniques d'un mode de vibration ($v_i = 0, 1, 2, \dots$) ne sont donc plus équidistants et ont tendance à se rapprocher. Avec la correction anharmonique, l'énergie de point zéro $v_i = 0$ ($i = 1, 2, \dots, (3N - 6)$) vaut donc :

$$E(v_1 = 0, v_2 = 0, \dots) = \frac{1}{2} \sum_i \omega_i + \frac{1}{4} \sum_{ij} \chi_{ik} + \dots \quad (1.31)$$

1.5.3 Règles de sélection

Les modes normaux de vibration qui induisent une variation de moment dipolaire sont dit actifs et peuvent donc être observés (voir équation 1.16). À l'inverse, les modes inactifs ne peuvent pas être observés car ils ne modifient pas ou pas assez la distribution de charge et n'induisent donc pas de moment dipolaire de vibration. La spectroscopie rovibrationnelle s'intéresse donc aux transitions de rotation entre deux niveaux vibrationnels $v' \leftarrow v''$ d'un mode actif. Différents types de transitions sont possibles : un mode fondamental correspond à $v = 1 \leftarrow 0$, une bande chaude correspond à $v'' \neq 0$, la première harmonique d'un mode est $v = 2 \leftarrow 0$ et la deuxième harmonique de ce même mode est $v = 3 \leftarrow 0$. On s'intéressera notamment aux transitions entre un état de vibration $v_1 = 1$ et l'état fondamental $v_1 = 0$,

les autres modes sont donc fixés à $v_i = 0$ et l'énergie est donnée par :

$$E(v_1, v_2 = 0, \dots) - E(v_1 = 0, v_2 = 0, \dots) = \omega_i \left[\left(v_i + \frac{1}{2} \right) + \chi_{ii} \left(v_i + \frac{1}{2} \right)^2 \right] - \left[\frac{\omega_i}{2} + \frac{\chi_{ii}}{4} \right] \quad (1.32)$$

avec χ_{ii} les constantes d'anharmonicité diagonales. En appliquant cette équation à un mode fondamental et à ses deux premières harmoniques, on obtient :

$$E(v_1 = 1) - E(v_1 = 0) = \omega_i + 2\chi_{ii} \quad (1.33)$$

$$E(v_1 = 2) - E(v_1 = 0) = 2\omega_i + 6\chi_{ii} \quad (1.34)$$

$$E(v_1 = 3) - E(v_1 = 0) = 3\omega_i + 12\chi_{ii} \quad (1.35)$$

1.5.4 Structure rotationnelle des spectres de vibration

L'Hamiltonien effectif permettant de reproduire les transitions rovibrationnelles est le même que celui utilisé en rotation pure, il faut néanmoins considérer un Hamiltonien rotationnel pour chacun des deux états de vibration intervenant dans la transition et ajuster l'énergie de transition vibrationnelle correspondant au centre de la bande observée. Dans la mesure du possible, l'analyse du spectre en rotation pure traitant les états vibrationnels de manière isolée est une étape préliminaire à l'analyse rovibrationnelle car elle permet de déterminer les constantes de l'état fondamental et facilite ainsi l'analyse rovibrationnelle en diminuant le nombre de constantes indéterminées.

La structure d'une bande de rovibration est caractérisée par l'observation de branches P ($\Delta J = -1$), Q ($\Delta J = 0$) et R ($\Delta J = +1$). La figure 1.5 illustre l'observation de ces trois branches pour trois types de bandes a, b et c, il est à noter que la branche Q est généralement trop faible pour être observée pour les bandes de type b. En spectroscopie rovibrationnelle infrarouge, les branches sont notées $^{\Delta K} \Delta J(K_{low})$ avec $\Delta K = p, q, r$ pour $\Delta K = -1, 0, +1$, avec $\Delta J = P, Q, R$ pour $\Delta J = -1, 0, +1$, et avec $K = K_a$ ou $K = K_c$ selon une toupie prolate ou oblate, respectivement.




FIGURE 1.5 – Simulation de trois spectres rovibrationnels synthétiques d’une toupie asymétrique proche prolata à partir des constantes rotationnelles de la bande ν_5 de SOCl_2 contenant des transitions de type a, b ou c.

1.6 Couplage avec la rotation interne

Certaines molécules présentent des mouvements dits de grande amplitude comme la rotation interne d’un ou plusieurs groupement méthyle [39, 40], la torsion d’un hydrogène [41] ou l’inversion comme pour la molécule d’ammoniac [42]. Dans ce cas, le traitement perturbatif du rotateur semi-rigide associé à l’approximation de petites oscillations n’est plus valable et nécessite un modèle particulier. Les nitrotoluènes étudiés dans ma thèse présentent un mouvement de rotation interne du groupement méthyle qui interagit avec la rotation globale de la molécule et produit des effets sur les spectres de rotation observables à haute résolution.

1.6.1 Energie potentielle de rotation interne

La rotation interne d'un groupement méthyle par rapport au reste de la molécule a pour effet de dédoubler les transitions observées. La variation de l'angle de torsion α du groupe méthyle par rapport au reste de la molécule forme un potentiel de période $2\pi/N$, avec N le nombre de positions équivalentes du rotateur interne, qui peut être décrit par une série de Fourier :

$$V(\alpha) = \sum_k a_k \cos(kN\alpha) = \frac{V_N}{2}(1 - \cos(N\alpha)) + \frac{V_{2N}}{2}(1 - \cos(2N\alpha)) + \dots \quad (1.36)$$

Dans le cas où le groupe méthyle de symétrie C_{3V} possède trois positions équivalentes ($N = 3$), le potentiel $V(\alpha)$ possède donc trois minima et trois maxima :

$$V(\alpha) = \sum_k a_k \cos(kN\alpha) = \frac{V_3}{2}(1 - \cos(3\alpha)) + \frac{V_6}{2}(1 - \cos(6\alpha)) + \dots \quad (1.37)$$

où V_3 correspond à la hauteur du potentiel et V_6 à une correction de type anharmonique (généralement moins de 1% de V_3) [39]. L'effet tunnel à travers la barrière de torsion se traduit par la séparation des niveaux d'énergie en deux sous-niveaux désignés par leur symétrie dans le groupe C_3 : non dégénérés A ($\sigma = 0$) et doublement dégénérés E ($\sigma = \pm 1$). Une barrière basse correspond à un rotateur interne libre et une barrière haute à un rotateur oscillant. Selon la hauteur de la barrière, deux notations sont utilisées pour labelliser les sous-niveaux d'énergie dans l'état fondamental et les états excités de torsion du CH_3 (voir figure 1.6). Dans le cas d'une barrière haute ($V_3 \sim 500 \text{ cm}^{-1}$), les sous-niveaux d'énergie A et E d'un état v_t seront faiblement séparés, l'utilisation du nombre quantique de torsion v_t est alors bien adapté. Dans le cas pour une barrière basse ($V_3 \sim 10 \text{ cm}^{-1}$) les sous-niveaux d'énergie A et E d'un état v_t seront fortement séparés et les sous-niveaux A de deux niveaux v_t proches tendent à être dégénérés, l'utilisation du nombre quantique de rotation libre m est alors plus adapté comme le décrit V. V. Ilyushin et al. [43, 44]. La correspondance entre les deux notations est la suivante : $m = 0 \leftrightarrow v_t = 0$ (A), $m = \pm 1 \leftrightarrow v_t = 0$ (E), $m = \pm 2 \leftrightarrow v_t = 1$ (E), $m = +3 \leftrightarrow v_t = 1$ (A), $m = -3 \leftrightarrow v_t = 2$ (A), $m = \pm 4 \leftrightarrow v_t = 2$ (E) etc.

1.6.2 Hamiltonien de rotation interne

De nombreux articles sont consacrés dans la littérature à la description de l'Hamiltonien de rotation interne et aux méthodes permettant l'analyse des spectres. Le but de cette section est de présenter les différentes approximations et choix du système d'axes permettant de simplifier la description théorique et donc le traitement des spectres. On se limitera à la des-




FIGURE 1.6 – Représentation d’une barrière de potentiel V_3 et ses niveaux d’énergie de rotation internes associés. Les nombres quantiques de torsion v_t et les sous-niveaux désignés par leur symétrie sous le groupe C_3 (A ou E) sont associés à une barrière haute (rotateur oscillant) et indiqués sur l’ordonnée de droite. Les nombres quantiques m associés à une barrière basse (rotateur libre) sont indiqués sur l’ordonnée de gauche.

description d’une toupie asymétrique couplée à la rotation interne d’une toupie quasi symétrique C_{3V} .

Systèmes d’axes principaux PAM

Dans le système d’axe principaux (PAM), le Hamiltonien de torsion décrivant le couplage rotation interne/rotation de la molécule s’ajoute à l’hamiltonien de rotation décrit en section 1.3 tel que :

$$\hat{H}_{rot}^{(PAM)} = \hat{H}_{rot}^{0(PAM)} + \hat{H}_{tors}^{(PAM)}. \quad (1.38)$$

L’Hamiltonien de torsion \hat{H}_{tors} est donné par [39, 45] :

$$\hat{H}_{tors}^{(PAM)} = F(\hat{\mathbf{J}}_\alpha - \rho_a \hat{J}_a - \rho_b \hat{J}_b - \rho_c \hat{J}_c)^2 + V(\alpha). \quad (1.39)$$

où $\hat{\mathbf{J}}_\alpha$ est le moment angulaire de rotation interne conjugué à l'angle de torsion α et \hat{J}_g ($g = a, b, c$) les projections du moment angulaire total. Le potentiel de rotation interne $V(\alpha)$ est défini par l'équation 1.37. La constante de rotation interne F et le vecteur ρ sont reliés aux moment d'inertie de la molécule I_g ($g = a, b, c$) et du rotateur interne I_α par :

$$\rho_g = \frac{\lambda_g I_\alpha}{I_g}, \quad (1.40)$$

$$F = \frac{1}{2r I_\alpha} \quad \text{avec} \quad r = 1 - \sum_g \lambda_g^2 \frac{I_\alpha}{I_g} \quad (1.41)$$

où $\lambda_g = \cos(\theta(i, g))$ sont les cosinus directeurs de l'axe i du rotateur interne dans le système d'axes PAM de la molécule.

Bien que la puissance des ordinateurs permettrait aujourd'hui d'écrire plus facilement un programme basé sur la diagonalisation de l'Hamiltonien de rotation interne de l'équation 1.39 dans le système d'axes principaux (PAM), les termes croisés $-2F\hat{\mathbf{J}}_\alpha(\sum_{g=a,b,c} \rho_g \hat{J}_g)$ (non diagonaux avec le nombre quantique de torsion v_t) convergent très lentement, surtout si le pseudo nombre quantique de projection K ou ρ sont grands [46]. L'approximation principale faite dans le système d'axes PAM est le traitement perturbatif de ces termes croisés en appliquant les transformations de Van Vleck [45]. Ces transformation permettent de réduire les éléments de matrice correspondants à ces termes croisés à un ordre suffisamment grand pour les négliger en première approximation. La matrice Hamiltonienne transformée peut alors être factorisée en de plus petites matrices effectives, une pour chaque état de torsion v_t et pour chaque état de rotation interne $\sigma = 0$ (état A) et $\sigma = \pm 1$ (état E). Chaque état σ d'un état v_t peut donc être traité avec son propre Hamiltonien :

$$\hat{H}_{rot,v\sigma}^{(PAM)} = \hat{H}_{rot,v\sigma}^{0(PAM)} + F \sum_n W_{v_t\sigma}^{(n)} \sum_g (\rho_g \hat{J}_g)^n. \quad (1.42)$$

Les coefficients $W_{v\sigma}^{(n)}$ résultent du traitement perturbatif de Van Vleck et leurs valeurs sont tabulées en fonction de la hauteur de la barrière réduite $s = 4V_3/9F$ [45]. Cette méthode est bien adaptée pour le traitement de barrières réduite hautes car si s est trop faible, les coefficients $W_{v\sigma}^{(n)}$ deviennent très grands et le traitement perturbatif n'est plus correct.

Pour les espèces A, les coefficients $W_{v\sigma}^{(n)}$ d'ordre n impairs sont nuls [45]. L'Hamiltonien effectif des espèces A revient donc à la description de l'Hamiltonien standard de Watson et s'écrit au deuxième ordre comme :

$$\hat{H}_{rot,v_t A}^{(PAM)} = A_{vtA} \hat{J}_a^2 + B_{vtA} \hat{J}_b^2 + C_{vtA} \hat{J}_c^2 + \sum_{g,g'=a,b,c} E_{A,gg'} (\hat{J}_g \hat{J}_{g'} + \hat{J}_g \hat{J}_{g'}) \quad (1.43)$$

avec $E_{A,gg'} = FW_{v_t A}^{(2)}(\rho_g \rho_{g'})$ pour la distorsion centrifuge liée aux espèces A.

Pour les espèces E, il faut tenir compte des termes impairs non-nuls [39], l'Hamiltonien s'écrit alors :

$$\hat{H}_{rot,v_t E}^{(PAM)} = A_{vtE} \hat{J}_a^2 + B_{vtE} \hat{J}_b^2 + C_{vtE} \hat{J}_c^2 + \sum_{g,g'=a,b,c} E_{E,gg'} (\hat{J}_g \hat{J}_{g'} + \hat{J}_g \hat{J}_{g'}) + \sum_g D_g \hat{J}_g + \sum_g D_{gK} \hat{J}_g \hat{J}_a^2 + \sum_g D_{gJ} \hat{J}_g \hat{\mathbf{J}}^2 \quad (1.44)$$

avec $E_{E,gg'} = FW_{v_t E}^{(2)}(\rho_g \rho_{g'})$ pour la distorsion centrifuge liée aux espèces E, $D_g = F\rho_g W_{v_t E}^{(1)}$ pour la rotation interne à l'ordre 1, et $D_{gK} = F\rho_a W_{v_t E}^{(3)}$ et $D_{gJ} = F\rho W_{v_t E}^{(3)}$ pour la rotation interne à l'ordre 3. Si les termes D_g sont importants [47, 48], alors des termes d'ordre supérieur peuvent être nécessaires (D_{gK} , D_{gJ}). Dans cette description, les constantes rotationnelles des espèces A et E sont liées par la propriété $W_{v_t A}^{(2n)} = -2W_{v_t E}^{(2n)}$ telles que :

$$A = \frac{A_A + 2A_E}{3} \quad B = \frac{B_A + 2B_E}{3} \quad C = \frac{C_A + 2C_E}{3} \quad (1.45)$$

La hauteur de la barrière n'est donc pas obtenue directement dans cette approche, elle peut néanmoins être estimée à partir des coefficients de perturbation de l'Appendix C de la référence [45] et de la méthode expliquée dans la référence [49].

Systèmes d'axes RAM

Si la barrière réduite est basse, le traitement perturbatif négligeant les termes croisés du système PAM ne permet pas de décrire correctement les niveaux d'énergie. Afin de réduire les termes croisés et ainsi accélérer la diagonalisation de l'Hamiltonien sans utiliser de traitement perturbatif, le système d'axes rho (Rho Axis Method - RAM) a été proposé par Dennison, Hecht et al. [50, 51, 52, 53]. Le système d'axes RAM est obtenu par une rotation du système d'axes PAM tel que l'axe z soit parallèle au vecteur ρ , permettant ainsi de réduire les termes de couplage entre la rotation de la molécule et celle du rotateur interne ($\rho_b \simeq \rho_c \simeq 0$) dans un Hamiltonien effectif[54]. Les équations 1.38 et 1.39 peuvent ainsi être ré-écrites dans le système RAM avec $\rho_a = \rho$ tel que [46] :

$$\hat{H}_{rot}^{(RAM)} = \hat{H}_{rot}^{0(RAM)} + \hat{H}_{tors}^{(RAM)} \quad (1.46)$$

$$\hat{H}_{tors}^{(RAM)} = F(\hat{\mathbf{J}}_\alpha - \rho \hat{J}_a)^2 + V(\alpha). \quad (1.47)$$

L'Hamiltonien de rotation doit donc également être exprimé dans le système RAM en utilisant les matrices de rotation. Dans la suite de l'étude, on se limitera à la description de la rotation interne dans le cas d'une molécule plane appartenant au plan (a,b), la matrice de rotation s'appliquera donc autour de l'axe c , permettant de confondre l'axe a avec ρ :

$$R_c(\theta_{RAM}) = \begin{bmatrix} \cos(\theta_{RAM}) & -\sin(\theta_{RAM}) & 0 \\ \sin(\theta_{RAM}) & \cos(\theta_{RAM}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.48)$$

L'angle θ_{RAM} est l'angle entre les systèmes d'axes PAM et RAM et peut être calculé à partir de la géométrie d'équilibre de la molécule tel que :

$$\tan \theta_{RAM} = \frac{\rho_b}{\rho_a} = \frac{\lambda_b I_a}{\lambda_a I_b} \quad (1.49)$$

avec λ_a et λ_b les cosinus directeurs de l'axe du rotateur interne i . La rotation des constantes rotationnelles vers le système RAM génère un paramètre hors diagonal D_{ab} dit "Coriolis-like" :

$$\begin{bmatrix} A & D_{ab} & 0 \\ D_{ab} & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{RAM} = R_c(\theta_{RAM})^T \times \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_{PAM} \times R_c(\theta_{RAM}) \quad (1.50)$$

Cette rotation est également appliquée au vecteur moment dipolaire permanent $\vec{\mu}$ de la molécule :

$$\begin{bmatrix} \mu_a \\ \mu_b \\ \mu_c \end{bmatrix}_{RAM} = R_c(\theta_{RAM})^T \times \begin{bmatrix} \mu_a \\ \mu_b \\ \mu_c \end{bmatrix}_{PAM} \quad (1.51)$$

Ainsi, dans le cas particulier de molécules avec un plan de symétrie (a,b), il est possible de calculer les constantes rotationnelles dans le système RAM à partir des équations suivantes :

$$A_{RAM} = A_{PAM} \cos^2 \theta_{RAM} + B_{PAM} \sin^2 \theta_{RAM} \quad (1.52)$$

$$B_{RAM} = A_{PAM} \sin^2 \theta_{RAM} + B_{PAM} \cos^2 \theta_{RAM} \quad (1.53)$$

$$C_{RAM} = C_{PAM} \quad (1.54)$$

$$D_{ab} = (B_{PAM} - A_{PAM}) \cos(\theta_{RAM}) \sin(\theta_{RAM}) \quad (1.55)$$

La transformation inverse des constantes A_{RAM} , B_{RAM} et D_{ab} ajustées en RAM vers le système PAM est obtenue en appliquant la matrice de rotation d'un angle $-\theta_{RAM}$ ou en

substituant l'équation 1.52 dans 1.53 et 1.55 tel que :

$$A_{PAM} = A_{RAM} - D_{ab} \sin(\theta_{RAM})/\cos(\theta_{RAM}) \quad (1.56)$$

$$B_{PAM} = B_{RAM} + D_{ab} \sin(\theta_{RAM})/\cos(\theta_{RAM}), \quad (1.57)$$

avec l'angle θ_{RAM} déterminé à partir de la diagonalisation de la matrice des constantes rotationnelles ajustées en RAM :

$$\theta_{RAM} = \frac{1}{2} \arctan \left(-\frac{2D_{ab}}{A_{RAM} - B_{RAM}} \right). \quad (1.58)$$

L'expression complète de l'Hamiltonien d'une toupie asymétrique semi-rigide incluant les termes de distorsion centrifuge et de couplage de rotation interne dans le système d'axes RAM jusqu'à l'ordre 4 est donnée en réduction A et en représentation III^r par [46] :

$$\hat{H}_{rot}^{(RAM)} = \hat{H}_{rot}^{0(RAM)} + \hat{H}_{dist}^{(RAM)} + \hat{H}_{tors}^{(RAM)} \quad (1.59)$$

avec :

$$\hat{H}_{rot}^{0(RAM)} = A_{RAM} \hat{J}_a^2 + B_{RAM} \hat{J}_b^2 + C_{RAM} \hat{J}_c^2 + D_{ab} (\hat{J}_a \hat{J}_b + \hat{J}_b \hat{J}_a) \quad (1.60)$$

$$\hat{H}_{tors}^{(RAM)} = F(\hat{J}_\alpha - \rho \hat{J}_a)^2 + \frac{V_3}{2}(1 - \cos(3\alpha)) + \frac{V_6}{2}(1 - \cos(6\alpha)) \quad (1.61)$$

$$\begin{aligned} \hat{H}_{dist}^{(RAM)} = & -\Delta_J \hat{J}^4 - \Delta_{JK} \hat{J}^2 \hat{J}_a^2 - \Delta_K \hat{J}_a^4 - \delta_J 2\hat{J}^2(\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2) - \delta_K \{\hat{J}_a^2, (\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2)\} \\ & + d_{ab}(1 - \cos(3\alpha))(\hat{J}_a \hat{J}_b + \hat{J}_b \hat{J}_a) + \Delta_{ab} \hat{J}_\alpha^2(\hat{J}_a \hat{J}_b + \hat{J}_b \hat{J}_a) + \delta_{ab} \hat{J}_a \hat{J}_\alpha(\hat{J}_a \hat{J}_b + \hat{J}_b \hat{J}_a) \\ & + F_v(1 - \cos(3\alpha))\hat{J}^2 + G_v \hat{J}_\alpha^2 \hat{J}^2 + L_v \hat{J}_a \hat{J}_\alpha \hat{J}^2 + k_1 \hat{J}_a \hat{J}_\alpha \hat{J}_a^2 + k_2 \hat{J}_\alpha^2 \hat{J}_a^2 \\ & + k_3 \hat{J}_a \hat{J}_\alpha^3 + k_4 \hat{J}_\alpha^4 + k_5(1 - \cos(3\alpha))\hat{J}_a^2 + c_1 \hat{J}_\alpha^2(\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2) \\ & + c_2(1 - \cos(3\alpha))(\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2) + c_4 \hat{J}_a \hat{J}_\alpha(\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2) \end{aligned} \quad (1.62)$$

Systemes d'axes IAM

Dennison, Hecht et al. ont également proposé une autre méthode qui consiste à appliquer deux rotations successives du système d'axes pour passer du système d'axes PAM au système RAM, puis du système RAM au système d'axes internes (Internal Axis Method - IAM) permettant de confondre l'axe i de rotation du rotateur interne avec l'axe z [39]. La deuxième rotation permet de négliger le terme $-2F\rho_z \mathbf{J}_\alpha J_z$ de l'Hamiltonien de l'équation

1.47, améliorant ainsi la convergence [46], l'Hamiltonien ainsi obtenu est donnée par :

$$\begin{aligned} \hat{H}_{rot}^{(IAM)} = & F \hat{\mathbf{J}}_{\alpha}^2 + V(\alpha) + A \left[\cos(\theta_{RAM}) \hat{J}_z - \sin(\theta_{RAM}) (\cos(\rho\alpha) \hat{J}_x - \sin(\rho\alpha) \hat{J}_y) \right]^2 \\ & + B \left[\sin(\theta_{RAM}) \hat{J}_z + \cos(\theta_{RAM}) (\cos(\rho\alpha) \hat{J}_x - \sin(\rho\alpha) \hat{J}_y) \right]^2 + C \left[\sin(\rho\alpha) \hat{J}_x + \cos(\rho\alpha) \hat{J}_y \right]^2 \end{aligned} \quad (1.63)$$

où α est l'angle de torsion du rotateur interne.

1.6.3 Règles de sélection

L'unique règle de sélection sur le couplage de rotation interne est $\Delta_{\sigma} = 0$, les transitions ne peuvent donc se produire qu'entre deux états de même symétrie A ou E (voir figure 1.7). Selon la hauteur de la barrière, la différence de fréquence entre une transition A et




FIGURE 1.7 – Représentation de transitions rotationnelles, la rotation interne en symétrie A ($\sigma = 0$) ou E ($\sigma = \pm 1$).

une transition E ayant les mêmes nombres quantiques de transition est très variable, plus la barrière est basse, plus les écarts sont grands. Ces écarts varient également en fonction de la valeur de J et de K_a , de quelques MHz à plusieurs GHz dans le cas d'une barrière basse.

1.7 Intensité de raies

Cette section a pour but de rappeler les concepts fondamentaux liés à l'émission ou l'absorption d'un photon et de donner les équations nécessaires au calcul de l'intensité des transitions rotationnelles. Une discussion complète des paramètres d'intensité de raies et de leurs unités est détaillée par Pugh et Narahari Rao (1976) [55].

1.7.1 Spectres d'absorption et d'émission

En absorbant ou en émettant une radiation à la fréquence ν_{ab} , une transition rotationnelle entre un état $|a\rangle$ et un état $|b\rangle$ est possible avec la condition de résonance $E_b - E_a = h\nu_{ab}$. La population relative entre N_a et N_b de ces deux niveaux d'énergie rotationnels est obtenue à partir de la distribution de Boltzmann à l'équilibre thermodynamique :

$$\frac{N_b}{N_a} = \exp\left(-\frac{E_b - E_a}{kT}\right) = \exp\left(-\frac{h\nu_{ab}}{kT}\right) \quad (1.64)$$

Selon la population des niveaux d'énergie, différents cas d'émissions et d'absorptions peuvent être observés. La figure 1.8 illustre quatre situations différentes de populations relatives entre deux états non-dégénérés et leur type de transitions observables.




FIGURE 1.8 – Différentes configurations de population dans un système à deux niveaux et leur type de transitions observables (crédit : J. Brown and A. Carrington, *Rotational Spectroscopy of Diatomic Molecule*, 2003)

- **Cas (i)** : la population est en accord avec la distribution de Boltzmann à l'équilibre thermique d'un gaz à la température T . L'absorption d'un photon de l'état $|a\rangle$ vers l'état $|b\rangle$ permet d'observer le spectre d'absorption.
- **Cas (ii)** : la population dans les deux états est égale, ce cas peut être réalisé si la puissance électromagnétique de la radiation est suffisamment élevée. Ce cas mène à

la condition de saturation nécessaire pour mesurer des transitions à la résolution sub-Doppler (effet Lamb-Dip).

- **Cas (iii)** : l'inversion de population permet d'observer des spectres d'émission stimulée par relaxation de la population de l'état $|b\rangle$ vers l'état $|a\rangle$. On note que pour réaliser une inversion de population, il faut au minimum 3 niveaux.
- **Cas (iv)** : le refroidissement de la population de l'état $|b\rangle$ vers l'état $|a\rangle$ permet de peupler les niveaux d'énergie rotationnels les plus bas en dépeuplant les niveaux de plus hautes énergies. L'absorption entre les niveaux d'énergie rotationnels les plus bas est ainsi améliorée, les spectres observés sont également moins denses. Ces températures rotationnellement basses sont généralement obtenues en jet supersonique par détente adiabatique ($T_{rot} < 10K$).

1.7.2 Loi de Beer-Lambert

La loi de Beer-Lambert permet de décrire l'intensité mesurée des raies d'absorption en fonction de la concentration N des molécules absorbantes (en molecule.cm^{-3}) uniforme le long de la longueur L d'interaction lumière-matière (en cm), de la section efficace d'absorption moléculaire $\sigma_{ab}(\nu)$ et de l'intensité de la source I_0 [56] :

$$I(\nu) = I_0 e^{-\sigma_{ab}(\nu)NL}. \quad (1.65)$$

La section efficace d'absorption moléculaire $\sigma_{ab}(\nu)$ dépend de la fréquence de transition de l'état $|a\rangle$ à l'état $|b\rangle$ et peut être interprétée comme la surface d'un disque totalement absorbant ayant le même pouvoir absorbant qu'une molécule. Elle peut être exprimée en fonction de l'intensité de raie $S(\nu, T)$ ($\text{cm}^{-1}/(\text{molecule}/\text{cm}^2)$) et du profil de raie normalisé $g(\nu, T, P)$ (cm) tel que :

$$I(\nu) = I_0 e^{-S(\nu, T) \cdot g(\nu, T, P)NL}. \quad (1.66)$$

avec

$$S(\nu, T) = \int_0^{+\infty} \sigma_{ab}(\nu) d\nu \quad (1.67)$$

Le coefficient d'absorption est défini en cm^{-1} par $\alpha(\nu) = \sigma_{ab}(\nu)N = S(\nu, T) \cdot g(\nu, T, P)N$, on rappelle également la notion d'absorbance :

$$A_\nu = -\ln \left(\frac{I(\nu)}{I_0} \right). \quad (1.68)$$

1.7.3 Profil de raie

Une transition spectrale n'est pas rigoureusement monochromatique mais possède une certaine largeur en fréquence décrite par le profil de raie normalisé $g(\nu, T, P)$. Cet élargissement peut être naturel ou dû à différents paramètres physiques comme la pression (profil Lorentzien) ou l'agitation thermique des molécules et donc la vitesse des molécules (profil Gaussien) [28]. L'étude des profils de raies est un domaine d'étude à part entière dans le domaine de spectroscopie et de nombreux modèles ont été mis au point (SD-Voigt [57], Galatry [58], Rautian [59], Hartmann-Tran [60], etc.) afin de reproduire au mieux les profils de raies et en déduire des propriétés physico-chimiques sur le gaz moléculaire. La description des profils de raie Gaussien, Lorentzien et Voigt suffisent généralement à pointer la fréquence centrale des transitions pour l'analyse des spectres (voir table 1.4). Dans le cas de spectres rotationnels enregistrés à très basse pression (quelques μbar), l'utilisation du profil Gaussien suffit car l'élargissement par la pression du profil Lorentzien est négligeable. Enfin, bien que l'élargissement naturel des raies soit important pour des transitions électroniques (plusieurs MHz), il est négligeable en spectroscopie rotationnelle devant l'élargissement instrumental, Doppler ou dû à la pression (10^{-6} Hz pour une raie à 100 GHz et un moment dipolaire de 1D). Une comparaison entre les profils Gaussien, Lorentzien et Voigt est donnée en figure 1.9.




FIGURE 1.9 – Profils de raie Gaussien, Lorentzien et Voigt (crédit : M. Finch *et al.* [61]).

TABLE 1.4 – Description des profils de raie naturel, Gaussien, Lorentzien et Voigt[56, 28].

profil de raie	origine physique	expression et HWHM (demi-largeur à mi hauteur)
Naturel	L'élargissement naturel ΔE d'une raie est lié au temps de vie Δt de l'état excité et peut être décrit par le principe d'incertitude d'Heisenberg $\Delta E \Delta t \simeq \hbar$.	$\Delta\nu_n = \frac{\Delta E}{h} \simeq \frac{1}{2\pi\Delta t}$ (1.69)
		$\Delta t = \frac{1}{A} = \frac{3hc^3}{16\pi^3\nu^3 \mu ^2}$ (1.70) et A le coefficient d'Einstein, ν la fréquence de transition et μ le moment dipolaire de transition.
Gaussien	L'élargissement Doppler $g_D(\nu, T, P)$ est lié à l'agitation thermique des molécules et donc à leurs vitesses.	$g_D(\nu, T, P) = \frac{1}{\Delta\nu_D} \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi}} \exp\left(-\ln 2 \left(\frac{\nu - \nu_0}{\Delta\nu_D}\right)^2\right)$ (1.71)
		et $\Delta\nu_D = \frac{\nu_0}{c} \left(\frac{2N_A kT \ln 2}{M}\right)^{\frac{1}{2}} = 3.581 \times 10^{-7} \nu \left(\frac{T}{M}\right)^{\frac{1}{2}}$ (1.72) avec N_A le nombre d'Avogadro, M la masse moléculaire et T la température.
Lorentzien	Cet élargissement est lié aux collisions moléculaires et donc à la pression du gaz (linéairement proportionnel à la pression P). Les mécanismes qui opèrent dans les forces intermoléculaires sont détaillés par Anderson [62].	$g_L(\nu, T, P) \simeq \frac{\nu}{\pi\nu_0} \left[\frac{\Delta\nu_L}{(\nu - \nu_0)^2 + (\Delta\nu_L)^2} \right]$ (1.73)
		et $\Delta\nu_L = 1/(2\pi\tau)$ (1.74) avec τ le temps moyen entre les collisions.
Voigt	Ce profil permet de tenir compte des effets Doppler et de collisions afin d'améliorer la précision en convoluant la Gaussienne et la Lorentzienne.	$g_V(\nu, T, P) = g_G(\nu, T, P) \otimes g_L(\nu, T, P)$ (1.75)

1.7.4 Intensité des raies d'absorption

L'intensité $S(\nu, T)$ d'une transition est obtenue nm^2MHz (unités JPL) en intégrant la section efficace d'absorption sur toutes les fréquences (voir équation 1.67) [63] :

$$S(\nu, T) = \frac{8\pi^3}{3hc} \nu_{ab}^\alpha S_{ab} \mu_\alpha^2 \left(e^{-\frac{E_a}{kT}} - e^{-\frac{E_b}{kT}} \right) \frac{1}{Q(T)}, \quad (1.76)$$

où ν_{ab} est la fréquence de la transition (en MHz), ${}^\alpha S_{ab}$ la force de raie, μ_α le moment dipolaire selon l'axe α ($\alpha = a, b, c$), $Q(T)$ la fonction de partition totale, et E_a et E_b les énergies associées aux niveaux du bas et du haut de la transition (en Joules), respectivement. Dans la définition de l'intensité utilisée à la base de données du JPL regroupant uniquement des transitions de rotations pure [63], $Q(T)$ est défini comme la fonction de spin-rotation $Q_{rs} = g_{ns} Q_{rot}$ en rotation pure avec g_{ns} la dégénérescence de spin et Q_{rot} la fonction de partition rotationnelle. La détermination de g_{ns} pour le calcul de la fonction de partition n'est pas triviale. Néanmoins, g_{ns} est implicitement défini dans ${}^\alpha S_{ab}$ dans l'expression de l'intensité de [63] et le soin est pris pour que ${}^\alpha S_{ab}$ et Q_{rs} soient déterminés avec la même dégénérescence. Bien que le calcul de g_{ns} soit nécessaire pour déterminer la fonction de partition, il n'est pas nécessaire pour calculer les intensités de raies [64].

La force de raie ${}^\alpha S_{ab}$ d'une transition entre un niveau $|a\rangle$ contenant $M = 2J + 1$ composantes et un niveau $|b\rangle$ contenant $M' = 2J' + 1$ est généralement calculée par les programmes dédiés à la spectroscopie. Dans le cas d'une toupie asymétrique, elle peut-être définie comme [65, 66] :

$${}^\alpha S_{ab} = \frac{g_{ns}}{\mu^2} \sum_M 3 |\langle \Psi_f | \mu_Z | \Psi_i \rangle|^2 \quad (1.77)$$

où μ_Z est le moment dipolaire le long de l'axe fixe Z du laboratoire et $|\Psi_i\rangle$ et $|\Psi_f\rangle$ sont les fonctions d'onde de torsion-rotation d'une toupie asymétrique. L'intensité totale observée d'un spectre rotationnel est la somme des intensités individuelles $S(\nu, T)$ de chaque raie. L'unité de $S(\nu, T)$ en nm^2MHz est notamment utilisée par les programmes de spectroscopie SPFIT/SPCAT (voir section 1.8.3) et dans la base de données du JPL qui recense les données de molécules d'intérêt astrophysique. Pour les molécules d'intérêt atmosphérique, on préférera exprimer $S(\nu, T)$ en $\text{cm}^{-1}/(\text{molecule}/\text{cm}^2)$ qui est plus communément utilisée comme dans la base de données HITRAN, avec [63] :

$$S(\text{cm}^{-1}/(\text{molecule}/\text{cm}^2)) = \frac{S(\text{nm}^2\text{MHz})}{2.99792458 \times 10^{18}} \quad (1.78)$$

1.7.5 Calcul des fonctions de partition

Le calcul de la fonction de partition totale $Q(T)$ est nécessaire pour calculer l'intensité $I(\nu, T)$. Dans l'état électronique fondamental, elle est approximée comme le produit de la fonction de partition de spin-rotation ($g_{ns}Q_{rot}$) avec la fonction de partition de torsion (Q_{tor}) du CH_3 et la fonction de partition de vibration (Q_{vib}) [64] tel que :

$$Q(T) = g_{ns} \sum_i (2J_i + 1) e^{-\frac{E_i}{kT}} \simeq g_{ns} Q_{rot} Q_{tor} Q_{vib}. \quad (1.79)$$

où J_i est le moment angulaire de rotation du niveau i , T la température, k la constante de Boltzmann, et E_i le niveau d'énergie de vibration-torsion-rotation où l'énergie de point zéro est l'état fondamental de vibration torsion. La fonction de partition rotationnelle Q_{rot} d'une toupie asymétrique est généralement approximée dans le cas de températures suffisamment hautes (ou de constantes rotationnelles faibles) par :

$$Q_{rot} = \sum_{J, K_a, K_c} (2J + 1) e^{-\frac{E^{(rot)}_i}{kT}} \simeq \sqrt{\frac{\pi}{A_{PAM} B_{PAM} C_{PAM}}} \left(\frac{k_B T}{h} \right)^3. \quad (1.80)$$

Si la molécule subit des mouvements de rotation interne, la fonction de partition de torsion Q_{tor} est calculée à partir de :

$$Q_{tor} = \sum_{v_t=0}^{v_t^{max}} \left(e^{-\frac{E^{(tor)}(v_t, A)}{k_B T}} + e^{-\frac{E^{(tor)}(v_t, E)}{k_B T}} \right), \quad (1.81)$$

où $E^{(tor)}(v_t, A)$ et $E^{(tor)}(v_t, E)$ sont les niveaux d'énergies de torsion v_t pour les symétries A ou E. Enfin, la fonction de partition Q_{vib} est calculée dans le cadre de l'approximation harmonique par :

$$Q_{vib} = \prod_{i=1}^{3N-7} \frac{1}{1 - e^{E_i^{(vib)}/k_B T}} \quad (1.82)$$

avec N le nombre d'atomes dans la molécule et $E_i^{(vib)}$ la fréquence de vibration de chaque mode de vibration fondamental i de la molécule. L'équation 1.82 s'étend aux $3N - 7$ modes de vibration fondamentaux au lieu des $3N - 6$ car la torsion est traitée par l'équation 1.81. La fonction de partition de vibration Q_{vib} est généralement proche de 1 sauf dans le cas de mode de vibration de basse énergie.

Enfin, il n'a pas été nécessaire de calculer la dégénérescence de spin nucléaire g_{ns} qui se traduit par une alternance d'intensité ou par l'absence de raies selon la parité de N . Si une molécule contient une ou plusieurs paires de noyaux équivalents, c'est à dire avec les mêmes isotopes

et exactement le même environnement moléculaire, les spins nucléaires et la statistique de spin affectent la population des états moléculaires et donc l'intensité des transitions.[20]

1.7.6 Bases de données

De nombreuses bases de données permettent la mise en commun des données spectroscopiques pour la communauté scientifique. Elles contiennent les paramètres moléculaires issus de l'analyse de spectres ainsi que les fréquences, intensités et nombres quantiques associés aux transitions. Ces bases sont des outils indispensables pour la détection ou la surveillance de ces molécules sur le terrain, dans l'atmosphère ou dans le milieu interstellaire par exemple. De nombreuses bases de données sont utilisées et complémentaires, parmi lesquelles les plus connues sont : High-resolution TRANsmission molecular absorption database (HITRAN)[67, 68], Gestion et Etude des Informations Spectroscopiques Atmosphériques (GEISA)[69, 70], Jet Propulsing Laboratory (JPL) database [63, 71], Cologne Database Molecular Spectroscopy (CDMS) [72, 73]. HITRAN est une base de donnée de référence pour la détection atmosphérique de molécules de l'UV à l'IR lointain. La base de donnée du JPL (NASA) est plus appliquée à l'intérêt astrophysique et recense les données de l'analyse de spectres micro-onde, millimétrique et submillimétrique.

1.8 Outils informatiques pour l'analyse de spectre

Les calculs de chimie quantique constituent un point de départ dans l'analyse de spectres. Ils reproduisent les propriétés physico-chimiques désirées d'un système en résolvant l'équation de Schrödinger électronique pour prédire des paramètres moléculaires pertinents. Bien que je n'ai pas réalisé les calculs, différents acronymes sont utilisés pour identifier les méthodes et les bases utilisées, il est donc important de connaître les principes fondamentaux qui y sont associés et d'identifier les approximations qui y sont liées.

De nombreux outils informatiques sont nécessaires à l'analyse spectrale. D'une part, différentes interfaces graphiques permettent d'attribuer des raies moléculaires observées aux transitions $J'_{K'_a K'_c} \leftrightarrow J''_{K''_a K''_c}$ du modèle théorique. On s'intéressera notamment à l'utilisation de diagrammes de Loomis-Wood [74] et aux interfaces permettent de comparer et d'attribuer directement le spectre théorique avec le spectre expérimental. D'autre part, de nombreux programmes permettent d'ajuster les paramètres moléculaires à partir des attributions par un processus itératif (méthode des moindres carrés) dans le but de reproduire le spectre à la précision expérimentale. Ces méthodes s'appuient sur la résolution de l'équation de Schrödinger rovibrationnelle par diagonalisation de la matrice hamiltonienne. Cependant, tous les programmes ne permettent pas de traiter tous types de molécules ou d'interactions, en particulier dans le cas de la rotation interne. Par conséquent, différents programmes existent mais ne seront décrits que ceux utilisés au cours de ma thèse.

Bien que très efficace, l'analyse raie par raie devient très longue quand les spectres observés sont très denses. Un premier pas vers l'automatisation de l'analyse de spectre basée sur l'utilisation d'algorithmes évolutionnaires est également présentée. Dans cette approche, il n'est plus nécessaire d'attribuer les transitions mais uniquement de connaître un intervalle de valeurs dans lequel trouver les constantes de l'Hamiltonien.

1.8.1 Calculs de chimie quantique

Pour prédire des paramètres moléculaires pertinents pour démarrer l'analyse rotationnelle, l'équation de Schrödinger électronique doit être résolue dans l'approximation de Born-Oppenheimer [75]. Les valeurs propres de l'Hamiltonien électronique dépendent des positions nucléaires et définissent des surfaces d'énergie potentielle. Ainsi, la solution au problème électronique (ou son approximation) est une condition préalable à l'étude du problème de rotation. Comme l'équation de Schrödinger électronique ne peut être résolue exactement pour des systèmes moléculaires, la chimie quantique a pour objectif de trouver des solutions approximatives qui compromettent le moins possible la précision sans nécessiter de coûts excessifs en terme de puissance informatique. L'équilibre entre la précision requise et le coût

est la raison pour laquelle il existe tant d'approches disponibles. L'ensemble des méthodes de calcul décrites ci-après permettent une estimation de la structure à l'équilibre de la molécule, des paramètres du Hamiltonien de rotation pure et des différents couplages, du moment dipolaire permanent ou de transition induit par la vibration, de la fréquence des modes de vibration harmoniques de la molécule et de leur intensité. Néanmoins, il est généralement nécessaire d'effectuer des corrections en considérant un champ de force moléculaire anharmonique pour avoir une estimation des constantes de distorsion centrifuge ou pour avoir une meilleure estimation des modes de vibration de la molécule.

La procédure habituelle consiste à traiter le problème en deux étapes, d'abord avec la fonction d'onde à un électron (construction d'orbitales moléculaires) puis avec la fonction d'onde à électrons multiples (problème de corrélation d'électrons). La première étape consiste à choisir un ensemble de fonctions de bases à un électron représentant les orbitales atomiques. Cette étape implique une première approximation car en pratique seuls les ensembles de bases finis peuvent être utilisés, l'erreur associée est appelée l'erreur de base. Dans la deuxième étape, les orbitales moléculaires sont utilisées pour construire des fonctions à plusieurs électrons à l'aide des méthodes de chimie quantique. La forme la plus simple est le déterminant de Slater [76], mais ce dernier correspond à un modèle de particules indépendantes et le choix réel pour la fonction d'onde doit être une combinaison linéaire de déterminants. Le passage d'un seul déterminant de Slater à une combinaison linéaire permet d'introduire des effets de corrélation d'électrons qui ne peuvent pas être traités en utilisant un seul déterminant. Cette deuxième étape introduit donc une erreur dans les calculs de chimie quantique, car une expansion tronquée en termes de déterminants de Slater ne permet qu'un traitement approximatif des effets de corrélation d'électrons. Les erreurs de base et de corrélation d'électrons sont les sources principales d'erreurs dans les calculs de chimie quantique. Ces erreurs ne sont pas indépendantes car l'énergie de corrélation électronique réelle dépend fortement de l'ensemble de fonctions de bases choisi. Pour résumer, il est important de bien choisir un ensemble de fonctions de bases suffisamment complet et une méthode de construction des orbitales moléculaires permettant de reproduire au mieux les propriétés physico-chimiques désirées.

Précision et applicabilité des méthodes

Les méthodes de chimie quantique les plus couramment utilisées sont comparées en termes de précision et d'applicabilité dans la figure 1.10. Bien que leur précision soit limitée, le champ auto-cohérent de Hartree-Fock HF-SCF (la fonction d'onde est donnée par un seul déterminant de Slater et les orbitales moléculaires sont déterminées par le principe de variation [77]) et la théorie fonctionnelle de la densité DFT (basée sur les théorèmes de Hohenberg-




FIGURE 1.10 – Vue d’ensemble des méthodes de chimie quantique en termes de précision et d’applicabilité [33].

Kohn [78] avec la densité électronique comme quantité centrale au lieu de la fonction d’onde) sont des approches assez largement applicables en raison de leur simplicité intrinsèque et des algorithmes développés au cours des trois dernières décennies comme par exemple la méthode B98 [79] utilisée lors de ma thèse. La théorie des perturbations Møller-Plesset MP (aussi appelée théorie des perturbations multi-corps) [80, 81] est un traitement perturbatif à partir de la fonction d’onde HF-SCF en tant que solution d’ordre zéro et la somme des opérateurs Fock en Hamiltonien non perturbé [82]. Enfin, un traitement quasi-quantitatif des effets de corrélation d’électrons est fourni par des méthodes de clusters couplés (CC) [83, 84, 85, 86, 87, 88], cette haute précision ne peut être obtenue qu’à un coût de calcul important, rendant ainsi les schémas CC moins applicables aux molécules composées de nombreux atomes. En ce qui concerne l’applicabilité, le coût de calcul de HF-SCF et DFT évolue formellement en $O(N^4)$ alors que les méthodes CC évoluent au moins en $O(N^6)$, où N est la taille du système souvent identifiée (de façon imprécise) avec le nombre de fonctions de bases [33].

Fonctions de bases

Les ensembles de bases sont généralement prédéfinis et disponibles dans la bibliothèque du logiciel utilisé (par exemple dans Gaussian 09 [89]) ou dans la littérature. Une liste assez exhaustive des ensembles de bases est disponible sur la page Web d’échange EMSL [90]. Le choix de la base appropriée est discuté de façon approfondie dans différentes études [91, 92, 93]. Plus un ensemble de bases est grand, plus il comprend de fonctions de bases variées et en plus grand nombre. Par conséquent, les ensembles de bases les plus grands permettent généralement de mieux approximer la véritable fonction d’onde moléculaire, mais nécessitent

également davantage de ressources informatiques. Les ensembles de bases les plus petits contiennent le nombre minimal de fonctions de bases d'orbitales atomiques nécessaires pour décrire chaque atome. Bien que des ensembles de bases minimaux ne soient pas recommandés pour des prédictions cohérentes et précises des énergies moléculaires, leur structure simple fournit un bon outil pour visualiser les aspects qualitatifs des liaisons chimiques au sein de la molécule. La table 1.5 regroupe certains ensembles de bases standards avec le nombre et de type de fonctions de bases impliquées.

TABLE 1.5 – Caractérisation de certains ensembles de bases standards en termes de nombre et de types de fonctions de bases impliquées pour l'atome d'Hydrogène, la deuxième et la troisième ligne du tableau périodique.

Ensemble de bases	Hydrogène	première ligne	deuxième ligne
Base minimale (STO-3G)	1s	2s1p	3s2p
Double zeta (DZ)	2s	4s2p	6s4p
Triple zeta (TZ)	3s	6s3p	9s6p
Quadruple zeta (QZ)	4s	8s4p	12s8p
Double-zeta + polarization (DZP)	2s1p	4s2p1d	6s4p1d
Triple-zeta + polarization (TZP)	3s1p	6s3p1d	9s6p1d

Enfin, l'utilisation d'un seul ensemble de base ne permet pas de connaître l'exactitude d'un calcul, il est donc essentiel d'effectuer des calculs avec différents ensembles de bases afin de comparer leur convergence, d'estimer les erreurs. Une telle série de calculs est mieux exécutée avec des ensembles de bases provenant d'une hiérarchie d'ensembles de bases spécialement conçus comme les bases cohérentes de Dunning [94].

Il est également possible d'extrapoler les calculs à un ensemble de base complet à la limite CBS (Complete Basis Set). Cette méthode consiste à extrapoler une base à l'infini à partir de différents calculs utilisant la même méthode et au minimum trois ensemble de bases identiques mais avec un nombre différent de fonctions par orbitale atomique (par exemple X = D, T et Q [95]).

1.8.2 Visualisation et attribution des spectres

Les paramètres fournis par les calculs de chimie quantique permettent d'avoir une première description des niveaux d'énergie à partir de constantes moléculaires *ab initio* et de connaître le type de transitions attendues, ce qui permet de générer une prédiction du spectre théorique. La première difficulté réside dans le choix des premières raies à attribuer parmi la multitude de raies observées, ce qui est encore plus difficile dans le cas de spectres denses. La

précision des calculs de chimie quantique est donc importante car elle permet de rapprocher au mieux la prédiction du spectre avec l'observation et donc facilite l'identification des premières raies à attribuer. Au cours de ma thèse j'ai principalement utilisé deux interfaces graphiques permettant de comparer l'expérience à sa prédiction et d'attribuer les transitions : ASCP/SVIEW[96, 97] et LWWa [98].

ASCP/SVIEW

L'interface graphique ASCP/SVIEW fait partie du package AABS (Assignment and Analysis of Broadband Spectra) conçu par Z. Kisiel [96, 97] et est particulièrement bien adaptée à l'analyse de spectre de rotation pure. Elle permet des attributions raie par raie et peut être utilisée avec les fichiers d'entrée et de sortie du programme d'ajustement et de prédiction SPFIT/SPCAT (voir section 1.8.3). Comme présenté dans la figure 1.11, deux fenêtres synchronisées en fréquence permettent de comparer le spectre calculé (en haut) et le spectre expérimental (en bas). Différentes options permettent d'optimiser la prédiction du spectre bâtons en y ajoutant le profil de raie (Gaussienne ou Lorentzienne), en choisissant la largeur de raie, le pas en fréquence et en dérivant le profil de raie pour simuler la modulation de fréquence 1F ou 2F du profil de raie. Une autre interface est possible dans ce programme en




FIGURE 1.11 – Interface graphique de ACSP/SVIEW pour le 2-Nitrotoluène enregistré en modulation 2F dans la région 181950-182350 MHz.

utilisant les diagrammes de Loomis-Wood.

LWWa

Le programme LWWa (asymmetric Loomis-Wood for Windows) développé en 2005 par W. Lodyga, P. Pracna et M. Kregleski [98] est spécialement conçu pour l'attribution de spectres de rovibration de toupies asymétriques par analyse de combinaison de fréquences en utilisant les diagrammes de Loomis-Wood [74]. Comme ASCP/SVIEW, LWWa utilise les fichiers d'entrée et de sortie du programme d'ajustement et de prédiction SPFIT/SPCAT (voir section 1.8.3). Un diagramme de Loomis-Wood permet une comparaison directe entre le spectre expérimental et les transitions calculées d'une branche $\Delta K_a \Delta J(K'_a)$ (pour une toupie prolata) ou $\Delta K_c \Delta J(K'_c)$ (pour une toupie oblate), où ΔJ , ΔK_a , ΔK_c sont fixes et pour une valeur de K_a (pour une toupie prolata) ou K_c (pour une toupie oblate) donnée (voir figure 1.12). Le nombre de diagrammes de Loomis-Wood à attribuer est donc fixé par les règles de sélection et par le choix de J_{max} et $K_{a\ max}$. Dans un premier temps le spectre expérimental est




FIGURE 1.12 – Diagramme de Loomis-Wood pour la branche ${}^qR(1)$ de bande ν_5 de ${}^{32}S^{16}O^{35}Cl_2$.

traité en pointant l'ensemble des raies moléculaires, dans mon cas j'ai utilisé le peakfinder du logiciel OPUS [99]. La liste de raies pointées est ensuite directement utilisée pour attribuer les raies dans les diagrammes de Loomis-Wood. Le calcul des fréquences de transitions se fait à partir des niveaux d'énergie de la molécule calculés par SPCAT (fichier ".egy"). La première étape consiste à générer les transitions d'une branche $\Delta K \Delta J(K')$ dont les transitions varient par unité de J'' . Les tables 1.6 et 1.7 permettent de construire les branches dans LWWa en indiquant les valeurs de ΔJ , $dK_{c,up}$, $dK_{c,down}$ et ΔK_a qui permettent de générer des branches

de transitions de type a, b ou c, pour une toupie proche prolata ($\kappa < 0$) ou proche oblate ($\kappa > 0$), respectivement. Dans le cas d'une toupie très asymétrique, il peut s'avérer nécessaire de calculer les branches en utilisant les deux approches de LWWa dédiées aux toupies proche oblates et proche prolates.

Chaque triangle correspond à une raie pointée du spectre expérimental et différentes options permettent d'ajuster leur taille et d'ajouter un seuil en intensité pour éliminer les raies trop faibles (ou trop intenses). Chaque ligne correspond à une portion du spectre centrée autour d'une transition calculée et représentée par la ligne verticale. Chaque transition d'une branche varie d'une ligne à l'autre par unité de J et leur valeurs croît de haut en bas. L'attributions des transitions d'une branche se fait alors directement sur le diagramme (triangles coloré) et les raies attribuées peuvent être exportées au format SPFIT (fichier ".lin"). L'analyse alterne donc entre les attributions avec LWWa et l'ajustement des constantes avec SPFIT/SPCAT jusqu'à obtenir un ensemble de triangles alignés parfaitement sur la ligne verticale centrale. L'utilisation du logiciel est détaillée en références [98, 100] et l'interface est présentée en figure 1.13.




FIGURE 1.13 – Interface graphique de LWWa pour la bande ν_5 du chlorure de thionyle (toupie asymétrique proche prolata) enregistrée dans l'infrarouge lointain sur la ligne AILES du synchrotron SOLEIL. Le diagramme de Loomis-Wood sélectionné correspond à une branche ${}^qP(4)$.

Cette approche permet d'identifier rapidement les séries en J'' associées à une même valeur de K et le cas échéant à mettre en lumière des interactions (résonances). Enfin, le programme a été conçu pour l'analyse de spectres rovibrationnels mais il est adaptable aux spectres de rotation pur en générant le fichier ".egy" de SPCAT en MHz au lieu des cm^{-1} .

TABLE 1.6 – Ensemble des valeurs de $dK_{c,up}$, $dK_{c,down}$, ΔK_a et ΔJ possibles et le type de transition a, b ou c associé dans le cas d'une toupie asymétrique proche prolate. $dK_c = 0$ correspond à $K_c = J - K_a$ et $dK_c = 1$ à $K_c = J - K_a + 1$. Chaque association peut-être utilisée pour générer un diagramme de Loomis-Wood pour une valeur de K_a donnée. Certaines associations mènent à la règle de sélection interdite ΔK_a et ΔK_c pairs (“interdite”).

input				conséquences	
ΔJ	$dK_{c,up}$	$dK_{c,down}$	ΔK_a	ΔK_c	type de transition
-1	0	0	-1	0	c
-1	0	0	0	-1	a
-1	0	0	1	-2	c
-1	0	1	-1	-1	b
-1	0	1	0	-2	interdite
-1	0	1	1	-3	b
-1	1	0	-1	1	b*
-1	1	0	0	0	interdite
-1	1	0	1	-1	b*
-1	1	1	-1	0	c
-1	1	1	0	-1	a
-1	1	1	1	-2	c
0	0	0	-1	1	b
0	0	0	0	0	interdit
0	0	0	1	-1	b
0	0	1	-1	0	c
0	0	1	0	-1	a
0	0	1	1	-2	c
0	1	0	-1	2	c
0	1	0	0	1	a
0	1	0	1	0	c
0	1	1	-1	1	b
0	1	1	0	0	interdite
0	1	1	1	-1	b
1	0	0	-1	2	c
1	0	0	0	1	a
1	0	0	1	0	c
1	0	1	-1	1	b*
1	0	1	0	0	interdite
1	0	1	1	-1	b*
1	1	0	-1	3	b
1	1	0	0	2	interdite
1	1	0	1	1	b
1	1	1	-1	2	c
1	1	1	0	1	a
1	1	1	1	0	c

* n'est pas indiquée comme parmi les raies plus intenses d'après [20] (p. 100).

TABLE 1.7 – Ensemble des valeurs de $dK_{a,up}$, $dK_{a,down}$, ΔK_c et ΔJ possibles et le type de transition a, b ou c associé dans le cas d'une toupie asymétrique proche oblate. $dK_a = 0$ correspond à $K_a = J - K_c$ et $dK_a = 1$ à $K_a = J - K_c + 1$. Chaque association peut-être utilisée pour générer un diagramme de Loomis-Wood pour une valeur de K_c donnée. Certaines associations mènent à la règle de sélection interdite ΔK_a et ΔK_c pairs (“interdite”).

ΔJ	input			conséquences	
	$dK_{a,up}$	$dK_{a,down}$	ΔK_c	ΔK_a	type de transition
-1	0	0	-1	0	a
-1	0	0	0	-1	c
-1	0	0	1	-2	a
-1	0	1	-1	-1	b
-1	0	1	0	-2	interdite
-1	0	1	1	-3	b
-1	1	0	-1	1	b*
-1	1	0	0	0	interdite
-1	1	0	1	-1	b*
-1	1	1	-1	0	a
-1	1	1	0	-1	c
-1	1	1	1	-2	a
0	0	0	-1	1	b
0	0	0	0	0	interdite
0	0	0	1	-1	b
0	0	1	-1	0	a
0	0	1	0	-1	c
0	0	1	1	-2	a
0	1	0	-1	2	a
0	1	0	0	1	c
0	1	0	1	0	a
0	1	1	-1	1	b
0	1	1	0	0	interdite
0	1	1	1	-1	b
1	0	0	-1	2	a
1	0	0	0	1	c
1	0	0	1	0	a
1	0	1	-1	1	b*
1	0	1	0	0	interdite
1	0	1	1	-1	b*
1	1	0	-1	3	b
1	1	0	0	2	interdite
1	1	0	1	1	b
1	1	1	-1	2	a
1	1	1	0	1	c
1	1	1	1	0	a

* n'est pas indiquée comme parmi les raies plus intenses d'après [20] (p. 100).

1.8.3 Ajustement du modèle théorique par la méthode des moindres carrés

Au cours de ma thèse, j'ai appris à maîtriser différents programmes permettant d'analyser et modéliser les spectres de rotation à partir de l'Hamiltonien. Ces programmes permettent d'une part de calculer les transitions entre niveaux d'énergie et de prédire un spectre à une température donnée, d'autre part ils permettent d'ajuster les constantes de l'Hamiltonien en minimisant la différence de fréquence entre les transitions calculées et expérimentales attribuées par la méthode, simple mais efficace, des moindres carrés. J'ai notamment pu apprendre et approfondir l'utilisation des programmes dédiés au traitement de la rotation interne qui ont permis d'apporter des compétences nouvelles au laboratoire.

Critère d'ajustement par la méthode des moindres carrés

La méthode des moindres carrés est une méthode bien connue qui permet de résoudre des systèmes de N équations et n inconnues. Les N équations correspondent aux fréquences expérimentales solutions de l'Hamiltonien et les n inconnues aux constantes moléculaires. Dans l'analyse de spectre, on cherche à minimiser la moyenne quadratique $S(a_1, a_2, \dots, a_n)_i$ des différences entre les fréquences calculées $f(a_1, a_2, \dots, a_n)_i$ à partir de constantes moléculaires a_i et les fréquences expérimentales y_i , le tout pondéré par l'erreur expérimentale Δy_i de chaque raie attribuée tel que :

$$S(a_1, a_2, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^N \left(\frac{y_i - f(a_1, a_2, \dots, a_n)_i}{\Delta y_i} \right)^2 \quad (1.83)$$

Cette fonction possède plusieurs minima dont un minimum global. La déviation standard, ou écart type σ (RMS), permet de connaître la qualité de l'ajustement des paramètres a_n par la moyenne quadratique des différences $y_i - f(a_1, a_2, \dots, a_n)_i$ d'un ensemble N de raies :

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - f(a_1, a_2, \dots, a_n)_i)^2} \quad (1.84)$$

Cette grandeur peut être directement comparée à l'erreur expérimentale si l'ensemble des raies ont la même erreur expérimentale, ce qui n'est généralement pas le cas. On calculera donc la déviation standard adimensionnée σ_W (WRMS) en pondérant les différences $y_i - f(a_1, a_2, \dots, a_n)_i$ par l'erreur expérimentale Δy_i déterminée à partir de l'enregistrement du

spectre (voir chapitre 2) tel que :

$$\sigma_W = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{y_i - f(a_1, a_2, \dots, a_n)_i}{\Delta y_i} \right)^2} \quad (1.85)$$

La déviation est inversement proportionnelle à \sqrt{N} et à Δy_i^2 , il vaut mieux donc avoir peu de raies très précises que beaucoup de raies imprécises. Si σ_W est égale à 1, l'ajustement des données est à la précision expérimentale. Si $\sigma_W < 1$, les erreurs expérimentales sont sur-estimées par rapport à σ . Enfin, dans le cas où $\sigma_W > 1$, soit l'erreur expérimentale est sous-estimée, soit le travail d'analyse est incomplet et certaines attributions sont à revoir ou certains paramètres doivent être ajustés ou ajoutés. On utilise généralement l'erreur standard 1σ de l'inégalité de Chebyshev correspondant à une tolérance de 100% sur les écarts en fréquence des transition par rapport à σ .

On calculera également la déviation standard σ_i sur le i^{eme} paramètre qui permet de savoir si les paramètres issus de l'analyse sont déterminés. Un paramètre est déterminé statistiquement si la valeur du paramètre est supérieur à sa déviation standard d'au moins un ordre de grandeur.

SPFIT/SPCAT

Les programmes SPFIT et SPCAT ont été développés par H. Pickett [101]. Ils permettent de traiter l'Hamiltonien du rotateur semi-rigide jusqu'à l'ordre dix. Un certain nombre d'interactions peuvent être traitées, dont la structure hyperfine et la rotation interne. De nombreuses ressources en ligne permettent d'écrire les fichiers d'entrée des programmes [102]. SPCAT permet de générer la liste de transitions moléculaires (fichier ".cat") à partir des paramètres de l'Hamiltonien (fichier ".var"), des projections du moment dipolaire (permanent ou de transition) et de la température (fichier ".int"). Il permet aussi de générer un fichier contenant les niveaux d'énergie théoriques de la molécule (fichier ".egy"). L'utilisation du programme SPCAT est schématisée dans la figure 1.14. SPFIT permet d'ajuster les pa-




FIGURE 1.14 – Fonctionnement de SPCAT.

ramètres moléculaires (fichier ".par" contenant les mêmes paramètres que le fichier ".var")

à partir des raies attribuées expérimentalement (fichier “.lin”) par la méthode des moindres carrés (fichier “.fit”). Les paramètres ajustés à la fin du processus d’optimisation sont automatiquement remplacés dans les fichiers “.var” et “.par”. L’utilisation du programme SPFIT est schématisée dans la figure 1.15.




FIGURE 1.15 – Fonctionnement de SPFIT

Différentes approches permettent également de traiter la rotation interne dans le cas d’un potentiel triplement dégénéré V_3 . Trois méthodes sont présentées mais aucune ne permet de traiter une barrière de rotation interne basse pour de haute valeur de J :

Méthode 1 : la première méthode utilise le système d’axes IAM [103]. Le fichier de paramètres de SPFIT est codé à partir de deux programmes, MOIAM (fichier d’entrée “.inp”) et IAMCALC (fichier d’entrée “.iam”), qui permettent de générer un fichier “.par” contenant un ensemble complet de paramètres de rotation-torsion liés, dont V_3 et F . Néanmoins, le paramètre ρ ne peut pas être ajusté car l’opérateur de rotation interne est défini tel que $\hat{\mathbf{J}}_\alpha - \rho \hat{\mathbf{J}}_a$ au lieu de $\hat{\mathbf{J}}_\alpha$, il faut donc utiliser un autre programme pour ajuster sa valeur. Cette méthode semble performante pour traiter une barrière relativement basse de $65.3560(22)\text{cm}^{-1}$ [104] mais pour de faibles valeurs de J uniquement ($J''_{max} = 9$). [105]. La documentation directe des programmes se limite à celle des codes source moiam.c et iamcalc.c mais il existe un certain nombre de modèles sur la base de donnée du JPL qui servent d’exemples pratiques et qui donnent une courte description de IAMCALC (Acetaldehyde, Methyl Formate et Methyl Carbamate) [106].

Méthode 2 : la deuxième méthode est expliquée dans la référence [107] et consiste à traiter la rotation interne avec un Hamiltonien phénoménologique dans le système d’axes RAM. Les solutions dans le système RAM sont périodiques et permettent des couplages de type Coriolis entre les états E. Les états A et E sont définis séparément et reliés par des perturbations périodiques qui sont bien approximées en tant que série de Fourier. Cette approche est limitée au cas de barrières hautes car les couplages sont mal reproduits si la barrière de rotation interne est trop basse. Cette méthode n’est pas pratique car le paramètre ρ doit également être inclus dans le modèle et ajusté à l’aide d’un autre programme et car la hauteur de la barrière V_3 n’est pas directement ajustée.

Méthode 3 : la troisième méthode consiste à traiter chaque état A et E de chaque état de torsion dans le système PAM avec un Hamiltonien phénoménologique en utilisant des

approximations de perturbation décrites en section 1.6.2). L'approximation des états E peut-être suffisante avec des termes du type D_g (voir équation 1.44) mais ne fonctionne que dans des cas spécifiques comme l'acide pyruvique[47, 48] et à de faibles valeurs de J .

XIAM

Le programme XIAM a été développé par H. Hartwig et déposé par H. Maeder [108] du groupe de recherche de Kiel en Allemagne pour traiter les effets de rotation interne d'une toupie asymétrique en utilisant le système d'axes IAM (voir équation 1.63). Il utilise des transformations de base et une factorisation matricielle adaptées permettant d'ajuster les constantes très rapidement. Il permet de traiter jusqu'à trois rotateurs internes, le couplage faible avec un moment nucléaire quadrupolaire, les constantes de distorsion centrifuge purement rotationnelles jusqu'à l'ordre six et les constantes de distorsion centrifuge de couplage entre la rotation globale et interne jusqu'à l'ordre quatre. Il est également possible de traiter le couplage entre plusieurs rotateurs internes pour l'analyse des états excités de la rotation interne. Néanmoins, dans le cas d'une barrière de rotation interne basse ou de nombres quantiques J ou K_a élevés, les transitions de type E ne sont pas correctement prédites. Les constantes et leur significations sont présentées en références [109].

BELGI-C_s-hyperfine

Le code BELGI-C_s-hyperfine est une version légèrement modifiée du code BELGI-C₁-hyperfine permettant de traiter les effets de rotation interne avec la structure hyperfine pour les molécules avec un plan de symétrie [46, 110] permettant de traiter les effets de rotation interne et de couplage nucléaire quadrupolaire. Ce programme utilise le système d'axes RAM et est adapté aux molécules appartenant au groupe de permutation inversion G₆ isomorphe à C_{3v}, ce qui est le cas des nitrotoluènes dont les atomes (hors mis ceux du rotateur interne) sont dans le plan de symétrie C_s avec un rotateur interne de symétrie C_{3v}. La version BELGI-C₁ est une autre version permettant de traiter les molécules de symétrie C₁ contenant un rotateur interne de symétrie C_{3v}. Financé par le réseau SPECMO du CNRS pour une durée de 3 semaines au laboratoire LISA de l'Université Paris-Est Créteil, j'ai pu apprendre à utiliser BELGI-C_s en collaboration avec I. Kleiner. Ce programme est particulièrement bien adapté au traitement de la rotation interne dans le cas d'une barrière basse. Le couplage hyperfin se limite pour l'instant au cas du spin nucléaire de l'azote (I=1), ce qui est le cas des nitrotoluènes. Il présente également l'avantage d'ajuster simultanément des transitions A et E de jusqu'à 9 états de torsion, produisant un ensemble unique de constantes de rotation. C'est un programme particulièrement bien adapté à l'analyse de spectres millimétriques enregistrés

à température ambiante car il permet d'ajuster ou calculer jusqu'à 80 000 transitions pour $J_{max} = 79$ en ajustant jusqu'à 80 paramètres pour chaque états de vibration (2 états de vibration possibles). L'ensemble des paramètres moléculaires implémentés dans BELGI-C_s-hyperfine sont présentés dans la table 1.8.

TABLE 1.8 – Paramètres moléculaires implémentés dans BELGI-C_s-hyperfine pour traiter le couplage de torsion-rotation dans le système RAM d'une toupie asymétrique appartenant au groupe de permutation inversion G₆ isomophe à C_{3v} [46]. La liste non exhaustive des paramètres est donnée jusqu'à l'ordre 4 : les paramètres en noir sont liés à la rotation de la molécule, ceux en rouge sont liés à l'interaction nucléaire quadrupolaire, ceux en bleu à l'étude de la rotation interne dans l'état fondamental et ceux en magenta sont à considérer dans l'étude de la rotation interne dans les états excités de torsion ($v_t \geq 1$).

Operateurs	1	$1 - \cos(3\alpha)$	\hat{J}_α^2	$\hat{J}_a \hat{J}_\alpha$	$1 - \cos(6\alpha)$	\hat{J}_α^4	$\hat{J}_a \hat{J}_\alpha^3$
1		$V_3/2$	F	ρ	$V_6/2$	k_4	k_3
\hat{J}^2	$(B + C)/2$	F_v	G_v	L_v	N_v	M_v	k_{3J}
\hat{J}_a^2	$A - (B + C)/2$	k_5	k_2	k_1	K_2	K_1	k_{3K}
$\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2$	$(B - C)/2$	c_2	c_1	c_4	c_{11}	c_3	c_{12}
$\hat{J}_a \hat{J}_b + \hat{J}_b \hat{J}_a$	D_{ab}	d_{ab}	Δ_{ab}	δ_{ab}	d_{ab6}	$\Delta \Delta_{ab}$	$\delta \delta_{ab}$
\hat{J}^4	Δ_J	f_v	g_v	l_v	n_v	m_v	o_v
$\hat{J}^2 \hat{J}_a^2$	Δ_{JK}	ϕ_v	λ_v	λ_v	v_v	μ_v	θ_v
\hat{J}_a^4	Δ_K	f_k	g_k	l_k	n_k	m_k	o_k
$-2\hat{J}^2(\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2)$	δ_J	c_6	c_5	c_7			
$-\{\hat{J}_a^2, (\hat{J}_b^2 - \hat{J}_c^2)\}$	δ_K	c_9	c_8	c_{10}			
$2\hat{J}_a^2 \left(\frac{f(I,J,F)}{J(J+1)}\right)$	χ_{aa}						
$2\hat{J}_b^2 \left(\frac{f(I,J,F)}{J(J+1)}\right)$	χ_{bb}						
$2\hat{J}_c^2 \left(\frac{f(I,J,F)}{J(J+1)}\right)$	χ_{cc}						
$2(\hat{J}_a \hat{J}_b + \hat{J}_b \hat{J}_a) \left(\frac{f(I,J,F)}{J(J+1)}\right)$	χ_{ab}						
$2(\hat{J}_a \hat{J}_c + \hat{J}_c \hat{J}_a) \left(\frac{f(I,J,F)}{J(J+1)}\right)$	χ_{ac}						
$2(\hat{J}_b \hat{J}_c + \hat{J}_c \hat{J}_b) \left(\frac{f(I,J,F)}{J(J+1)}\right)$	χ_{bc}						

J'ai également programmé un code en fortran90 qui permet de convertir les fichiers d'entrée et de sortie de BELGI au format SPFIT/SPCAT afin de rendre possible l'utilisation des interfaces graphiques ASCP/SVIEW et LWWa avec BELGI. Ce code est mis à disposition des autres spectroscopistes.

RAM36

Le programme RAM36 (Rho Axis Method for 3 and 6 fold barriers) développé par V. V. Ilyushin [111] de Kharkov (Ukraine) a été écrit sur le modèle de BELGI en collaboration avec Dr. J.T. Hougen du NIST à Gaithersburg (USA) et présente une rapidité d'ajustement bien plus importante. En utilisant le même modèle que BELGI- C_s , il permet de traiter les molécules de symétrie C_s possédant un rotateur interne de symétrie C_{3v} (barrière V_3) et a été conçu pour traiter les molécules C_{2v} possédant un rotateur interne de symétrie C_{3v} comme le toluène [111, 112] et le nitrométhane [113] (barrière V_6). Il permet d'inclure des termes de rotation-torsion jusqu'à l'ordre 12 dans l'ajustement et d'ajuster des transitions jusqu'à $J_{max} = 100$. Comme pour BELGI- C_s , les transitions des états A et E appartenant à plusieurs états de torsion sont ajustées simultanément produisant un ensemble unique de constantes de rotation. L'ensemble des paramètres moléculaires et leur codage dans RAM36 sont présentés dans la table 1.8 de la référence [114].

Comparaison des programmes traitant de la rotation interne

Enfin, la comparaison entre les propriétés des différents programmes de rotation interne utilisés pour la thèse et leur applicabilité sont présentées en table 1.9. Le choix du programme diffère pour chaque isomère du nitrotoluène. Concernant le 3-Nitrotoluène, l'étude d'une molécule C_s avec un rotateur interne C_{3v} à trois positions équivalentes avec une barrière de rotation interne basse a été possible à l'aide de BELGI. Pour l'étude du 2-Nitrotoluène, l'utilisation de XIAM est adaptée au traitement d'une molécule C_1 (NO_2 est hors plan) avec un rotateur interne C_{3v} à trois positions équivalentes et au traitement d'une barrière de rotation interne de hauteur moyenne. Enfin, le traitement du 4-Nitrotoluène est possible à l'aide de RAM36 car cette molécule est de symétrie C_{2v} avec un rotateur interne C_{3v} à six positions équivalentes et car le modèle théorique permet de traiter une barrière de rotation interne basse.

TABLE 1.9 – Comparaison des programmes traitant de la rotation interne en terme d'applicabilité.

	XIAM	BELGI	RAM36
Références	[108]	[46, 115, 110]	[111, 113]
Type de rotation interne	Rotateur interne à N positions équivalentes pour une toupie asymétrique.	Rotateur interne à trois positions équivalente de symétrie C_{3v} pour une toupie asymétrique C_s ou C_1	Rotateur interne à six positions équivalente de symétrie C_{3v} pour une toupie asymétrique C_{2v} ou Rotateur interne à trois positions équivalente de symétrie C_{3v} pour une toupie asymétrique C_s
Système d'axes	IAM	RAM	RAM
J_{\max}	70	79	100
hauteur de la barrière de rotation interne	moyenne à haute ($\geq 500 \text{ cm}^{-1}$)	faible à haute	faible à haute
Ordre de la distorsion centrifuge	6	8	8
Ordre du couplage avec la rotation interne	4	8	8
Couplage nucléaire quadrupolaire	un noyau de spin I	un noyau de spin $I = 1$ uniquement, pour la version BELGI – C_s – hyperfine	un noyau de spin I
Application dans la thèse	2-Nitrotoluène (molécule C_1 où NO_2 est hors plan avec un rotateur interne C_{3v} à trois positions équivalentes, barrière moyenne)	3-Nitrotoluène (molécule C_s avec un rotateur interne C_{3v} à trois positions équivalentes, barrière basse)	4-Nitrotoluène (molécule C_{2v} avec un rotateur interne C_{3v} à six positions équivalentes, barrière basse)

1.8.4 Ajustement semi-automatique du modèle théorique avec les algorithmes évolutionnaires

La méthode d'attribution raie par raie est généralement efficace mais souvent très longue et prend parfois plusieurs mois. Je me suis donc intéressé à une approche quasi-automatique d'analyse basée sur les algorithmes évolutionnaires (AEs) dans le cadre d'une collaboration avec W. Leo Meerts de l'Université de Nimègue et financé par la bourse d'excellence EOLE du réseau franco-néerlandais (session printemps 2015). Depuis le début des années 2000, W. L. Meerts de l'Université Radboud à Nimègue aux Pays-Bas et M. Schmitt de l'Université de Düsseldorf en Allemagne ont développé le programme *ga* utilisant les AEs dans le but d'automatiser et remplacer l'analyse raie par raie [5, 6, 7, 8]. Bien que leur programme soit très abouti, ils ne sont cependant pas les seuls à proposer ce type d'approche, D. Plusquellic du NIST à Boulder aux Etats-Unis a également créé le programme *jb95* en 2002 qui n'est pas autant élaboré, et C. Western de l'Université de Bristol au Royaume-Uni a tout récemment conçu *AUTOFIT* [116], un programme d'analyse automatique utilisant *PGOPHER*.

Les AEs présentent de nombreux avantages. Premièrement, il n'est plus nécessaire d'avoir une estimation des paramètres spectroscopiques la plus précise possible pour démarrer l'analyse, mais seulement un intervalle dans lequel trouver ces valeurs. Deuxièmement, le processus d'ajustement est quasi-automatique, contrairement à la méthode traditionnelle employée par les spectroscopistes dans laquelle il est nécessaire de réfléchir au choix des attributions et des paramètres à ajuster. Troisièmement, l'attribution des raies est une simple conséquence de l'ajustement du spectre synthétique sur le spectre expérimental. Une fois les paramètres spectroscopiques déterminés, le modèle de l'Hamiltonien permet une attribution rapide des raies. Enfin, les AEs sont intrinsèquement parallèles et permettent donc d'exploiter facilement et efficacement les processeurs multi-coeurs d'aujourd'hui.

A la différence de l'approche raie par raie, le programme *ga* permet de comparer directement les spectres expérimental et théorique issu d'un Hamiltonien modèle et de quelques paramètres ajustables. Une fonction de coût est définie pour quantifier la qualité de cette comparaison et l'emploi d'algorithmes évolutionnaires permet d'ajuster les valeurs des paramètres spectroscopiques afin de faire correspondre le spectre théorique au spectre expérimental [5]. Il faut souligner que les AEs ne sont pas une méthode de type boîte noire. En effet les paramètres internes à l'AE doivent être eux-mêmes optimisés, on parle de méta-optimisation. Il s'avère toutefois que ces paramètres ont été optimisés dans des tests préliminaires du programme et restent efficaces pour une large palette de spectres [6, 7, 8].

Principe général des AEs

Parmi les techniques d'optimisation globale, nous avons choisi les AEs basés sur des concepts copiés de la théorie de l'évolution : une population évolue de génération en génération pour devenir plus adaptée aux contraintes environnementales. Les chromosomes, caractérisés par leurs gènes, suivent des processus de sélection et croisement au fil des générations selon le principe du survivant le plus adapté, et on observe parfois des mutations. Bien que réducteurs du point de vue du biologiste, ils fournissent des mécanismes de recherche adaptatifs, robustes et puissants. Ces algorithmes sont particulièrement performants pour l'optimisation sur un grand nombre de transitions.

Chaque constante moléculaire est représentée par un gène et un ensemble de constantes moléculaires (les constantes rotationnelles, les centres de bandes et les constantes de distorsion centrifuge) constitue un chromosome. À partir de chaque chromosome peut être calculé un spectre théorique \mathbf{g} et l'ensemble des chromosomes représente la population totale N . Le calcul de l'intensité des transitions dépend de la température, des angles azimutal θ et polaire ϕ permettant de définir l'orientation du moment dipolaire (voir équations 1.86, 1.87 et 1.88) et des pleines largeurs de raies Doppler et Lorentzienne. Ces paramètres sont définis et maintenus fixes dans notre étude mais peuvent éventuellement être libérés parmi les gènes.

$$\mu_a = \mu \sin\phi \cos\theta \quad (1.86)$$

$$\mu_b = \mu \sin\phi \sin\theta \quad (1.87)$$

$$\mu_c = \mu \cos\phi \quad (1.88)$$

Dans un premier temps, les constantes moléculaires de chaque chromosome sont générées de façon aléatoire dans un intervalle de valeur choisi afin de constituer la population initiale généralement fixée entre 200 et 500 chromosomes. Ensuite, les constantes sont ajustées dans une phase d'optimisation en utilisant des concepts dérivés de la génétique comme la sélection, le croisement ou la mutation. Pour une génération donnée, une fonction de fitness $F_{(\mathbf{f}, \mathbf{g})}$ est calculée pour chaque chromosome afin d'identifier les chromosomes donnant les meilleurs résultats. La fonction de fitness $F_{(\mathbf{f}, \mathbf{g})}$ s'écrit comme le produit scalaire normalisé entre le spectre calculé $\mathbf{g} = (g_1, g_2, \dots, g_N)^T$ et le spectre expérimental $\mathbf{f} = (f_1, f_2, \dots, f_N)^T$ ayant le même nombre de points N :

$$F_{(\mathbf{f}, \mathbf{g})} = \frac{(\mathbf{f}, \mathbf{g})}{\sqrt{(\mathbf{f}, \mathbf{f})(\mathbf{g}, \mathbf{g})}}, \quad (1.89)$$

avec le produit scalaire :

$$(\mathbf{f}, \mathbf{g}) = \sum_{i,j}^N f_i W_{i,j} g_j. \quad (1.90)$$

$W_{i,j} = w(|j - i|)$ sont les éléments de matrice de la fonction de poids W et f_i et g_i sont les intensités des spectres expérimental et calculé à la fréquence ν_i . La fonction de poids W permet de donner plus de flexibilité dans la comparaison entre le spectre calculé et expérimental en permettant de ne pas comparer seulement les deux spectres point à point, mais aussi avec les points proches en fréquence avec un poids décroissant avec la distance. Cette fonction peut être de type Gaussienne, Lorentzienne, bloc ou triangle. La fonction triangle est utilisée par défaut :

$$w(|j - i|) = \begin{cases} 1 - \frac{2|j - i|}{\Delta w} & \text{pour } |j - i| \leq \frac{1}{2}\Delta w \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \quad (1.91)$$

où Δw est la largeur de base de la fonction triangle. La fonction de coût $C_{(\mathbf{f},\mathbf{g})}$ est reliée à la fonction de fitness $F_{(\mathbf{f},\mathbf{g})}$ par l'équation :

$$C_{(\mathbf{f},\mathbf{g})} = 100(1 - F_{(\mathbf{f},\mathbf{g})}), \quad (1.92)$$

Si les deux fonctions \mathbf{f} et \mathbf{g} sont identiques, alors la fonction de fitness $F_{(\mathbf{f},\mathbf{g})} = 1$ et la fonction de coût $C_{(\mathbf{f},\mathbf{g})}$ est nulle. Maximiser l'accord entre le spectre calculé et le spectre expérimental revient donc à maximiser la fonction de fitness $F_{(\mathbf{f},\mathbf{g})}$ et donc à minimiser la fonction de coût $C_{(\mathbf{f},\mathbf{g})}$ dont le minimum global correspond au meilleur ensemble de paramètres.

Le processus d'optimisation est réalisé grâce à l'un des trois algorithmes proposés : l'algorithme génétique, le derandomized-ES DR2 [117] et le CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy) [118]. L'algorithme derandomized-ES DR2 peut être utilisé dans un premier temps pour extraire une première estimation des paramètres moléculaires pour une optimisation globale. CMA-ES, qui est le plus récent (2009), est efficace aussi bien en optimisation globale qu'en optimisation locale plus précise [119, 120]. Les algorithmes génétiques de base sont inefficaces car ils échantillonnent l'espace des paramètres de façon aléatoire alors que la méthode CMA-ES utilise les informations fournies par l'évaluation de la fonction de coût pour que les chromosomes se déplacent plus rapidement dans les directions où la fonction de coût diminue.

Dans le processus d'optimisation, les fonctions de coût les plus basses permettent de conserver les meilleurs chromosomes pour la génération suivante (élitisme) ou de les sélectionner pour former de nouveaux chromosomes en croisant leurs gènes (sélection et croisement). Les

chromosomes ont également une probabilité de subir une mutation pour explorer l'hyper-surface de coût, éviter les minima locaux et améliorer la convergence. La performance de l'algorithme peut donc être modifiée en ajustant le taux de mutation, le taux d'élitisme, la probabilité de croisement, la taille de la population et le nombre de générations. Le processus se répète à chaque génération jusqu'à atteindre la limite généralement fixée à 300 générations. La figure 1.16 résume les étapes de l'AE dans le programme ga.




FIGURE 1.16 – Étapes de l'AE dans le programme ga

Il existe également une extension ga-mr du programme ga qui permet de diviser l'intervalle d'un des paramètres moléculaire en plusieurs sous-intervalles et d'exécuter ga pour chacun d'entre eux. Cela permet d'une part de faciliter la convergence en réduisant la largeur d'un intervalle et d'autre part, de pouvoir comparer plusieurs optimisations pour identifier la meilleure solution. En effet, la division en sous-intervalles permet de réduire la taille de l'hyper-surface de la fonction de coût en comparaison avec un seul grand intervalle. Les calculs ont été réalisés au départ sur le serveur de calcul de l'Université de Nimègue aux Pays-Bas et j'ai ensuite participé à la mise en place du programme sur le serveur CALCULCO de l'Université du Littoral Côte d'Opale.

Paramètres internes de l'AE

L'optimisation des paramètres internes à l'AE est discutée dans le manuel du programme *ga* et dans la référence [121]. Les méthodes et leurs paramètres sont fixés par défaut dans le programme *ga* mais peuvent être modifiés si nécessaire. La vitesse et la convergence du programme dépendent principalement du type de sélection et de croisement (à un point, à deux points, uniforme), de la taille de la population de départ, du taux d'élitisme et de la probabilité de mutation. Le temps de calcul est aussi très dépendant de la taille du spectre étudié (nombre de points).

- **Population initiale** : la population totale ne devrait pas excéder 300 pour éviter des calculs trop longs qui ne seraient pas compensés par une amélioration significative de la convergence.
- **Sélection et croisement** : la sélection des meilleures solutions est faite selon un tournoi. Des sous-ensembles aléatoires de chromosomes sont sélectionnés parmi la population, puis des paires de chromosomes sont sélectionnées pour le croisement dans chaque sous-ensemble selon leur fonction de coût. Les doublons dans une génération sont autorisés. Par défaut, la probabilité de croisement est de 85% en utilisant la méthode de croisement à deux points qui a été évaluée comme étant la plus efficace. Cette méthode consiste à utiliser une partie des paramètres des deux chromosomes sélectionnés pour générer de nouveaux chromosome, chaque partie est délimitée par deux points dont la position est aléatoire (voir figure 1.17).
- **Mutation** : elle consiste à modifier aléatoirement la valeur d'un paramètre pour permettre une exploration de la surface de coût et éviter à l'algorithme de converger prématurément vers un minimum local, une valeur de 1% est conseillée (voir figure 1.17).
- **Élitisme** : les meilleurs chromosomes sont conservés pour la génération suivante, le pourcentage d'élitisme par défaut est de 50%. Un pourcentage de 30% donne de meilleurs résultats mais présente un coût plus important en temps de calcul.

Ces valeurs conseillées sont le résultat de la méta-optimisation détaillée en référence [6]. L'algorithme génétique a été utilisé sur un spectre synthétique généré à $T=2K$ à partir des constantes suivantes : $A'' = 3000$ MHz, $B'' = 1000$ MHz, $C'' = 800$ MHz, $A' = 3100$ MHz, $B' = 1050$ MHz, $C' = 850$ MHz, $\nu_0 = 80000$ MHz, $\theta = 54.74$ deg et $\phi = 45$ deg. L'ensemble de ces neuf paramètres ont été libérés.

La figure 1.18 présente l'évolution de la fonction de coût pour neuf combinaisons différentes de taux d'élitisme, taux de mutation et populations. Cinq ajustements ont été réalisés dans chaque configuration. La première ligne de la figure 1.18 correspond à une variation de la




FIGURE 1.17 – Croisement à deux points entre deux chromosomes composés de huit gènes menant à deux nouveaux chromosomes. La mutation intervient aléatoirement (bleu).

taille de la population pour un élitisme de 50% et une probabilité de mutation de 0.05. La meilleure fonction de coût finale est de 0.21 pour $N = 600$, contre 0.35 pour $N = 300$ et 0.30 pour $N = 450$. Néanmoins, cette meilleure performance est compensée par un coût en temps de calcul plus important. La deuxième ligne de la figure 1.18 correspond à une variation du taux d'élitisme de 30 à 70% pour une population $N = 300$ et un taux de mutation de 0.05. La fonction de coût finale moyenne est légèrement meilleure pour un élitisme de 30% mais plus le taux est faible, plus le temps de calcul est élevé. La troisième ligne de la figure 1.18 correspond à une variation de la probabilité de mutation pour une population de $N = 300$ et un élitisme de 50%. La fonction de coût moyenne obtenue est de 0.15 pour une probabilité de mutation de 1%, 0.35 pour 5% et 1.00 pour 10%. Bien qu'avec 1% on obtient de meilleurs résultats, il faut pas sous-estimer le risque de converger vers un minimum local en raison d'une mauvaise exploration de la surface de coût.

Modèle théorique

Le modèle de l'Hamiltonien implémenté dans le programme *ga* permet le traitement d'une toupie asymétrique avec un Hamiltonien de Watson en réduction A ou S. La réduction S a été récemment implémentée dans le programme *ga* dans le cadre d'une collaboration avec l'Université de Reims, Champagne Ardennes, où j'ai analysé une bande de rovibration de SO_2F_2 à l'aide de cette approche. Il permet également de traiter le couplage avec un ou deux rotateurs internes triplement dégénérés, mais ce traitement en PAM est perturbatif et limité aux termes D_g ($g=a,b,c$) décrits dans l'équation 1.44. Bien que le traitement de la rotation interne soit trop limité pour être appliqué à l'étude des nitrotoluènes, l'Hamiltonien de rotateur semi-rigide a été efficace pour traiter la rovibration des isotopologues de SOCl_2 (voir chapitre 3).




FIGURE 1.18 – Convergence de l’algorithme évolutionnaire pour un spectre synthétique en fonction de la taille de la population (p), de la probabilité de mutation (m) et du taux d’élitisme (e). L’ordonnée représente la fonction de coût du meilleur individu de la population (crédit : W. L. Meerts [6]).

Chapitre 2

Outils expérimentaux et méthodologie

Sommaire

2.1	Introduction générale	72
2.2	Spectroscopie à impulsions micro-ondes (SIMO) par transformée de Fourier	73
2.2.1	Processus d'émission moléculaire du SIMO	73
2.2.2	Amplification du signal	75
2.3	Spectroscopie millimétrique/submillimétrique	77
2.3.1	Spectromètre d'absorption millimétrique/submillimétrique à chaîne de multiplication de fréquence du LPCA	77
2.3.2	Comparaison AM/FM	85
2.3.3	Comparaison des configurations en simple et double passage	87
2.3.4	Précision expérimentale et rapport signal-sur-bruit (S/B)	88
2.3.5	Traitement des effets FP par filtre à transformée de Fourier	89
2.4	Spectromètre d'émission millimétrique à dérive de fréquence du LPCA	91
2.5	Spectroscopie dans l'infrarouge moyen et lointain (IRM/IRL)	92
2.5.1	Dispositif expérimental	93
2.5.2	Gain en rapport S/B pour une source synchrotron	95
2.5.3	Calibration des spectres	95
2.5.4	Jet-AILES	96

2.1 Introduction générale

La région THz se situe entre les régions micro-ondes et proche infrarouge (IR). (voir figure 2.1). Les transitions moléculaires purement rotationnelles sont étudiées des fréquences




FIGURE 2.1 – Spectre électromagnétique de la gamme micro-onde au visible. Différents types de transitions moléculaires sont attendues selon les fréquences sondées.

micro-ondes (quelques GHz) à la région millimétrique/submillimétrique à l'aide de sources électroniques, alors que les transitions rovibrationnelles sont étudiées dans l'infrarouge lointain et moyen (IRL et IRM) à l'aide de sources optiques. Des sources de rayonnement par conversions opto-électroniques sont également disponibles au LPCA pour étudier les transitions rotationnelles à J élevé de molécules légères ainsi que la rovibration de modes très basses fréquences [122, 123] dans la gamme THz.

Différentes unités sont utilisées, la fréquence ν (GHz) est utilisée en spectroscopie rotationnelle, le nombre d'onde $\bar{\nu}$ (cm^{-1}) est utilisé en spectroscopie rovibrationnelles et la longueur d'onde λ (nm) est utilisée en spectroscopie rovibrationnelle. La conversion est donnée par :

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \quad k = \frac{1}{\lambda} \quad (2.1)$$

et le passage des GHz aux cm^{-1} est donc donné par :

$$k(\text{cm}^{-1}) = \nu(\text{GHz})/29.9792458(\text{cm/ns}). \quad (2.2)$$

Les spectres millimétrique/submillimétriques ont été mesurés à température ambiante grâce à la chaîne de multiplication de fréquence du LPCA [124] et avec le spectromètre d'émission millimétrique à dérive de fréquence CP-FTmm (Chirped Pulse-Fourier Transform millimeter) du LPCA récemment développé [125]. Ces spectres présentent généralement des

transitions de rotation pure dans les états de torsion/vibration excités peuplés à température ambiante, il en résulte des spectres très denses et congestionnés. Bien que les calculs de chimie quantique soient de plus en plus performants, ils ne permettent pas toujours d'estimer les constantes rotationnelles avec suffisamment de précision pour démarrer l'analyse de ces spectres très denses, notamment pour les états excités qui requièrent des calculs anharmoniques. Il est alors nécessaire de réaliser des mesures à basse température rotationnelle et vibrationnelle pour mesurer les transitions à faibles valeurs de J et peupler au minimum les états vibrationnels excités. Pour cela, la technique FTMW associée aux jets moléculaires du spectromètre à impulsions microondes (SIMO) [126, 127] du laboratoire PhLAM de l'Université Lille Nord-de-France a été utilisée en collaboration avec M. Goubet, permettant ainsi de mesurer les spectres micro-onde et d'améliorer les paramètres du modèle théorique dans une phase préliminaire à l'analyse du spectre millimétrique à plus hautes valeurs de J . Enfin, les spectres de rotation-vibration ont été mesurés dans l'infrarouge lointain avec le spectromètre à transformée de Fourier haute résolution ($R_{\max} = 0.00102 \text{ cm}^{-1}$) de la ligne AILES du synchrotron SOLEIL en collaboration avec M. A. Martin-Drumel et O. Pirali.

2.2 Spectroscopie à impulsions micro-ondes (SIMO) par transformée de Fourier

Le spectromètre à impulsions micro-ondes (SIMO) du PhLAM (voir figure 2.2) permet d'enregistrer avec une excellente sensibilité et très haute résolution le spectre de rotation pure d'espèces en phase gazeuse refroidies par détente adiabatique (jet supersonique) dans la gamme 4-18 GHz [128, 129, 130].

2.2.1 Processus d'émission moléculaire du SIMO

Ce spectromètre est particulièrement efficace pour sonder les émissions moléculaires de rotation pure à de basses valeurs de J dans l'état fondamental de molécules dont le moment dipolaire permanent est supérieur à 0.1 Debye. Dans le cas d'échantillons liquides (ou solides), un injecteur chauffé permet de vaporiser l'échantillon et de le mélanger à un gaz porteur (hélium, argon ou néon). Plus le gaz porteur est léger, plus le jet supersonique est rapide et le refroidissement rotationnel par détente adiabatique efficace. Pour les molécules étudiées dans cette thèse, le meilleur compromis pour le choix du gaz porteur est le néon ($v=800\text{m/s}$) car le refroidissement est plus efficace que pour l'argon et car la cavité est trop courte (1200mm) pour utiliser efficacement l'hélium ($v=1700\text{m/s}$). La température de l'injecteur est généralement fixée entre 373 K et 393 K afin d'optimiser le rapport signal-sur-bruit




FIGURE 2.2 – Le spectromètre à impulsions micro-ondes (SIMO) du PhLAM.

(S/B) en fonction de l'amplitude de la transition mesurée.

Ainsi, le gaz composé de n_0 molécules est injecté en jet par détente adiabatique dans une cavité Fabry-Pérot résonante et quasi-confocale où leur dipôle permanent μ est initialement orienté de façon aléatoire. Une brève et intense impulsion micro-onde ($2\mu s$) d'amplitude E_0 et de pulsation ω_0 polarise n molécules du gaz moléculaire lorsque celle-ci est résonante avec une transition rotationnelle (voir figure 2.3). La population n , la polarisation macroscopique $P(t)$ et la fréquence Ω associées à l'excitation sont données par les équations suivantes [131, 132] :

$$n = n_0 \cos(\Omega t) \quad (2.3)$$

$$P(t) = -i\mu n_0 \sin(\Omega t) \quad (2.4)$$

$$\Omega = \frac{\mu E_0}{\hbar} \quad (2.5)$$

Comme le montre l'équation 2.4, la polarisation macroscopique du gaz est maximale si $\sin(\Omega t) = 1$, ce qui correspond à la condition $\pi/2$ [133].

Une fois le champ électromagnétique coupé, les dipôles tournent en phase autour de l'axe défini par le champ électrique E_0 de l'impulsion excitatrice à la fréquence de nutation Ω (fréquence de Rabi). La polarisation macroscopique $P(t)$ du gaz diminue exponentiellement, oscillant à la fréquence de résonance ω_0 du gaz : c'est la précession optique (voir équation 2.6).

$$P(t) = n_0 \mu e^{-\frac{t}{T_2}} \cos(\omega_0 t) \quad (2.6)$$

2.2. SPECTROSCOPIE À IMPULSIONS MICRO-ONDES (SIMO) PAR TRANSFORMÉE DE FOURIER

où T_2 correspond au temps de relaxation de la polarisation. La détection du champ électrique de pulsation ω_0 associé au signal d'émission moléculaire est proportionnelle à $P(t)$.

Les molécules émettent ainsi un signal cohérent transitoire dans le domaine temporel correspondant au signal de précession libre (Free Induction Decay, FID) à la fréquence de résonance ω_0 . La transformée de Fourier du signal FID temporel détecté permet d'obtenir le spectre d'émission dans le domaine fréquentiel. Le signal FID de chaque transition est enregistré et moyenné n fois pour optimiser le rapport signal-sur-bruit.




FIGURE 2.3 – Processus d'émission moléculaire du spectromètre à impulsions micro-ondes (SIMO) du PhLAM (crédit : M.-A. Martin-Drumel)

Enfin, l'acquisition des données se fait par une interface LABVIEW et le relevé de la fréquence centrale de chaque doublet Doppler se fait également à l'aide d'un programme LABVIEW du PhLAM.

2.2.2 Amplification du signal

La cavité Fabry-Pérot (FP) du SIMO est quasiment confocale et permet d'amplifier les signaux moléculaires (voir figure 2.4). L'impulsion micro-onde excitatrice est émise via une antenne filaire en forme de « L » et le signal d'émission moléculaire est détecté par cette même antenne. Le signal FID est enregistré avec une détection hétérodyne (fréquence intermédiaire de 30 MHz) et digitalisé avec un taux de répétition de 120 MHz avec une carte d'acquisition de résolution 14 bits.

Dans un premier temps, des mesures à basse résolution (quelques centaines de kHz) sont habituellement réalisées sur plusieurs GHz afin d'identifier les transitions les plus intenses et obtenir un premier ajustement du modèle théorique. Ces mesures sont relativement longues et nécessitent plusieurs jours d'acquisitions. Dans un second temps, les raies moléculaires identifiées sont ré-enregistrées à haute résolution en ajustant le mode de la cavité sur chaque fréquence de transition en moyennant autant de fois que le nécessite le rapport S/B. Les signaux FID sont ainsi accumulés entre 50 et 1000 fois selon l'intensité de la raie afin d'obtenir le meilleur rapport S/B d'une raie à sa résolution maximale (2 kHz). L'enregistrement d'une raie nécessite quelques minutes à une demi-heure d'acquisition. Enfin, après transformation de Fourier des signaux temporels moyennés, le spectre en fréquence présente des doublets Doppler en raison de l'alignement coaxial entre le jet unidirectionnel et la cavité Fabry-Pérot, chaque fréquence de transition est donc la moyenne des deux composantes Doppler observées. La résolution spectrale dépend de la fenêtre temporelle et donc du nombre de points enregistrés. Un exemple de spectre enregistré pour le 3-Nitrotoluènes est donné en




FIGURE 2.4 – Cavité Fabry-Pérot (FP) du spectromètre à impulsions micro-ondes (SIMO) du PhLAM (crédit : laboratoire PhLAM)

figure 2.5 où le doublet Doppler de trois transitions hyperfines est observé.




FIGURE 2.5 – Transitions hyperfines ($F' \leftarrow F''$) de la transition rotationnelle $7_{07} \rightarrow 6_{06}$ (espèce A) mesurée à l'aide du spectromètre à impulsions micro-ondes (SIMO) du PhLAM pour le 3-Nitrotoluène, 50 scans sont co-additionnés dans cet exemple.

2.3 Spectroscopie millimétrique/submillimétrique

La chaîne de multiplication de fréquence du LPCA est un instrument très bien adapté pour la mesure haute-résolution de spectres rotationnels d'espèces présentant une large densité de raies d'absorption à température ambiante. Elle permet des mesures de spectres d'absorption dans la région millimétrique/submillimétrique (70-900GHz) [124]. J'ai également eu l'opportunité d'utiliser le spectromètre d'émission à dérive de fréquence et à transformée de Fourier du LPCA qui permet une mesure large bande du spectre à température ambiante dans la région millimétrique (190-210 GHz) [125].

2.3.1 Spectromètre d'absorption millimétrique/submillimétrique à chaîne de multiplication de fréquence du LPCA

Le spectromètre d'absorption du LPCA est composé d'une source électronique, d'une cellule d'absorption couplée à un système de pompage et de plusieurs systèmes de détection (bolomètre, diodes schottky).

Source : La source de rayonnement est basée sur une technique de génération d’harmoniques pour couvrir entièrement la gamme comprise entre 70 GHz et 900 GHz à partir d’une source micro-onde oscillant dans la gamme 7.8-12.2 GHz. Une telle couverture spectrale nécessite plusieurs étages. Une antenne cornet adaptée à chaque bande spectrale permet le rayonnement efficace de l’onde proche d’un mode Gaussien. Le rayonnement produit est polarisé rectilignement. Selon les possibilités du synthétiseur, le rayonnement peut être modulé en amplitude, en fréquence (et même en phase). La précision en fréquence est apportée en référencant le synthétiseur sur un signal GPS. Le principe de cette technique repose sur l’utilisation de dispositifs non linéaires afin de générer des harmoniques d’une source millimétrique ou centimétrique relativement intense. Ainsi, les caractéristiques courant-tension de diodes Schottky permettent la production de ces harmoniques. Comme l’illustre la figure 2.6, les multiplicateurs permettent de multiplier la fréquence d’entrée micro-onde par 9, 18, 27, 36, 54 et 81 et de sonder six bandes de fréquences différentes : 70-110 GHz, 140-220 GHz, 210-330 GHz, 330-440 GHz, 440-660 GHz et 630-900 GHz.




FIGURE 2.6 – Chaîne de multiplication de fréquence du LPCA.

Cellule : Une cellule d’absorption en acier inoxydable de 125 cm de long et 50 mm de diamètre est équipée de fenêtres en Téflon. J’ai modifié la configuration initiale de simple à double passage à partir de la référence [134] afin de doubler la longueur d’interaction L et donc l’intensité du signal moléculaire. Pour le simple passage, deux miroirs paraboliques ou lentilles en Téflon permettent de collimater le rayonnement submillimétrique dans la cellule d’une part et de la refocaliser sur le détecteur d’autre part. Pour la configuration en double

passage, un miroir « rooftop » orienté à 45° permet de renvoyer le rayonnement dans la cellule et de tourner la polarisation de $\pi/2$ pour un deuxième passage. Une grille de polarisation à l'entrée de la cellule est orientée de façon à transmettre le signal pour le premier passage et le réfléchir vers le détecteur après le second passage (voir figure 2.7). Les deux configurations




FIGURE 2.7 – (a) spectromètre à chaîne de multiplication de fréquence du LPCA en double passage, (b) grille de polarisation et (c) miroir “rooftop” orienté à 45° .

sont présentées en détails dans la figure 2.8.

La cellule est connectée à un système de pompage constitué d'une pompe primaire à palette et d'une pompe turbo moléculaire. Le produit est contenu sous forme liquide ou solide dans un ballon connecté à la cellule et sondé sous forme gazeuse grâce à sa pression de vapeur saturante. Un piège cryogénique placé en sortie de la cellule permet de récupérer le produit injecté en phase gazeuse sur une paroi refroidie à l'Azote liquide afin qu'il ne se condense pas dans le système de pompage et le détériore. Le système de pompage permet d'atteindre un vide limite secondaire inférieur à $1 \mu\text{bar}$ ou de maintenir un flux continu de gaz à faible pression (quelques μbar).

Détection : Nous disposons de plusieurs solutions de détection. En particulier, une détection bolométrique (InSb) offre une très grande sensibilité mais nécessite un refroidissement à l'hélium liquide (4 K). On note qu'il est parfois plus commode d'exploiter une détection à température ambiante tel qu'un ensemble de diodes Schottky.

En effet, la diode Schottky est utilisée pour mesurer la bande 1 (70-110 GHz) car le rapport




FIGURE 2.8 – Configurations en (a) simple et (b) double passage du spectromètre submillimétrique du LPCA.

signal-sur-bruit (S/B) obtenu est équivalent en utilisant la diode ($NEP = 13.2 \text{ pW.Hz}^{-1/2}$) ou le bolomètre ($NEP = 2.8 \text{ pW.Hz}^{-1/2}$) (voir figure 2.9). Le laboratoire ne dispose pas de diode Schottky pour mesurer les bandes 2 et 3, le bolomètre est donc utilisé. Enfin, la détection bolométrique (InSb) est plus performante que les diodes pour les étages supérieurs, néanmoins, il n'a pas été nécessaire de mesurer les spectres au delà de la bande 3 pour étudier les molécules de ma thèse.




FIGURE 2.9 – Comparaison du spectre du 3-NT enregistré en modulation 2F avec le bolomètre InSb (4K) et la diode Schottky à 105 GHz. Les spectres présentés ont été enregistrés avec une constante de temps de 200 ms et traités par filtre à Transformée de Fourier pour éliminer la ligne de base (le traitement sera expliqué en section 2.3.5).

Le temps de réponse du détecteur est caractérisé par la constante de temps τ . La réponse du détecteur résulte de la convolution de la détection synchrone et du bolomètre (ou de la diode Schottky) et son évolution correspond à une équation différentielle du premier ordre. Le régime stationnaire est donc atteint à 98% pour un temps d'attente t_{dwell} de 4 fois la constante de temps τ du détecteur. La valeur de la constante de temps est un compromis entre le S/B pouvant permettre d'exploiter les données et le temps d'enregistrement. Une comparaison pour différentes constantes de temps est donnée en figure 2.10 pour le spectre du 3-NT où les intensités des raies sont particulièrement faibles. Enfin, l'acquisition des données se fait par une interface LABVIEW.




FIGURE 2.10 – Mesure du spectre du 3-NT avec le bolomètre InSb pour différentes constantes de temps $\tau = 0.05$, $\tau = 0.02$ et $\tau = 0.01$ s et un temps d'attente 4τ .

Spectroscopie à modulation de fréquence

La spectroscopie à modulation de fréquence associée à la détection de la seconde harmonique est souvent privilégiée, se révélant plus sensible que la modulation d'amplitude mais ne conserve pas la forme de raie originale, ce qui peut être problématique pour certaines applications. Cette technique permet en particulier de s'affranchir au moins en partie des effets de ligne de base parfois très important à ces fréquences et qui limitent la sensibilité d'une technique par modulation d'amplitude [124]. La vitesse de modulation doit être en accord avec les possibilités de la chaîne de détection. La profondeur de modulation est généralement ajustée à la pleine largeur à mi-hauteur des transitions moléculaires visées. Une détection synchrone permet d'amplifier, de filtrer et de démoduler le signal à diverses harmoniques.

Détection de la 2^{ème} harmonique Dans la limite des petites profondeurs de modulation $\delta\nu$ par rapport à la fréquence ν_s de la source, l'expression du signal d'absorption A_n décrit une dérivée n^{ème} du signal d'absorption. Les références [124], [135] et [136] permettent d'aboutir à ce résultat. Le profil de raie mesuré en modulation de fréquence 2F peut ainsi être approximé par la dérivée seconde du profil naturel de la raie [137]. La fréquence $\nu(t)$ est modulée au cours du temps par un signal sinusoïdal $\delta\nu \cos(\omega_m t)$:

$$\nu(t) = \nu_s + \delta\nu \cos(\omega_m t), \quad (2.7)$$

où $\delta\nu$ est la profondeur de modulation, ν_s la fréquence de la source et ω_m la fréquence de modulation. L'intensité périodique du rayonnement sub-THz transmis peut être écrite en termes d'une série de Fourier :

$$I(\nu_s + \delta\nu \cos(\omega_m t)) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n(\nu_s) \cos(n\omega_m t), \quad (2.8)$$

Les coefficients A_n à l'ordre $n \geq 1$ s'écrivent à partir de la loi de Beer-Lambert :

$$A_n(\nu_s) = \frac{2}{\pi} \int_0^T I_0 e^{-\alpha(\nu_s + \delta\nu \cos(\omega_m t))L} \cos(n\omega_m t) dt \quad (2.9)$$

qu'on peut également écrire :

$$A_n(\nu_s) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi I_0 e^{-\alpha(\nu_s + \delta\nu \cos\theta)L} \cos(n\theta) d\theta. \quad (2.10)$$

Dans le cas de faibles profondeurs de modulation ($\delta\nu \ll \nu_s$), $\alpha(\nu)$ peut se décomposer sous la forme d'une série entière au voisinage de ν_s :

$$A_n(\nu_s) = -\frac{2I_0L}{\pi} \int_0^\pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\delta\nu^k}{k!} (\cos\theta)^k \frac{d^k \alpha}{d\nu^k} \cos(n\theta) d\theta. \quad (2.11)$$

Puis, les fonctions cosinus sont paires et la série entière est convergente, on peut donc réécrire 2.11 :

$$A_n(\nu_s) = -\frac{2I_0L}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\delta\nu^k}{k!} (\cos\theta)^k \frac{d^k \alpha}{d\nu^k} \cos(n\theta) d\theta. \quad (2.12)$$

Il convient ensuite de linéariser $(\cos\theta)^k$ à partir de la formule d'Euler :

$$(\cos\theta)^k = \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^k \quad (2.13)$$

$$(\cos\theta)^k = \frac{1}{2^k} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} e^{ip\theta} + e^{-i(k-p)\theta} \quad (2.14)$$

$$(\cos\theta)^k = \frac{1}{2^k} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} e^{i(2p-k)\theta} \quad (2.15)$$

avec les coefficients binomiaux $\binom{k}{p} = \frac{k!}{p!(k-p)!}$. On exprime également $\cos(n\theta)$ avec la formule d'Euler.

$$(\cos n\theta) = \frac{e^{in\theta} + e^{-in\theta}}{2} \quad (2.16)$$

Ainsi, l'équation 2.12 devient :

$$A_n(\nu_s) = -\frac{I_0 L}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\delta \nu^k}{k!} \frac{1}{2^{k+1}} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} e^{i(2p-k)\theta} \frac{d^k \alpha}{d\nu^k} (e^{in\theta} + e^{-in\theta}) d\theta, \quad (2.17)$$

soit :

$$A_n(\nu_s) = -\frac{I_0 L}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} \frac{\delta \nu^k}{k!} \frac{1}{2^{k+1}} \frac{d^k \alpha}{d\nu^k} \int_{-\pi}^{\pi} (e^{i(2p-k+n)\theta} + e^{i(2p-k-n)\theta}) d\theta. \quad (2.18)$$

Cette équation peut s'écrire en décomposant l'intégrale en deux parties :

$$A_n(\nu_s) = A_n^{(a)}(\nu_s) + A_n^{(b)}(\nu_s) \quad (2.19)$$

$$A_n^{(a)}(\nu_s) = -\frac{I_0 L}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} \frac{\delta \nu^k}{k!} \frac{1}{2^{k+1}} \frac{d^k \alpha}{d\nu^k} \int_{-\pi}^{\pi} (e^{i(2p-k+n)\theta}) d\theta. \quad (2.20)$$

$$A_n^{(b)}(\nu_s) = -\frac{I_0 L}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} \frac{\delta \nu^k}{k!} \frac{1}{2^{k+1}} \frac{d^k \alpha}{d\nu^k} \int_{-\pi}^{\pi} (e^{i(2p-k-n)\theta}) d\theta. \quad (2.21)$$

L'équation 2.20 est réduite de la façon suivante :

$$\int_{-\pi}^{\pi} (e^{i(2p-k+n)\theta}) d\theta = 2\pi \quad \text{si } 2p - k + n = 0 \quad (2.22)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} (e^{i(2p-k+n)\theta}) d\theta = 0 \quad \text{sinon.} \quad (2.23)$$

La condition $2p - k + n = 0$ et p entier implique que $k - n$ soit pair, et $p \geq 0$ implique que $k \geq n$:

$$2p - k + n = 0 \Rightarrow p = \frac{k - n}{2} \Rightarrow (k - n) \text{ pair} \quad (2.24)$$

$$\frac{k}{2} \geq \frac{n}{2} \Rightarrow k \geq n. \quad (2.25)$$

La série s'écrit donc :

$$A_n^{(a)}(\nu_s) = -\frac{I_0 L}{\pi} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{k!}{\left(\frac{k-n}{2}\right)! \left(k - \frac{k-n}{2}\right)!} \frac{\delta \nu^k}{k!} \frac{d^k \alpha}{d\nu^k} \frac{1}{2^{k+1}} 2\pi. \quad (2.26)$$

En ne conservant que le premier terme de la série entière, cette équation s'écrit :

$$A_n^{(a)}(\nu_s) = -I_0 L \frac{\delta \nu^n}{n!} \frac{d^n \alpha}{d\nu^n} \frac{1}{2^n}. \quad (2.27)$$

L'équation 2.21 est réduite de la même manière que pour l'équation 2.20 :

$$\int_{-\pi}^{\pi} (e^{i(2p-k-n)\theta}) d\theta = 2\pi \quad \text{si } 2p - k - n = 0 \quad (2.28)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} (e^{i(2p-k-n)\theta}) d\theta = 0 \quad \text{sinon.} \quad (2.29)$$

La condition $2p - k - n = 0$ et p entier implique que $k + n$ soit pair, et $p \leq k$ implique que $k \geq n$:

$$2p - k - n = 0 \Rightarrow p = \frac{k + n}{2} \Rightarrow (k + n) \text{ pair} \quad (2.30)$$

$$2p \leq 2k \Rightarrow k + n \leq 2k \Rightarrow k \geq n. \quad (2.31)$$

La série s'écrit donc :

$$A_n^{(b)}(\nu_s) = -\frac{I_0 L}{\pi} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{k!}{\left(\frac{k+n}{2}\right)! \left(k - \frac{k+n}{2}\right)!} \frac{\delta\nu^k d^k \alpha}{k!} \frac{1}{d\nu^k 2^{k+1}} 2\pi. \quad (2.32)$$

En ne conservant que le premier terme de la série entière, cette équation s'écrit :

$$A_n^{(b)}(\nu_s) = -I_0 L \frac{\delta\nu^n d^n \alpha}{n!} \frac{1}{d\nu^n 2^n}. \quad (2.33)$$

Enfin, il apparaît que $A_n^{(a)}(\nu_s) = A_n^{(b)}(\nu_s)$ en comparant les expressions 2.27 et 2.33. L'expression finale obtenue à partir de 2.19 fait ainsi apparaître explicitement la dérivée $n^{\text{ème}}$ du signal [138] :

$$A_n(\nu_s) = -I_0 L \frac{\delta\nu^n d^n \alpha}{n!} \frac{1}{d\nu^n 2^{1-n}}. \quad (2.34)$$

Le profil de raie mesuré en signal d'absorption (Gaussienne), la première harmonique ($n = 1$) et la deuxième harmonique ($n = 2$) sont présentés en figure 2.11.

2.3.2 Comparaison AM/FM

La spectroscopie à modulation de fréquence permet donc d'enregistrer les raies moléculaires avec un meilleur rapport S/B qu'avec la modulation en amplitude (AM). La comparaison de raies de l'acétonitrile (CH_3CN) enregistrées en AM et FM est donnée en figure 2.12. La mesure en FM permet de détecter des raies peu ou pas visible en AM, en particulier quand la raie en AM se confond avec les variations de ligne de base (figure 2.12(c)).




FIGURE 2.11 – Comparaison du signal d'absorption et de ses dérivées première et seconde centrés autour de ν_0 .




FIGURE 2.12 – Différentes raies d'absorption $J'_{K'} \leftarrow J''_{K''}$ de l'acétonitrile dans l'état fondamental ((a) : $18_7 \leftarrow 17_7$; (b) : $18_3 \leftarrow 17_3$) et l'état excité $\nu_8=1$ de pliage CCN ((c) : $18_5 \leftarrow 17_5$) enregistrées en modulation d'amplitude (en noir) et en modulation de fréquence 2F (en bleu). Les effets de ligne résiduels n'ont pas été traités, ce qui explique les variations enregistrées en AM.

2.3.3 Comparaison des configurations en simple et double passage

Au cours de ma thèse, j'ai pu modifier la configuration de la cellule en double passage afin d'améliorer le rapport S/B des spectres. Dans le cas de faible absorption ($\alpha(v) \leq 6\%$), la loi de Beer-Lambert (équation 1.65) peut s'écrire en développement limité autour de zéro à l'ordre 1 [26] :

$$I(v) = I_0 \exp[-\alpha(v)L] \simeq I_0(1 - \alpha(v)L). \quad (2.35)$$

Si la longueur L de la cellule est deux fois plus grande, alors le signal d'absorption $I_0 - I(v)$ est deux fois plus important dans le cas de faibles absorptions. Un exemple d'enregistrement en simple et double passage est donné en figure 2.13 pour la transition $3_{13} \leftarrow 2_{20}$ de l'eau à 183310.0870(10) MHz avec une intensité calculée de $S = -3.65 \text{ nm}^2\text{MHz}$ [71]. Pour des conditions expérimentales de moyennage, de modulation de fréquence et de pression identiques, le signal moléculaire obtenu expérimentalement est 3.2 fois plus intense en double passage. Le résultat obtenu dans cet exemple est plus proche du rapport des intensités égal à 3.5 pour $\alpha = 100\%$ que du résultat attendu dans l'hypothèse des faibles absorptions.




FIGURE 2.13 – Comparaison d'une raie de l'eau enregistrée en simple passage ($S/B=85$) et en double passage ($S/B=297$).

L'installation de la cellule en double passage permet également de mesurer des raies à la résolution sub-Doppler grâce à l'effet Lamb Dip. Certaines conditions sont nécessaires à l'observation de l'effet Lamb-Dip : la cellule en double passage, une pression de l'ordre de quelques μbar (régime Doppler), la transition mesurée doit être suffisamment intense et la puissance de la source suffisante (saturation partielle de la transitions). [139, 140, 141, 142] La largeur du Lamb Dip est de seulement quelques dizaines de kHz, elle permet de résoudre




FIGURE 2.14 – Effet Lamb-Dip d’une raie de l’eau enregistrée en double passage à $3 \mu\text{bar}$. La profondeur de modulation $\delta\nu$ est ajustée afin d’observer la raie d’absorption sous un élargissement Doppler ayant une pleine largeur à mi-hauteur de 600 kHz ($\delta\nu = 2\text{kHz}$) ou la raie du Lamb-Dip de pleine largeur à mi-hauteur de 47 kHz ($\delta\nu = 30\text{kHz}$).

des raies très proches en fréquences (voir figure 2.14). Cependant, cette méthode n’a pas pu être appliquée aux molécules étudiées en raison de raies trop faibles en intensité pour cette technique mais mis en oeuvre autour de 183 GHz avec une transition rotationnelle de l’eau.

2.3.4 Précision expérimentale et rapport signal-sur-bruit (S/B)

Pour obtenir une expression simple du rapport S/N, il convient de supposer que (i) le signal et le bruit ne sont pas corrélés, (ii) la force du signal est constante pendant les mesures avec des conditions expérimentales identiques, et (iii) que le bruit est un bruit blanc, c’est-à-dire que sa valeur moyenne est nulle et que les effets systématiques sont négligés. Le rapport signal-sur-bruit (S/B) est donné par [143] :

$$S/B = \sqrt{n} \frac{S}{\sigma} \quad (2.36)$$

où S est l’amplitude du signal, B l’amplitude du bruit, n le nombre de mesures accumulées et σ la déviation standard de l’analyse du profil de raie. Ce rapport peut être directement estimé en mesurant l’amplitude du signal et du bruit. La dépendance en \sqrt{n} est illustrée dans la figure 2.15 avec un enregistrement unique et la moyenné de 39 spectres, le bruit du spectre moyenné est ainsi divisé par $\sqrt{39} = 6,24$.




FIGURE 2.15 – Comparaison entre un enregistrement de 100 MHz (27 minutes d’acquisition) et la moyenne de 39 spectres moyennés enregistrés (18 heures d’acquisition) avec un pas de 25 kHz et une constante de temps de 100 ms.

La précision expérimentale peut être estimée à partir du rapport S/B [144], tel que :

$$\delta(\nu) = \frac{(C\Delta\nu)^{1/2}}{S/B} \left[(1-s) \left(\frac{2}{\pi \ln 2} \right)^{1/4} + s \left(\frac{32}{\pi} \right)^{1/2} \right] \quad (2.37)$$

où $\Delta\nu$ est le pas en fréquence, C la FWHM et s un paramètre du profil pseudo-Voigt. Le paramètre $s = 1$ correspond à un profil purement Lorentzien alors que $s = 0$ correspond à un profil purement Gaussien). Cette formule a été utilisée pour pondérer les transitions dans le fichier .lin des ajustements avec SPFIT (voir section 1.8.3).

2.3.5 Traitement des effets FP par filtre à transformée de Fourier

Des ondes stationnaires se produisent en raison de réflexions multiples au sein du spectromètre, notamment entre la source et le détecteur et entre les deux fenêtres de la cellule, et génèrent de fortes modulations de la ligne de base. Ces effets Fabry-Pérot (FP) de finesse F sont générés par des réflexions multiples entre différentes surfaces séparées d’une distance L :

$$ISL = \frac{c}{2L} \quad F = \frac{ISL}{\Delta\nu} = 2\pi N \quad (2.38)$$

où $\Delta\nu$ est la pleine largeur à mi-hauteur des interférences, ISL l'intervalle spectral libre de l'effet FP et N le nombre d'aller-retours de la cavité. Même avec une normalisation par un signal de référence (avec une cellule sous pompage) associée à une approche par modulation de fréquence, il reste difficile de s'affranchir totalement de la ligne de base. Nous proposons à la suite une approche entièrement numérique pour isoler de meilleure façon les transitions recherchées en utilisant un filtre à transformée de Fourier. La méthode consiste à faire la transformée de Fourier discrète (FFT) du spectre expérimental $x(n)$:

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi\frac{nk}{N}} \quad (2.39)$$

où N est le nombre de points du spectre et $X(k)$ une approximation de la transformée de Fourier de ce signal. Afin de ne conserver que la ligne de base correspondant à des oscillations de faible pulsation par rapport aux raies moléculaires, on applique un filtre passe bas en multipliant $X(k)$ par $h(k)$ caractérisé par le seuil k_s :

$$h(k) = 1 \quad \text{si } k \leq k_s \quad (2.40)$$

$$h(k) = 0 \quad \text{si } k > k_s \quad (2.41)$$

Un filtre passe bande caractérisé par deux seuils k_{s1} et k_{s2} peut également être utilisé :

$$h(k) = 1 \quad \text{si } k_{s1} \leq k \leq k_{s2} \quad (2.42)$$

$$h(k) = 0 \quad \text{si } k < k_{s1} \quad \text{ou } k > k_{s2}. \quad (2.43)$$

La transformée de Fourier discrète inverse permet de reconstruire la ligne de base en fréquences :

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)e^{j2\pi\frac{nk}{N}} \quad (2.44)$$

La ligne de base est ensuite soustraite au spectre afin de ne conserver que les raies moléculaires. Une autre option consisterait à appliquer un filtre passe haut (ou coupe bande) afin d'éliminer directement la ligne de base du spectre. Néanmoins, cette méthode ne permet pas de visualiser la ligne de base avant de la soustraire pour vérifier que le seuil du filtre n'affecte pas les raies moléculaires. Cette méthode s'adapte à tous types de spectres sans altérer le bruit ou les transitions, tant que les raies moléculaires sont plus fines que les variations de la ligne de base. Le filtre passe bas a permis d'éliminer l'ensemble des effets FP pour des spectres relativement faibles du 2-NT, 3-NT, 4-NT et du 3-MP et le filtre passe bande a été utilisé pour les spectres enregistrés dans le projet Jet-AILES. Un exemple est donné en figure 2.16

pour le spectre du 3-Méthoxyphénol enregistré en double passage. L'effets FP principal cor-




FIGURE 2.16 – Traitement de la ligne de base pour le spectre du 3-Méthoxyphénol.

respond à la distance entre la source et le détecteur ($L=3.5$ m pour un $ISL \simeq 42$ MHz) avec une finesse $F \simeq 1.8$ ($\delta\nu \simeq 23$ MHz). D'autres effets FP plus faibles comme celui provenant de la réflexion entre les fenêtres de la cellule contribuent également à la ligne de base mais leur ISL n'est pas clairement identifié dans cet exemple.

2.4 Spectromètre d'émission millimétrique à dérive de fréquence du LPCA

J'ai également eu l'opportunité d'utiliser le spectromètre récemment mis au point au LPCA dans le cadre de l'ANR OSCAR (Chirped Pulse-Fourier Transform millimeter) [125] présenté en figure 2.17. Le processus d'émission moléculaire est semblable à celui du SIMO du PhLAM (voir section 2.2). Au lieu d'utiliser une impulsion microonde monochromatique,




FIGURE 2.17 – Spectromètre d'émission millimétrique à dérive de fréquence du LPCA.

une impulsion millimétrique à dérive de fréquence d'une centaine de ns et de 30 mW de puissance permet de mesurer le spectre dans la gamme 190-210 GHz. Le schéma de montage est présenté en figure 2.18. La dérive de fréquence est générée en mélangeant la fréquence du générateur de signaux arbitraire (AWG, arbitrary wave generator) avec un oscillateur de fréquence fixe f_{osc} avant d'être multiplié jusqu'à la 190-210 GHz. L'impulsion est émise par une antenne cornet à travers la cellule équipée d'une pompe turbomoléculaire. Une détection hétérodyne permet d'obtenir la réponse moléculaire. Enfin, les signaux FID temporels sont moyennés et transformés dans le domaine fréquentiel par Transformée de Fourier.

2.5 Spectroscopie dans l'infrarouge moyen et lointain (IRM/IRL)

Le spectromètre à transformée de Fourier et haute résolution ($R \geq 0.00102 \text{ cm}^{-1}$) de la ligne AILES (Advanced Infrared Line Exploited for Spectroscopy) du synchrotron SOLEIL (Source Optimisée de Lumière d'Énergie Intermédiaire du LURE) [145] a été utilisé pour mesurer des spectres dans l'infrarouge moyen et lointain (IRM/IRL) à température ambiante et en jet moléculaire.




FIGURE 2.18 – Schémas de montage du spectromètre à dérive de fréquence millimétrique à transformée de Fourier du LPCA.

2.5.1 Dispositif expérimental

Le rayonnement synchrotron est généré par un anneau de stockage de 354 mètres de périmètre dans lequel des électrons de très haute énergie circulent à une vitesse proche de celle de la lumière. Leur trajectoire est courbée grâce à l'action d'un champ magnétique, ils perdent alors de l'énergie sous forme d'un rayonnement lumineux intense qui va du domaine des rayons X jusqu'à l'infrarouge lointain (IRL). Le faisceau synchrotron généré dans l'IRL par les électrons lors de leur passage au bord de l'aimant de courbure est dirigé par des systèmes optiques vers les stations expérimentales appelées lignes de lumière. Cette source présente une haute densité de photons et un faisceau infrarouge intense optimisé dans la gamme 7-1500 cm^{-1} .

Le rayonnement synchrotron est extrait et focalisé à l'entrée de l'ouverture de l'interféromètre

à transformée de Fourier Bruker IFS 125. L'interféromètre possède un bras mobile de plus de 4 mètres permettant d'atteindre une résolution maximale de 0.00102 cm^{-1} (30 MHz) et est équipée d'une séparatrice interchangeable permettant de mesurer différentes gammes de fréquences. L'interféromètre est continuellement pompé à 10^{-3} Pa afin de limiter l'absorption de l'eau atmosphérique et est couplé à une cellule multi-passages de type White de 2.853 mètres de longueur et 0.6 mètre de diamètre dont le trajet optique est réglable de 10 à 200 mètres en ajustant l'inclinaison des miroirs (voir figure 2.19). La cellule est isolée de l'interféromètre par des fenêtres en polypropylène de $50 \mu\text{m}$ d'épaisseur. Grâce à ce long trajet




FIGURE 2.19 – (a) Spectromètre à transformée de Fourier de la ligne AILES et (b) représentation schématique de la cellule d'absorption multipassage de la ligne AILES.

optique, à la grande brillance et grande directivité du rayonnement synchrotron, le dispositif permet l'étude de molécules stables à faible pression de vapeur saturante en phase gazeuse. Enfin, une détection bolométrique au silicium refroidi à l'He liquide (4 K) a été utilisée dans notre étude.

L'interféromètre à Transformée de Fourier permet donc des mesures de spectres large bande avec une sensibilité optimisée. Il est important de moyenner un grand nombre d'inférogrammes pour obtenir un rapport signal sur bruit (S/B) optimal car celui-ci évolue proportionnellement avec la racine du nombre d'acquisitions. On note également que la largeur des raies rovibrationnelles enregistrée dans l'IRL sont principalement limitées par la fonction d'appareil de l'interféromètre dont la valeur a été mesurée autour de 100 MHz (FWHM) par Jacquemart *et al.*[146] alors que la largeur Doppler à 293 K dans l'IRL ne dépasse jamais 30 MHz (FWHM) pour les molécules étudiées dans cette thèse. On note que les mesures sont réalisées à basse pression et que l'élargissement collisionnel est par conséquent négligeable.

2.5.2 Gain en rapport S/B pour une source synchrotron

Le rayonnement synchrotron présente l'avantage d'envoyer un flux de photons beaucoup plus important qu'une source classique de type global et permet un gain en S/B optimal à 100 cm^{-1} (voir figure 2.20). En présence de bruit blanc, l'évolution du rapport S/B peut être approximée comme étant proportionnelle à \sqrt{t} [147]. Par exemple, le gain de 16 autour de 100 cm^{-1} signifie que l'utilisation de la source synchrotron permet d'enregistrer en 1 jour ce qu'une source global enregistrerait en 256 jours. On note que l'élimination du bruit blanc




FIGURE 2.20 – Gain en S/N pour la source synchrotron par rapport à une source global (crédit : S. GRUET).

par le moyennage est limitée par le bruit de la source (rayonnement synchrotron), le bruit électrique du détecteur et le bruit mécanique des pompes.

2.5.3 Calibration des spectres

Les spectres à haute résolution enregistrés avec le spectromètre TF doivent être calibrés. Le nombre d'onde des spectres enregistrés est déterminé à partir de la position précise du miroir dans l'interféromètre pendant son déplacement dans l'interféromètre de Michelson. Un laser He-Ne permet de déterminer la position du miroir mobile grâce au nombre de frange de l'interférogramme qu'il génère pendant son déplacement. Néanmoins, l'axe optique de propagation du laser pris pour référence n'est pas exactement le même que celui la source

synchrotron qui a une divergence plus grande. Comme la différence de marche utilisée pour la détermination en nombre d'onde du spectre est celle du laser He-Ne, il en résulte un faible décalage en nombre d'onde : de quelques 10^{-4} à 10^{-5} cm^{-1} . On note que les phénomènes de diffraction par l'iris d'entrée peuvent être non négligeables et donc aussi expliquer le décalage constaté. Pour calibrer, nous avons donc systématiquement employé la formule :

$$\nu_{cal} = (1 - a)\nu_{obs} - b \quad (2.45)$$

où a et b sont déterminés empiriquement. La calibration des spectres IRL s'effectue à l'aide des raies d'absorption de l'eau résiduelle de la cellule d'absorption dont les fréquences sont issues des références [148] et [149]. Généralement, un décalage très faibles de quelques 10^{-4} à 10^{-3} cm^{-1} est observé, la calibration peut donc être faite de façon empirique à l'aide d'un tableur ou en utilisant un code Python mis à disposition par l'équipe de la ligne AILES. Comme l'incertitude expérimentale des raies attribuées ne peut être inférieure à la déviation standard des raies calibrées, la calibration permet également d'estimer l'incertitude en fréquence des attributions pour l'analyse de spectre en tenant compte de la moyenne des $\tilde{\nu}_{obs} - \tilde{\nu}_{ref}$ des raies de calibration (typiquement de l'ordre de 0.00015 cm^{-1}).

2.5.4 Jet-AILES

Nous avons également eu l'opportunité de réaliser des mesures à basse température ($T_{rot} < 10\text{K}$) avec le dispositif Jet-AILES du synchrotron SOLEIL sur les méthoxyphénols. Les mesures à basse température permettent de relaxer la population rotationnelle vers les niveaux d'énergie les plus bas, ce qui réduit considérablement la contribution des bandes chaudes et simplifie les spectres. Le montage Jet-AILES ainsi que les spectres mesurés sont présentés en annexe A.

Chapitre 3

Analyses rovibrationnelles du chlorure de thionyle (SOCl_2) à l'aide des algorithmes évolutionnaires (AEs)

Sommaire

3.1	Introduction générale	99
3.2	Présentation de la molécule	100
3.2.1	Propriétés spectroscopiques de SOCl_2	100
3.2.2	État de l'art	102
3.3	Spectre expérimental	103
3.4	Analyse des bandes rovibrationnelles ν_2 et ν_5 de SOCl_2	104
3.4.1	Application des AEs à un spectre synthétique	104
3.4.2	Préparation des spectres expérimentaux pour les AEs	106
3.4.3	Centre de bande et constantes rotationnelles de [32, 16, 35, 35] déterminés par les AEs	108
3.4.4	Analyse subséquente de [32, 16, 35, 35] par diagrammes de Loomis-Wood	111
3.4.5	Centre de bande et constantes rotationnelles de [32, 16, 35, 37]	113
3.4.6	Analyse subséquente de [32, 16, 35, 37] par diagrammes de Loomis-Wood	115
3.4.7	Comparaison des spectres calculés/expérimentaux dans l'IRL	116
3.4.8	Précision relative des paramètres	119
3.4.9	Pouvoir prédictif de la méthode de calcul CCSD(T)	119
3.5	Analyse complémentaire du spectre submillimétrique	122

3.6	Ajustement global de SOCl_2	125
3.7	Conclusions	128

3.1 Introduction générale

Le chlorure de thionyle (SOCl_2), est un intermédiaire de réaction important utilisé par l'industrie d'agrochimie, de chimie fine et pharmaceutique. Cette molécule est un oxydant extrêmement puissant dont l'une des principales utilisations est la conversion des alcools et acides carboxyliques en leurs chlorures correspondants [13]. L'intérêt de SOCl_2 a gagné en importance ces trente dernières années en raison de son utilisation comme cathode dans les batteries au lithium et dont la production à l'échelle mondiale dépasse les 45kt/an [150]. Toxique et listée comme un composé de l'annexe 3 dans la loi américaine sur les substances contrôlées, il peut être utilisé dans la production d'armes chimiques comme le gas sarin ou la chloropicrine. Son évolution dans l'atmosphère a été étudiée par Johnson *et al.* [13] pour différentes températures et différents taux d'humidité en chambre de simulation par spectroscopie FT-IR non résolue rotationnellement. Cette étude a montré que l'humidité joue un rôle important dans la dégradation de SOCl_2 qui réagit rapidement avec l'eau et forme HCl et SO_2 dans un rapport stoechiométrique d'environ 2 : 1. Les mesures cinétiques ont démontré que la durée de vie dans la troposphère de SOCl_2 est de seulement quelques minutes en raison de son hydrolyse. En raison des multiples caractéristiques de SOCl_2 en termes de forte toxicité, de réactivité violente et de grande volatilité, il est établi que son élimination inadéquate peut avoir un effet important sur la pollution des environnements intérieurs ou extérieurs. Le développement d'une instrumentation rapide, sensible et sélective est donc nécessaire pour surveiller les émanations de SOCl_2 .

Au cours de ces dernières années, différents types de détecteurs de gaz toxiques ont été développés avec une très bonne sensibilité (≤ 1 ppb), même s'ils souffrent encore d'un manque de sélectivité [151]. Pour résoudre ce problème de sélectivité, la prochaine génération de capteurs de gaz toxiques devra très probablement sonder des transitions rotationnelles ou rovibrationnelles caractéristiques de la molécule sondée. Une connaissance approfondie du spectre THz est donc obligatoire pour définir des fenêtres spectrales idéales et les seuils de sensibilité nécessaires au développement de tels capteurs. La mesure et l'analyse des spectres rotationnels et rovibrationnels de SOCl_2 a été entreprise ces dernières années au sein du LPCA. Le travail présenté dans cette section concerne principalement l'analyse des bandes rovibrationnelles ν_2 et ν_5 des isotopologues $^{32}\text{S}^{16}\text{O}^{35}\text{Cl}_2$ ([32, 16, 35, 35]) et $^{32}\text{S}^{16}\text{O}^{35}\text{Cl}^{37}\text{Cl}$ ([32, 16, 35, 37]) afin de compléter l'étude de cette molécule et de tester l'utilisation des algorithmes évolutionnaires permettant un ajustement direct du spectre par une optimisation globale (voir section 1.8.4).

3.2 Présentation de la molécule

3.2.1 Propriétés spectroscopiques de SOCl_2

D'un point de vue spectroscopique, SOCl_2 est une molécule relativement lourde ($M=119$ g/mol) et naturellement riche en isotopologues (voir table 3.1), une grande densité de transitions rotationnelles et rovibrationnelles est donc attendue à température ambiante. Cette

TABLE 3.1 – Abondances naturelles relative et absolues des isotopologues de $[S, O, Cl, Cl]$.

Espèce	Abondance %		Espèce	Abondance %	
	Absolute	Relative		Absolute	Relative
[32, 16, 35, 35]	54.42	100.00	[33, 16, 35, 37]	0.27	0.50
[32, 16, 35, 37]	34.80	63.96	[34, 16, 37, 37]	0.25	0.45
[32, 16, 37, 37]	5.57	10.23	[32, 18, 35, 35]	0.11	0.21
[34, 16, 35, 35]	2.41	4.43	[32, 18, 35, 37]	0.07	0.13
[34, 16, 35, 37]	1.54	2.83	[33, 16, 37, 37]	0.04	0.08
[33, 16, 35, 35]	0.43	0.79	[32, 18, 37, 37]	0.01	0.02

molécule est une toupie hautement asymétrique ($\kappa = -0.45$) et présente deux composantes du moment dipolaire permanent selon les axes principaux b et c du plan de symétrie de la molécule. SOCl_2 possède six modes normaux de vibration présentés dans la figure 3.2 : quatre




FIGURE 3.1 – Représentation de SOCl_2 dans le repère d'inertie.

de symétrie A' ($\nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4$) et deux de symétrie A'' (ν_5, ν_6). Les modes A' correspondent à un moment dipolaire de transition selon les axes b et c alors que les modes A'' sont selon l'axe a hors plan. La fréquence et l'intensité des modes harmoniques et anharmoniques de vibration de SOCl_2 ont été calculés au niveau au niveau MP2/6-311++G(3df,3pd) [152] (voir table 3.2).


FIGURE 3.2 – Modes de vibration de SOCl_2 .

TABLE 3.2 – Fréquences et intensités des modes fondamentaux de vibration de l’isotopologue principal [32, 16, 35, 35] calculés avec Gaussian 09 [89] au niveau harmonique et anharmonique MP2/6-311++G(3df,3pd) [152] et fréquences expérimentales issue de l’analyse des spectres. La distribution de Boltzmann $(N_i/N)_{anharmon}$ est calculée à 293K à partir des énergies anharmoniques $E_{anharmon}$. L’incertitude entre parenthèses correspond aux dernières décimales.

Mode de vibration		[32, 16, 35, 35]			$(N_i/N)_{anharmon}$ %	I_{harm} km/mole
		ν_{harm} cm^{-1}	$\nu_{anharmon}$ cm^{-1}	ν_{exp} cm^{-1}		
ν_4	Cisaillement SCl_2	195.829	193.816		37.6	0.006
ν_6	Balancement SCl_2	281.989	279.644	283.7255996(63)	24.7	7.044
ν_3	Hochement SCl_2	346.249	343.092	345.9665893(57)	18.1	11.302
ν_5	Élongation antisymétrique SCl_2	451.185	445.662	459.8206648(55)	10.9	196.446
ν_2	Élongation symétrique SCl_2	500.505	495.056	500.0942072(69)	8.6	80.387
ν_1	Élongation SO	1301.819	1291.353		0.2	148.664

3.2.2 État de l'art

La molécule de chlorure de thionyle avait été mesurée en spectroscopie visible-UV à 190–300 nm [153] ainsi qu'en spectroscopies IR et Raman pour les modes de vibration fondamentaux [154] mais sans résoudre la structure de rotation. Le groupe THz du LPCA a récemment initié une étude spectroscopique à haute résolution complète de SOCl_2 et de ses isotopologues de la gamme micro-onde à l'infrarouge lointain [152, 155]. Les premières études ont permis d'étendre les mesures précédentes de rotation pure des isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37] dans le domaine micro-onde à une étude plus complète des isotopologues et aux fréquences millimétrique/submillimétrique et IRL [156, 157, 158, 159, 160]. D'une part, les paramètres spectroscopiques de l'état fondamental ont pu être déterminés avec précision pour six des isotopologues les plus abondants ([32, 16, 35, 35], [32, 16, 35, 37], [32, 16, 37, 37], [34, 16, 35, 35], [34, 16, 35, 37] et [34, 16, 37, 37]) en spectroscopie FTMW à dérive de fréquence en jet supersonique [155]. La structure semi-expérimentale de SOCl_2 a ainsi pu être déterminée à partir de l'analyse de spectre des différents isotopogues combinée aux calculs de chimie quantique (équations de Kreitchman). D'autre part, les spectres submillimétriques et IRL résolus rotationnellement ont été mesurés à température ambiante en utilisant la chaîne de multiplication du LPCA (section 2.3.1) ainsi que le spectromètre FTIR de la ligne AILES du synchrotron SOLEIL (section 2.5), respectivement. Les transitions de rotation pure dans l'état fondamental de vibration des trois isotopologues les plus abondants [32, 16, 35, 35], [32, 16, 35, 37] et [32, 16, 37, 37] ont été attribuées dans le spectre submillimétrique [155]. Puis, les transitions rovibrationnelles des modes de vibrations basse fréquence actifs ν_3 (A') de hochement SCl_2 et ν_6 (A'') de balancement SCl_2 ont également été étudiés dans les régions IRL et submillimétrique [152] pour [32, 16, 35, 35], [32, 16, 35, 37] et [32, 16, 37, 37] étudiés dans mon travail de stage de Master 2. Concernant le mode ν_4 de cisaillement SCl_2 , le spectre rovibrationnel était trop faible pour être observé dans l'IRL, la détermination de ses constantes de rotations nécessitait d'identifier ses transitions de rotation pure dans le spectre submillimétrique. Enfin, les modes symétrique ν_2 (A') et antisymétrique ν_5 (A'') d'élongation SCl_2 n'avaient pas été observés à ce jour [152]. Des mesures préliminaires de ν_2 et ν_5 avaient été menées à l'aide du spectromètre FT-IR et de la source synchrotron de la ligne AILES du synchrotron SOLEIL mais n'avaient pas donné de spectre exploitable en raison de l'intense bande rovibrationnelle du mode de pliage ν_2 du dioxyde de soufre SO_2 produit par l'hydrolyse de SOCl_2 avec des traces résiduelles d'eau dans la cellule multipassage. Enfin, le mode ν_1 associé au mode d'élongation de S=O doit être mesuré dans l'IRM.

3.3 Spectre expérimental

Le spectre IRL de SOCl_2 a été mesuré entre 420 cm^{-1} et 550 cm^{-1} à $P = 900 \mu\text{bar}$ en utilisant le spectromètre FTIR de la ligne AILES du synchrotron SOLEIL [145] dans la même configuration expérimentale qu'utilisée précédemment pour l'étude des bandes ν_6 et ν_3 [152]. La source synchrotron a été focalisée à l'entrée de l'interféromètre Bruker IFS125FT équipé de la séparatrice composite mylar-silicium de $6 \mu\text{m}$ afin de mesurer la région THz/IRL. La cellule multipassage de type White a été réglée pour un trajet optique de 150 mètres et la détection bolométrique équipée d'un filtre passe-bande optique de $10\text{--}700 \text{ cm}^{-1}$. L'utilisation de la source synchrotron dans la gamme $420 \text{ cm}^{-1}\text{--}550 \text{ cm}^{-1}$ permet un gain en rapport S/B de 3 à 3.5 en comparaison avec les sources classiques IR de type globar (voir figure 2.20), le temps d'acquisition est donc réduit d'un ordre de grandeur.

Le spectre présenté en figure 3.3 a été enregistré en 8 heures à 293K en moyennant 100 inférogrammes mesurés à la résolution maximale de l'instrument ($R=0.00102 \text{ cm}^{-1}$). L'erreur expérimentale a été estimée à 0.00015 cm^{-1} à partir de la calibration du spectre avec les raies d'eau résiduelles. Sous forme liquide à $T=293 \text{ K}$, la pression de vapeur de SOCl_2 conditionné par Sigma-Aldrich ($P_{\text{vap}} = 13 \text{ MPa}$, soit 130 mbar) avec une pureté de $\geq 97\%$ [161] a été directement injectée dans la cellule d'absorption sans purification supplémentaire. Néanmoins, l'hydrolyse très efficace de SOCl_2 avec les traces d'eau résiduelles de la cellule a produit une forte bande de SO_2 correspondant au mode de pliage ν_2 centré à 513.539 cm^{-1} [162] dans la région spectrale mesurée. Bien qu'il n'ait pas été possible de l'éliminer, il a été possible de la réduire suffisamment en pompant soigneusement la cellule avant l'expérience. La branche P de SO_2 recouvre largement la bande ν_2 de SOCl_2 centrée autour de 500.094 cm^{-1} et se mélange en partie avec la branche R de la bande ν_5 centrée autour de 459.821 cm^{-1} .




FIGURE 3.3 – Spectre expérimental de SOCl_2 (noir), spectre de la bande ν_2 de SO_2 simulé à partir des constantes moléculaires de Lafferty *et al.* [162] (rouge), et spectres calculés après analyse des bandes ν_2 et ν_5 des isotopologues [32, 16, 35, 35] (bleu) et [32, 16, 35, 37] (rose).

3.4 Analyse des bandes rovibrationnelles ν_2 et ν_5 de SOCl_2

Les deux bandes ν_2 et ν_5 des deux isotopologues les plus abondants [32, 16, 35, 35] (abondance naturelle : 54.42%) et [32, 16, 35, 37] (34.80%) ont été analysées malgré la présence de la bande ν_2 de SO_2 en combinant l'optimisation globale à l'aide des AEs et l'analyse raie par raie à l'aide des diagrammes Loomis-Wood. Avant de l'appliquer à la molécule, les AEs ont été testés sur un spectre synthétique qui ne contient donc ni raie étrangère, ni bruit.

3.4.1 Application des AEs à un spectre synthétique

Afin de tester la convergence des AEs, un premier test a été réalisé en utilisant un spectre synthétique généré à partir des paramètres ajustés de l'état fondamental [155], les constantes rotationnelles issues des calculs MP2/6-311++G(3df,3pd) de l'état $\nu_5 = 1$ [152] corrigées par un facteur d'échelle (voir équations 3.1 et 3.2) et le centre de bande ν_5 estimé expérimentalement. Dans l'ajustement global, nous avons choisi de fixer l'état fondamental des isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37] et de libérer les constantes de rotation et les centres de bandes des états excités de deux isotopologues. Les intervalles de liberté des paramètres libérés sont résumés dans la table 3.3. Afin de faciliter l'optimisation, certaines

TABLE 3.3 – Paramètres libérés et leur intervalle de liberté pour l'étude du spectre synthétique.

isotopologue 1	Intervalle		isotopologue 2	Intervalle	
	cm^{-1}	MHz		cm^{-1}	MHz
Centre de bande	0.6	18000	Centre de bande	0.6	18000
A	0.002	60	A	0.002	60
B	0.001	30	B	0.001	30
C	0.001	30	C	0.001	30

parties du spectre trop congestionnées ainsi qu'une ligne de base générée à partir du fond lissé du spectre expérimental (moyenne locale des fréquences voisines) peuvent être exclues de l'optimisation. Il est d'usage d'enlever les branches Q souvent trop congestionnées, le spectre ainsi préparé est présenté en figure 3.4. L'optimisation a été faite pour un total de 200 générations avec une population de 200 chromosomes en utilisant l'algorithme CMA-ES. La fonction de coût du meilleur individu de chaque génération a évolué de 97.589 à 0.120 en seulement de 17.2 minutes (voir figure 3.5). L'évolution de la fonction de coût indique une bonne optimisation mais elle n'est pas un critère suffisant pour déterminer la qualité des paramètres obtenus par l'optimisation. Les spectres calculés à partir des paramètres optimisés peuvent être comparés au spectre synthétique en comparant directement les spectres ou en observant




FIGURE 3.4 – Spectre synthétique (a) avant et (b) après préparation pour l’optimisation globale via les AEs.




FIGURE 3.5 – Évolution de la fonction de coût du meilleur individu de chaque génération pour l’optimisation sur un spectre synthétique.

les diagrammes de Loomis-Wood. Comme le montre la figure 3.6, les spectres synthétiques et simulés à partir des paramètres optimisés par les AEs correspondent parfaitement pour les deux isotopologues.




FIGURE 3.6 – (a) Spectre synthétique (noir) et spectres calculés à partir de l’optimisation par AEs pour les deux isotopologues les plus abondants [32, 16, 35, 35] (bleu) et [32, 16, 35, 37] (rose). (b) Partie de la branche *P*. (c) Partie de la branche *Q* pour [32, 16, 35, 37]. (d) Partie de la branche *Q* pour [32, 16, 35, 35]. (e) Partie de la branche *R*.

3.4.2 Préparation des spectres expérimentaux pour les AEs

Tout d’abord, les spectres ont été préparés pour l’optimisation avec les AEs en supprimant les portions de spectres contenant des raies d’eau résiduelle [148, 149]. Concernant la bande ν_5 , les branches *Q* très congestionnées ont été supprimées et la ligne de base traitée par un fond lissé calculé à partir du spectre expérimental (voir figure 3.7).

Pour la bande ν_2 , le spectre expérimental a tout d’abord été nettoyé en supprimant les plus fortes raies de SO_2 identifiées à partir des constantes moléculaires de la référence [162] (voir figure 3.8). Les transitions les plus faibles de SO_2 mélangées avec celles de SOCl_2 n’ont donc pas été éliminées. Des tentatives ont été menées pour simuler le spectre de SO_2 dans le programme d’optimisation globale afin d’ajuster SOCl_2 sur les raies restantes n’appartenant pas à SO_2 , mais l’intensité des raies expérimentales de SO_2 n’était pas suffisamment bien reproduite et certaines raies saturées. À la différence de ν_5 , il n’a pas été nécessaire de

supprimer la ligne de base par un fond lissé.




FIGURE 3.7 – Spectre de la bande ν_5 (a) avant et (b) après préparation pour l'optimisation globale via les AEs.




FIGURE 3.8 – Spectre de la bande ν_2 (a) avant et (b) après préparation pour l'optimisation globale via les AEs.

3.4.3 Centre de bande et constantes rotationnelles de [32, 16, 35, 35] déterminés par les AEs

Le spectre rovibrationnel de la bande ν_5 a été analysé à l'aide d'un hamiltonien efficace de Watson en réduction A et en représentation I' , adapté au traitement d'une toupie asymétrique proche prolata. Les constantes moléculaire de l'état fondamental sont issues de l'analyse micro-ondes/Far-IR [155] et maintenues fixes. Le centre de bande et les constantes de rotation de l'état excité $v_5 = 1$ des deux isotopologues ont été optimisés à l'aide des AEs pour $J_{\max} = 75$ en fixant les constantes de distorsion centrifuge de l'état $v_5 = 1$ sur les valeurs ajustées de l'état fondamental.

Tout d'abord, le centre et la largeur de chaque intervalle dans lequel la valeur expérimentale des constantes moléculaires libérées est supposée être trouvée doivent être estimés. En particulier, une assez bonne estimation pour les constantes de rotation de l'état vibrationnel excités de [32, 16, 35, 35] est obtenue en appliquant un facteur d'échelle $\mathcal{F}_{\text{scaling}}^{ab \text{ initio}}$ aux constantes expérimentales de l'état fondamental $[A, B, C]_{\text{exp.}}^{G.S.}$ de [32, 16, 35, 35], ratio des constantes rotationnelles *ab initio* de l'état fondamental et de l'état excités [152] :

$$[A, B, C]_{\text{est.}}^{(v)} = [A, B, C]_{\text{exp.}}^{G.S.} \times \mathcal{F}_{\text{scaling}}^{ab \text{ initio}} \quad (3.1)$$

avec

$$\mathcal{F}_{\text{scaling}}^{ab \text{ initio}} = \frac{[A, B, C]_{ab \text{ initio}}^{(v)}([32, 16, 35, 35])}{[A, B, C]_{ab \text{ initio}}^{G.S.}([32, 16, 35, 35])}. \quad (3.2)$$

Les calculs MP2/6-311++G(3df,3pd) utilisés présentent un bon compromis entre la précision obtenue pour la détermination théorique des constantes rotationnelles et des centres de bande (harmoniques et anharmonique) et le temps de calcul nécessaire pour des molécules de taille moyenne et ont donc été un point de départ raisonnable pour tester les AEs. Puis, il a été nécessaire d'inclure et de libérer le spectre de [32, 16, 35, 37] dans l'ajustement car il représente 64% de l'intensité du spectre de [32, 16, 35, 35]. Une première estimation des constantes rotationnelles pour l'état excité de [32, 16, 35, 37] a été obtenue par une mise à l'échelle des constantes expérimentales de l'état fondamental $[A, B, C]_{\text{exp.}}^{G.S.}$ de [32, 16, 35, 37] avec le même facteur $\mathcal{F}_{\text{scaling}}^{ab \text{ initio}}$ qu'utilisé pour [32, 16, 35, 35] (voir équations 3.1 et 3.2). Les valeurs estimées $[A, B, C]_{\text{est.}}^{(v)}$ pour [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37] ont ainsi été utilisées pour centrer les intervalles dont la largeur a été fixée empiriquement (voir table 3.4). Comme il était plus difficile de trouver un bon intervalle pour le centre de bande, un intervalle large de 3 cm^{-1} autour de la branche Q a été découpé en plusieurs sous-intervalles de 0.3 cm^{-1} dans lesquels différentes optimisations globales ont été réalisées. Comme détaillé dans la section 1.8.4, la division du centre de bandes en plusieurs sous-intervalles permet de faciliter la convergence et d'identifier

le(s) meilleur(s) résultat(s) en comparant la valeurs de fonction de coût finale obtenue dans chaque sous intervalle.

TABLE 3.4 – Paramètres libérés et leur intervalle de liberté pour l’isotopologue [32, 16, 35, 35] de la bande ν_5 .

isotopologue 1		Intervalle		isotopologue 2		Intervalle	
		cm^{-1}	MHz			cm^{-1}	MHz
Centre de bande		multirun		Centre de bande		0.3	9000
A		0.002	60	A		0.002	60
B		0.001	30	B		0.001	30
C		0.001	30	C		0.001	30

Les AEs ont été utilisé en parallèle sur 20 coeurs (processeurs Intel Xeon E5-2430L à 2.4 GHz) du serveur de calcul de l’Université Radboud à Nimègue (Pays-Bas). Une bonne détermination des constantes rotationnelles du centre de bande a été obtenue pour [32, 16, 35, 35] après 5 heures de calculs. L’évolution de la fonction de coût de cet ajustement est présenté en figure 3.9 avec une évolution de 99.53 à 72.611. Des optimisations ont également été menées




FIGURE 3.9 – Évolution de la fonction de coût du meilleur individu de chaque génération pour la bande ν_5 de [32, 16, 35, 35].

en libérant les termes de distorsion centrifuge de l’état excité de [32, 16, 35, 35] via les EAs, mais les résultats n’ont pas convergé vers un ensemble de paramètres satisfaisant. Ceci peut s’expliquer par plusieurs facteurs comme la présence des différents isotopologues et le grand nombre de minima locaux de la surface multidimensionnelle de la fonction de coût.

Concernant la bande ν_2 , le processus d’optimisation est similaire, bien que la congestion et la faible intensité des raies rovibrationnelles de ν_2 ont rendu l’analyse plus difficile que pour la bande ν_5 . En effet, la plupart des raies sont mélangées et proches de l’amplitude

du bruit ce qui a compliqué la localisation du minimum global l'hypersurface de la fonction de coût en raison d'un nombre de minima locaux plus importants. De plus, en supprimant des parties du spectre contenant les raies de SO_2 les plus intenses, de nombreuses raies de SOCl_2 superposées ont également été supprimées. Pour ces raisons, les intervalles de valeur des constantes de rotation ont été choisies plus étroites que pour la bande ν_5 (voir table 3.5) et les transitions expérimentales ont été ajustées pour $J_{max} = 80$. Les intervalles sont également centrés sur les valeurs calculées à partir des équations 3.1 et 3.2. Une amélioration

TABLE 3.5 – Paramètres libérés et leur intervalle de liberté pour l'isotopologue [32, 16, 35, 35] de la bande ν_2 .

isotopologue 1	Intervalle		isotopologue 2	Intervalle	
	cm^{-1}	MHz		cm^{-1}	MHz
Centre de bande	0.2	6000	Centre de bande	0.2	6000
A	0.0006	18	A	0.0006	18
B	0.0006	18	B	0.0006	18
C	0.0006	18	C	0.0006	18

des constantes rotationnelles du centre de bande a été obtenue pour [32, 16, 35, 35] après 148 minutes de calculs. L'évolution de la fonction de coût est présenté en figure 3.10 avec une évolution faible mais suffisante de 35.94 à 31.450.




FIGURE 3.10 – Evolution de la fonction de coût du meilleur individu de chaque génération pour la bande ν_2 de [32, 16, 35, 35].

3.4.4 Analyse subséquente de [32, 16, 35, 35] par diagrammes de Loomis-Wood

Afin de déterminer expérimentalement les constantes moléculaires de l'Hamiltonien effectif complet en ajustant les constantes de distorsion centrifuge, une analyse traditionnelle raie-par-raie subséquente a été nécessaire en utilisant les diagrammes de Loomis-Wood et SP-FIT/SPCAT. Concernant la bande ν_5 , des exemples de diagrammes de Loomis-Wood générés à l'aide du programme LWWa[98] sont présentés en figure 3.11 pour deux branches ${}^qP(3)$ et ${}^qR(3)$ à chaque étape de l'analyse. Dans les figures 3.11 (a) et (b), les constantes de rotation sont estimées à partir des équations 3.1 et 3.2, de nombreuses séries se distinguent mais la bonne affectation, identifiée respectivement par les couleurs magenta et orange, n'est pas évidente. Les figures 3.11 (c) et (d) résultent de l'optimisation globale par les AEs, l'accord est visible entre les transitions calculées et expérimentales mais un écart entre la ligne verticale centrale et les triangles expérimentaux pour les valeurs élevées de J'' nécessite une amélioration des constantes de distorsion centrifuge. Enfin, les figures 3.11 (e) et (f) sont obtenus à partir des constantes moléculaires finales et démontrent l'importance du raffinement des termes de distorsion centrifuge dans l'analyse raie-par-raie.

Les constantes moléculaires de l'isotopologue principal issues de l'analyse raie-par-raie sont présentées dans la table 3.8). Les constantes de distorsion centrifuge sont déterminées jusqu'à l'ordre sextique et la déviation standard adimensionnée IR est de 0.645, celle-ci indique que l'erreur expérimentale de 0.00015 cm^{-1} est légèrement surestimée.

De façon analogue, la bande ν_2 a été analysée pour l'isotopologue [32, 16, 35, 35] via les diagrammes de Loomis-Wood afin d'atteindre la précision expérimentale. Les constantes moléculaires de [32, 16, 35, 35] de la bande ν_2 obtenues après l'analyse raie-par-raie sont présentées dans la table 3.9. La déviation standard adimensionnée IR de 0.856 indique que la précision de l'ajustement a atteint l'erreur expérimentale, et les constantes de distorsion centrifuge ont été déterminées jusqu'à l'ordre quartique. En comparaison avec la bande ν_5 , la bande ν_2 était plus congestionnée et les raies moins intenses, limitant l'analyse aux transitions à $J_{max} = 87$ et $K_{a \ max} = 15$ (voir table 3.9).




FIGURE 3.11 – Diagrammes de Loomis-Wood des branches ${}^9P(3)$ (triangles magenta à gauche) et ${}^9R(3)$ (triangles oranges à droite) pour chaque étape de l’analyse de l’isotopologue principal [32, 16, 35, 35] de la bande ν_5 . Les triangles noirs correspondent aux transitions attribuées de [32, 16, 35, 35] et les triangles vides aux transitions non attribuées. (a) et (b) sont créés à partir des constantes rotationnelles estimées par les équations 3.1 et 3.2, (c) et (d) donnent les diagrammes après l’étape d’optimisation globale des AEs et (e) et (f) sont créés à partir des constantes moléculaires expérimentales après l’analyse raie-par-raie finale. .

3.4.5 Centre de bande et constantes rotationnelles de [32, 16, 35, 37]

Pour le deuxième isotopologue [32, 16, 35, 37], une deuxième procédure d'optimisation globale du centre de bande et des constantes de rotation a été nécessaire. Ici, tous les paramètres associés à [32, 16, 35, 35] ont été fixés aux valeurs obtenues par l'analyse raie-paraie précédente. Le centre des intervalles a été estimé à partir des constantes de rotation [32, 16, 35, 37] affinées en mettant à l'échelle les constantes expérimentales de l'état fondamental $[A, B, C]_{\text{exp.}}^{G.S.}$ de [32, 16, 35, 37] avec le facteur $\mathcal{F}_{\text{scaling}}^{exp.}$, rapport des constantes rotationnelles expérimentales de l'état fondamental et des états excités de [32, 16, 35, 35] :

$$[A, B, C]_{\text{refined}}^{(v)} [35, 37] = [A, B, C]_{\text{exp.}}^{G.S.} [35, 37] \times \mathcal{F}_{\text{scaling}}^{exp.}, \quad (3.3)$$

avec

$$\mathcal{F}_{\text{scaling}}^{exp.} = \frac{[A, B, C]_{\text{exp.}}^{(v)} ([35, 35])}{[A, B, C]_{\text{exp.}}^{G.S.} ([35, 35])}. \quad (3.4)$$

Pour les mêmes raisons que pour l'isotopologue [32, 16, 35, 35], les constantes de distorsion centrifuge de [32, 16, 35, 37] de l'état excité ont été maintenues fixées sur les valeurs de l'état fondamental de [32, 16, 35, 37].

Concernant la bande ν_5 , les intervalles utilisés pour les constantes rotationnelles de l'état excité de [32, 16, 35, 37] sont indiqués en table 3.6. L'intervalle du centre de bande de [32, 16, 35, 37] a été choisi à 0.8 cm^{-1} autour la branche Q observée et a également été divisé en plusieurs sous-intervalles de 0.04 cm^{-1} . Une bonne détermination des constantes

TABLE 3.6 – Paramètres libérés et leur intervalle de liberté pour l'isotopologue [32, 16, 35, 37] de la bande ν_5 .

isotopologue 1	Intervalle cm^{-1}	isotopologue 2	Intervalle cm^{-1} MHz	
Centre de bande	fixé	Centre de bande	multirun	
A	fixé	A	0.0002	6
B	fixé	B	0.0002	6
C	fixé	C	0.0002	6

de rotation et du centre de bande a été obtenue pour [32, 16, 35, 37] après 10 heures d'optimisation. L'évolution de la fonction de coût de 50.70 à 39.94 est présenté en figure 3.12.

Pour la bande ν_2 , les intervalles de valeurs utilisés dans la deuxième procédure d'optimisation sont donnés en table 3.7. Ces intervalles sont centrés sur les valeurs calculées à partir des équations 3.3 et 3.4. Une amélioration du centre de bande a été obtenue pour [32, 16, 35, 37] après 142 minutes de calculs, cependant il n'a pas été possible d'améliorer les constantes




FIGURE 3.12 – Evolution de la fonction de coût du meilleur individu de chaque génération pour la bande ν_5 de [32, 16, 35, 37].

TABLE 3.7 – Paramètres libérés et leur intervalle de liberté pour l'isotopologue [32, 16, 35, 37] de la bande ν_2 .

isotopologue 1	Intervalle cm^{-1}	isotopologue 2	Intervalle	
			cm^{-1}	MHz
Centre de bande	fixé	Centre de bande	0.1	3000
A	fixé	A	0.0002	6
B	fixé	B	0.0002	6
C	fixé	C	0.0002	6

rotationnelles malgré des intervalles de seulement 6 MHz. L'évolution de la fonction de coût de cet ajustement est présenté en figure 3.13 avec une évolution de 33.27 à 30.58.




FIGURE 3.13 – Evolution de la fonction de coût du meilleur individu de chaque génération pour la bande ν_2 de [32, 16, 35, 37].

3.4.6 Analyse subséquente de [32, 16, 35, 37] par diagrammes de Loomis-Wood

Comme pour l'isotopologue [32, 16, 35, 35], le centre de bande et les constantes de rotation des l'état $v_5 = 1$ de l'isotopologue [32, 16, 35, 37] obtenus par les AEs ont été suffisamment bien optimisés pour compléter l'analyse en utilisant les diagrammes de Loomis-Wood. Les constantes moléculaires expérimentales issues de l'analyse subséquente raie-par-raie sont présentées dans la table 3.8. Bien que les constantes de distorsion centrifuge aient pu être déterminées jusqu'à l'ordre sextique pour l'isotopologue [32, 16, 35, 35], les termes de distorsion centrifuge sont limités à l'ordre quartique pour l'isotopologue [32, 16, 35, 37] car les transitions rovibrationnelles observées n'impliquent pas de valeurs de K_a aussi élevées ($K''_{a \max} = 17$). La déviation standard IR est très proche de l'erreur expérimentale et la déviation standard adimensionnée IR est très proche de 1, ce qui indique que le modèle théorique est ajusté à la précision expérimentale.

TABLE 3.8 – Paramètres ajustés dans l'analyse IRL de la bande ν_5 pour les deux isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37]. Les incertitudes 1σ [163] sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le nombre N d'attributions expérimentales, les valeurs maximales de J''_{\max} et de $K''_{a \max}$ et les déviations standard IR sont indiquées. Tous les paramètres sont donnés en MHz à l'exception des centres de bande et des déviations standards.

	ν_5	
	[32, 16, 35, 35]	[32, 16, 35, 37]
ν	13785076.733(166)	13732558.918(193)
ν / cm^{-1}	459.8206648(55)	458.0688590(64)
A	5072.60485(149)	5030.3899(107)
B	2809.80863(48)	2736.64241(225)
C	1952.108147(177)	1910.689111(106)
$D_J \times 10^3$	1.107866(125)	1.11310(116)
$D_{JK} \times 10^3$	-2.27428(99)	-4.503(41)
$D_K \times 10^3$	7.0492(32)	13.481(116)
$\delta_J \times 10^3$	0.392099(67)	0.39937(58)
$\delta_K \times 10^3$	1.37609(52)	0.4549(162)
$\Phi_J \times 10^9$	0.3298(188)	
$\Phi_{JK} \times 10^6$	0.007092(153)	
$\Phi_{JKK} \times 10^6$	-0.04437(74)	
$\Phi_K \times 10^6$	0.05422(189)	
$\phi_J \times 10^9$	0.2038(96)	
$\phi_{JK} \times 10^9$	2.927(94)	
$\phi_K \times 10^6$	0.02314(45)	
N	2925	1532
J''_{\max}	114	125
$K''_{a \max}$	37	17
Déviation standard IR $/\text{cm}^{-1}$	0.00010	0.00014
Déviation standard IR adimensionnée	0.645	0.938

Pour la bande ν_2 , la situation est différente. Les constantes rotationnelles de [32, 16, 35, 37] obtenues avec les AEs n'ont pas été suffisamment optimisées pour être utilisées. Les constantes affinées $[A, B, C]_{\text{refined}}^{(v_2=1)}$ des équations 3.3 et 3.4 ont donc été utilisées avec le centre de bande

ajusté par les AEs pour démarrer l'analyse raie-par-raie. Les constantes moléculaires finales de [32, 16, 35, 37] de la bande ν_2 sont présentées dans la table 3.9. Les constantes de distorsion centrifuge ont été déterminées jusqu'à l'ordre quartique et la déviation standard adimensionnée IR de 0.940 indique que l'ajustement des données est très proche de l'erreur expérimentale. On note également que la fonction de coût calculée avec les paramètres expérimentaux finaux de [32, 16, 35, 37] est légèrement supérieure à celle donnée par l'optimisation globale, ce qui peut expliquer pourquoi les constantes rotationnelles n'ont pas pu être ajustées dans l'optimisation globale. Le minimum global de la fonction de coût ne correspond donc pas au spectre de [32, 16, 35, 37], ce qui peut s'expliquer par les mélange des raies de [32, 16, 35, 37] avec SO_2 et la congestion globale des raies observées.

TABLE 3.9 – Paramètres ajustés dans l'analyse IRL de la bande ν_2 pour les deux isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37]. Les incertitudes 1σ [163] sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le nombre N d'attributions expérimentales, les valeurs maximales de J''_{\max} et de $K''_{a\max}$ et les déviations standard IR sont indiquées. Tous les paramètres sont donnés en MHz à l'exception des centres de bande et des déviations standards.

	ν_2	
	[32, 16, 35, 35]	[32, 16, 35, 37]
ν	14992447.162(208)	14940637.482(298)
ν / cm^{-1}	500.0942072(69)	498.3660223(100)
A	5083.3117(90)	5042.5749(238)
B	2823.40404(212)	2749.4430(58)
C	1959.369498(167)	1917.742688(230)
$D_J \times 10^3$	1.03885(79)	0.8059(38)
$D_{JK} \times 10^3$	1.1666(144)	2.417(75)
$D_K \times 10^3$	-0.724(52)	2.053(279)
$\delta_J \times 10^3$	0.34477(40)	0.23412(192)
$\delta_K \times 10^3$	2.3996(65)	2.162(35)
N	1429	854
J''_{\max}	87	87
$K''_{a\max}$	15	12
Déviati on standard IR $/\text{cm}^{-1}$	0.00013	0.00014
Déviati on standard IR adimensionnée	0.856	0.940

3.4.7 Comparaison des spectres calculés/experimentaux dans l'IRL

Les spectres de [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37] des bandes ν_5 et ν_2 calculés à partir des paramètres des tables 3.8 et 3.9, respectivement, sont comparés avec le spectre expérimental dans les figures 3.14 et 3.15. Les motifs de chaque branche (P , Q , R) sont bien reproduits, on note qu'une partie des nombreuses raies faibles non prédites par les paramètres de ν_2 appartiennent à SO_2 .




FIGURE 3.14 – (a) Spectre expérimental (noir) et spectres calculés de la bande ν_5 pour les deux isotopologues les plus abondants [32, 16, 35, 35] (bleu) et [32, 16, 35, 37] (rose). Le spectre rouge est le spectre global simulé pour les deux isotopologues. (b) Partie de la branche P . (c) Partie de la branche Q pour [32, 16, 35, 37]. (d) Partie de la branche Q pour [32, 16, 35, 35]. (e) Partie de la branche R .




FIGURE 3.15 – (a) Spectre expérimental (noir) et spectres calculés de la bande ν_2 band pour les deux isotopologues les plus abondants [32, 16, 35, 35] (bleu) et [32, 16, 35, 37] (rose). Le spectre rouge est le spectre global simulé pour les deux isotopologues. (b) Partie de la branche P . (c) Partie de la branche Q pour [32, 16, 35, 37]. (d) Partie de la branche Q pour [32, 16, 35, 35]. (e) Partie de la branche R .

3.4.8 Précision relative des paramètres

Afin de comparer les paramètres obtenus par les AEs avec ceux obtenus aux différentes étapes de l'analyse, la précision relative des paramètres a été quantifiée en utilisant un paramètre δ défini par :

$$\delta = \frac{|\text{expérience} - \text{calculé}|}{\text{expérience}}. \quad (3.5)$$

La précision relative des centres de bande et des constantes de rotation a été estimée à chaque étape, la comparaison des différentes valeurs obtenues est présenté en figure 3.16.

Pour les constantes de rotation de [32, 16, 35, 35] de $\nu_5 = 1$ de la figure 3.16(a), les AEs permettent d'atteindre une précision relative de plus de 10^{-4} alors que les valeurs MP2/6-311++G(3df,3pd) sont proche de 1%. L'efficacité des AEs est également remarquable pour l'estimation des centres de bandes rovibrationnelles (figure 3.16(e)) avec une amélioration de 3 ordres de grandeur par rapport aux valeurs initiales *ab initio* : une précision relative de 3×10^{-6} est atteinte pour le centre de bande ν_5 . Pour l'isotopologue [32, 16, 35, 35] de l'état $\nu_5 = 1$, l'évolution de la précision relative δ des constantes de rotation de la figure 3.16(c) n'est pas significative par rapport aux constantes affinées par l'équation 3.3, elle atteint toutefois plus de 10^{-4} . Quant au centre de bande, une amélioration significative est obtenue avec les AEs (3.16(e)).

Concernant les valeurs de δ pour les constantes de rotation de [32, 16, 35, 35] de $\nu_2 = 1$ (figure 3.16(b)), une nette amélioration est obtenue avec les AEs pour une précision relative autour de 10^{-4} . Pour [32, 16, 35, 37], les constantes de rotation estimées par l'équation 3.3 sont légèrement meilleures que celle obtenue par les AEs (3.16(d)), ce qui justifie leur utilisation pour démarrer l'analyse raie-par-raie au lieu des constantes optimisées par les AEs. Enfin, les centres de bande de ν_2 obtenus avec les AEs sont très proches des valeurs expérimentales avec des précisions relatives δ supérieures à 10^{-4} alors que la précision relative *ab initio* de [32, 16, 35, 35] est limitée à 1% (voir figure 3.16(f)). Les AEs permettent donc une très bonne détermination des centres de bande, cruciale pour démarrer l'attribution à l'aide des diagrammes de Loomis-Wood dans le cas de spectres très denses.

3.4.9 Pouvoir prédictif de la méthode de calcul CCSD(T)

Tous les calculs *ab initio* utilisés dans cette étude ont été faits au niveau MP2/6-311++G(3df,3pd) permettant une précision acceptable et un coût de calcul raisonnable pour des molécules de taille moyenne en utilisant des serveur de calculs accessibles.

Un meilleur accord quantitatif a été toutefois obtenu à un coût de calcul beaucoup plus élevé en utilisant des techniques de clusters couplés améliorées d'un traitement per-




FIGURE 3.16 – Évolution de la précision relative $\delta = |\text{expérience} - \text{calcul}| / \text{expérience}$ à chaque étape de l'analyse : calculé au niveau MP2/6-311++G(3df,3pd), estimé à partir de l'équation 3.1, affinée à partir l'équation 3.3, observé (à partir de l'intensité maximale de la branche Q dans le spectre expérimental) et obtenu par les EAs. δ est calculé pour chaque paramètre optimisé EA : constantes de rotation A , B , C et centres de bandes rovibrationnelles : (a) pour les constantes de rotation de [32, 16, 35, 35] de $v_5 = 1$, (b) pour les constantes de rotation de [32, 16, 35, 35] de $v_2 = 1$, (c) pour les constantes de rotation de [32, 16, 35, 37] de $v_5 = 1$, (d) pour les constantes de rotation de [32, 16, 35, 37] de $v_2 = 1$, (e) pour le centre de la bande des deux isotopologues de $v_5 = 1$ et (f) pour le centre de la bande des deux isotopologues de $v_2 = 1$.

turbatif de triple excitation CCSD(T) [164]. Les calculs CCSD(T) ont été réalisés par S. Thorwirth (Université de Cologne, Allemagne) à l'aide du programme C_{FOUR} et comparés aux constantes moléculaires de l'analyse rovibrationnelle présentée ici.

Les constantes de rotation calculées à partir des constantes d'interaction rotation-vibration CCSD(T)/cc-pV(Q+d)Z et les fréquences de vibration harmoniques et anharmoniques calculés au niveau CCSD(T)/cc-pV(T+d)Z sont résumées dans les tables 3.10 et 3.11 pour les deux isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37]. Les constantes de rotation des états $v_2 = 1$ et $v_5 = 1$ calculées avec cette méthode ont été comparées à celles déterminées par les AEs pour les isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37]. Dans le cas de $v_5 = 1$, les constantes de rotation déterminées par les AEs sont plus proches des valeurs expérimentales que les constantes CCSD(T). Par exemple, pour la constante de rotation A de $v_5 = 1$, la précision relative δ des AEs est supérieure d'un ordre de grandeur à celle des calculs CCSD(T). Concernant $v_2 = 1$, les calculs CCSD(T) et les AEs fournissent le même niveau de précision sur les constantes de rotation. Bien que la prédiction des constantes rotationnelles par la méthode CCSD(T) puisse être considérée plus ou moins compétitive avec les AEs, les méthodes de chimie quantique les plus avancées n'égalent pas les AEs pour la détermination des centres de bande. En effet, les précisions relatives obtenues pour les centres de bandes ν_2 et ν_5 des deux isotopologues sont améliorées de trois ordres de grandeur avec les AEs en comparaison avec les calculs CCSD(T).

TABLE 3.10 – Constantes d'interaction rotation-vibration *ab initio* α_i calculées au niveau CCSD(T)/cc-pV(Q+d)Z à l'aide du programme C_{FOUR}. Les constantes de rotation associées à chaque état $v_i = 1$ excité des isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37] ont été calculées en MHz en soustrayant les valeurs α des valeurs GS expérimentales : $A_i = A_0^{exp.} - \alpha_i$.

	[32, 16, 35, 35]			[32, 16, 35, 37]		
	$\alpha_i A$ (MHz)	$\alpha_i B$ (MHz)	$\alpha_i C$ (MHz)	$\alpha_i A$ (MHz)	$\alpha_i B$ (MHz)	$\alpha_i C$ (MHz)
$v_1 = 1$	9.28261125	0.57643643	0.88762055	9.13606835	0.54519679	0.84715879
$v_2 = 1$	3.09398114	-0.92695915	0.73047900	3.09226993	-0.94175523	0.70058529
$v_3 = 1$	7.33509350	5.93605724	1.55380218	7.22497133	5.70569126	1.51675910
$v_4 = 1$	-21.25337155	7.81908063	7.41187019	-20.87526600	7.52976664	7.14952588
$v_5 = 1$	14.39400520	12.57351189	8.09719487	14.17391957	12.22736983	7.86600250
$v_6 = 1$	11.55805290	-3.88185626	0.34123641	11.47839017	-3.72769086	0.40167103
	A_i	B_i	C_i	A_i	B_i	C_i
GS	5086.7483	2822.5301	1960.3139	5044.3671	2748.9423	1918.6579
$v_1 = 1$	5077.4657	2821.9537	1959.4263	5035.2310	2748.3971	1917.8107
$v_2 = 1$	5083.6543	2823.4571	1959.5834	5041.2748	2749.8841	1917.9573
$v_3 = 1$	5079.4132	2816.5940	1958.7601	5037.1421	2743.2366	1917.1411
$v_4 = 1$	5108.0017	2814.7110	1952.9020	5065.2424	2741.4125	1911.5084
$v_5 = 1$	5072.3543	2809.9566	1952.2167	5030.1932	2736.7149	1910.7919
$v_6 = 1$	5075.1902	2826.4120	1959.9727	5032.8887	2752.6700	1918.2562

TABLE 3.11 – Modes de vibration harmonique et anharmonique des isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37] calculés avec le programme C_{FOUR} au niveau CCSD(T)/cc-pV(T+d)Z.

Mode de vibration	[32, 16, 35, 35]			[32, 16, 35, 37]		
	E _{harm} cm ⁻¹	E _{anharm} cm ⁻¹	Intensité km/mole	E _{harm} cm ⁻¹	E _{anharm} cm ⁻¹	Intensité km/mole
ν_4 Cisaillement SCl ₂	192	190	0.05	190	187	0.05
ν_6 Balancement SCl ₂	283	280	3	281	279	3
ν_3 Hochement SCl ₂	354	342	8	344	340	8
ν_5 élongation antisym. SCl ₂	461	456	170	459	454	166
ν_2 élongation sym. SCl ₂	501	496	71	499	494	73
ν_1 élongation SO	1276	1259	142	1276	1259	147

3.5 Analyse complémentaire du spectre submillimétrique

Les nouvelles données recueillies pour les bandes ν_2 et ν_5 ont permis de prédire les transitions de rotation pure dans les états vibrationnels excités $v_2 = 1$ et $v_5 = 1$ avec une grande précision. Le spectre submillimétrique de SOCl_2 publié dans [155] est un spectre d'absorption mesuré en modulation 2F à température ambiante en utilisant la chaîne de multiplication de fréquence du LPCA. L'échantillon de SOCl_2 injecté dans la cellule avec un flux continu de 15 μbar maintenu par le groupe de pompage à travers la cellule d'absorption en simple passage a été sondé dans la gamme 70–110 et 140–660 GHz à l'aide du bolomètre InSb refroidi à l'He liquide. Une fréquence de modulation de 11 kHz a été utilisée avec une profondeur de modulation de 60 kHz délivrée par le synthétiseur, une constante de temps de 10 ms et un pas de 100 kHz. Dans une étude précédente [155], les transitions de rotation pure des trois isotopologues les plus abondants [32, 16, 35, 35], [32, 16, 35, 37], et [32, 16, 37, 37] ont été attribuées dans l'état fondamental, les états de vibration excités $v_3 = 1$ et $v_6 = 1$ ont également été attribués pour [32, 16, 35, 35]. Dans cette nouvelle étude, les transitions de rotation pures de [32, 16, 35, 35] dans les états de vibration excités $v_2 = 1$ et $v_5 = 1$ ont pu être identifiées. De plus, l'état $v_4 = 1$ dont la bande rovibrationnelle n'est quasiment pas active dans l'IRL, a pu être analysé dans le domaine submillimétrique. L'analyse a été effectuée à l'aide de ASCP/SVIEW et SPFIT/SPCAT permettant 5172, 2517 et 662 attributions pour les états $v_4 = 1$, $v_5 = 1$ et $v_2 = 1$, respectivement. L'ensemble des paramètres moléculaires des états $v_5 = 1$, $v_2 = 1$ et $v_4 = 1$ résultant de l'analyse sont présentés dans la table 3.12. Pour l'ensemble des états étudiés, la déviation standard sur les données submillimétriques se situe autour de l'erreur expérimentale de 100 kHz, ce qui se traduit par une déviation standard adimensionnée proche de 1 (voir table 3.12). Cette analyse a permis de sonder des transitions avec des valeurs J et K_a plus élevées que dans l'IRL, améliorant ainsi les paramètres obtenus à partir de l'analyse rovibrationnelle de $v_5 = 1$ et $v_2 = 1$ de [32, 16, 35, 35] (voir table 3.8 et 3.9). On note que les déviations standard IR de l'étude rovibrationnelle des états

$v_5 = 1$ et $v_2 = 1$ n'ont pas été détériorées par l'ajout des nouvelles données submillimétriques. Par ailleurs, le centre de bande de $v_4 = 1$ n'a pas été déterminé expérimentalement car le spectre de rovibration de v_4 était trop faible pour être mesuré dans l'IRL. Néanmoins, l'analyse submillimétrique du spectre de rotation pure dans l'état excité $v_4 = 1$ a permis de déterminer les constantes de rotation avec un degré de précision similaire aux autres bandes, et contrairement aux états $v_6 = 1$ et $v_3 = 1$ où les constantes de distorsion étaient limitées à l'ordre sextique, le terme octique L_K a dû être ajusté pour $v_4 = 1$. Enfin, il n'a pas été possible d'attribuer les transitions de rotation pure dans les états vibrationnellement excités des isotopologues moins abondants en raison d'une intensité trop faible.

TABLE 3.12 – Résumé des paramètres ajustés à partir des données rotationnelles et rovibrationnelles de [32, 16, 35, 35]. Les incertitudes 1σ [163] sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le nombre N d'attributions expérimentales, les valeurs maximales de J''_{\max} et de $K''_{a\max}$ et les déviations standard IR sont indiquées. Tous les paramètres sont donnés en MHz à l'exception des centres de bande et des déviations standards.

	ν_4	ν_5	ν_2
ν	[5810457.503]	13785076.908(114)	14992446.403(214)
ν / cm^{-1}	[193.816]	459.8206706(38)	500.0941819(71)
A	5108.588988(154)	5072.603864(181)	5083.20984(39)
B	2814.471870(78)	2809.806675(142)	2823.42643(32)
C	1952.767488(93)	1952.107746(127)	1959.372070(226)
$D_J \times 10^3$	1.1177627(148)	1.1075380(296)	1.060820(66)
$D_{JK} \times 10^3$	-2.218849(64)	-2.278275(118)	0.928374(224)
$D_K \times 10^3$	7.152212(149)	7.059216(126)	-0.843020(307)
$\delta_J \times 10^3$	0.3942978(66)	0.3919922(143)	0.355380(33)
$\delta_K \times 10^3$	1.314005(64)	1.376396(130)	2.361660(301)
$\Phi_J \times 10^9$	0.40072(99)	0.28576(234)	8.0886(59)
$\Phi_{JK} \times 10^6$	0.0063842(104)	0.0074521(271)	-0.100477(65)
$\Phi_{JKK} \times 10^6$	-0.0449768(287)	-0.048894(79)	-0.045991(191)
$\Phi_K \times 10^6$	0.064268(61)	0.064684(57)	0.016573(138)
$\phi_J \times 10^9$	0.22127(50)	0.18548(123)	4.01900(312)
$\phi_{JK} \times 10^9$	1.4046(79)	3.2571(195)	-18.391(50)
$\phi_K \times 10^6$	0.0191803(304)	0.023082(92)	-0.044366(220)
$L_K \times 10^{12}$	-0.2399(70)		
N	5172	5442	2091
J''_{\max}	106	114	90
$K''_{a\max}$	64	60	60
Déviations standard submm /MHz	0.091316	0.136071	0.168047
Déviations standard IR / cm^{-1}		0.00010	0.00013
Déviations standard adimensionnée	0.91316	0.95480	1.08982

La contribution de chaque état dans le spectre submillimétrique est représentée dans la figure 3.17(a). Des comparaisons entre les spectres expérimentaux et calculés sont présentées dans la figure 3.17(b) pour deux gammes de fréquences : 255-295 GHz (gauche) et 273.5-274.5 GHz (droite). Les nouvelles attributions sont marquées avec des triangles dans le spectre bâton (figure 3.17(b)). On note que les états $v_5 = 1$ et $v_2 = 1$ sont significativement plus faibles en intensité que les autres états en raison de leur distribution de Boltzmann à $T=293\text{K}$ (voir table 3.2).




FIGURE 3.17 – (a) Spectre submillimétrique expérimental du chlorure de thionyle (en noir) et toutes les contributions individuelles expérimentales considérées dans l’analyse. (b) Comparaison entre le spectre expérimental (en noir), la simulation théorique globale (en rouge) et les contributions individuelles (la couleur de chaque contribution est en accord avec la figure (a)). Les triangles sur le spectre bâton 273.5-274.5 GHz permettent d’identifier les nouvelles attributions de cette étude.

3.6 Ajustement global de SOCl₂

Un ajustement global des données a été réalisé pour chaque isotopologue en incluant les attributions des études précédentes [152, 155, 156, 157, 158, 159, 160] ainsi que les nouvelles données. La table 3.13 résume l'origine des différentes données utilisées.

TABLE 3.13 – Origine des données utilisées dans l'ajustement global.

Ref.	[32, 16, 35, 35]	[32, 16, 35, 37]
[159]	G.S. ← G.S.	
[160]	G.S. ← G.S.	G.S. ← G.S.
[157]		G.S. ← G.S.
[156]		G.S. ← G.S.
[158]	G.S. ← G.S.	
[152]	v ₃ ← G.S., v ₆ ← G.S.	
[155]	G.S. ← G.S., v ₃ ← v ₃ , v ₆ ← v ₆ ,	G.S. ← G.S., v ₃ ← G.S.
	v ₃ ← G.S., v ₆ ← G.S.	v ₆ ← G.S.
Ce travail	v ₂ ← v ₂ , v ₅ ← v ₅ , v ₄ ← v ₄ ,	v ₂ ← G.S., v ₅ ← G.S.
	v ₂ ← G.S., v ₅ ← G.S.	

Les ajustements globaux incluent 38910 et 15258 transitions expérimentales avec 104 et 54 paramètres pour [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37], respectivement. L'ensemble des paramètres correspondant à ces ajustements est présenté dans la table 3.14.

L'ajustement global de l'ensemble des données ne détériore ni la déviation standard des ajustements individuels de chaque état, ni la précision de leurs paramètres. Dans la figure 3.18, les niveaux d'énergie rovibrationnels de [32, 16, 35, 35] ont été calculés jusqu'à $J = 80$ à partir des paramètres de la table 3.14. Les fréquence de vibration de deux bandes de combinaison $\nu_4 + \nu_6 = 474.017 \text{ cm}^{-1}$ et $2\nu_4 = 387.023 \text{ cm}^{-1}$ calculées au niveau anharmonique MP2/6-311++G(3df,3pd) sont indiquées. Pour les bandes fondamentales, les lignes pleines représentent l'énergie des équilibres relatifs, c'est à dire l'énergie des axes stationnaires classiques de rotation [165, 166, 167]. La figure 3.18 montre qu'un chevauchement entre les niveaux d'énergie des différentes bandes commence à apparaître pour $J > 20$. Néanmoins, toutes les transitions expérimentales ont pu être ajustées sans tenir compte d'interactions de Coriolis ou de Fermi entre les bandes fondamentales et les bandes de combinaison. En effet, les diagrammes de Loomis-Wood utilisés pour attribuer les raies rovibrationnelles ne présentent pas de signature d'interaction possible. Cependant, dans la table 3.14, nous pouvons immédiatement remarquer que les constantes de distorsion à l'ordre quartique et sextique sont très proches des valeurs de l'état fondamental pour tous les modes vibratoires excités sauf pour $v_2 = 1$ où plusieurs constantes de distorsion sont assez différentes. Cela suggère que la vibration d'élongation symétrique SCl est plus fortement couplée à la rotation par rapport aux autres modes de vibration. La possibilité d'une interaction avec un autre état ne peut pas être totalement exclue et $\nu_4 + \nu_6$ est le niveau le plus proche de ν_2 , mais nous n'avons

TABLE 3.14 – Résumé des paramètres de l'ajustement global à partir de l'ensemble des données rotationnelles et rovibrationnelles de la table 3.13, les valeurs entre crochets ont été reliées aux valeurs de l'état fondamental dans l'ajustement. Les incertitudes 1σ [163] sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le nombre N d'attributions expérimentales, les valeurs maximales de J''_{\max} et de $K''_{a\max}$ et les différentes déviations standard sont indiquées. Tous les paramètres (sauf indication contraire) sont donnés en MHz. Pour ν_4 , le centre de bande de l'isotopologue [32, 16, 35, 35] a été fixé sur la valeur anharmonique MP2/6-311++G(3df,3pd). Enfin, il n'a pas été possible d'identifier l'isotopologue [32, 16, 35, 37] dans le spectre submillimétrique, c'est pourquoi aucun paramètre n'est indiqué.

		[32, 16, 35, 35]				
	GS	ν_4	ν_6	ν_3	ν_5	ν_2
ν		[5810457.503]	8505880.092(93)	10371817.238(93)	13785076.825(119)	14992446.406(195)
ν / cm^{-1}		[193.816]	283.7256197(31)	345.9665833(31)	459.8206678(40)	500.0941820(63)
A	5086.7482538(117)	5108.588988(168)	5074.500612(147)	5079.016861(138)	5072.603762(188)	5083.20983(36)
B	2822.5300707(108)	2814.471870(84)	2826.464556(83)	2816.388811(88)	2809.806700(147)	2823.426440(293)
C	1960.3139092(89)	1952.767488(101)	1959.792902(84)	1958.578914(97)	1952.107813(133)	1959.372087(206)
$D_J \times 10^3$	1.1251411(35)	1.1177627(161)	1.1345716(148)	1.1250666(173)	1.1075441(309)	1.060820(60)
$D_{JK} \times 10^3$	-2.2267518(265)	-2.218849(70)	-2.199020(73)	-2.236782(69)	-2.278293(122)	0.928383(204)
$D_K \times 10^3$	6.987419(74)	7.152212(162)	6.900814(118)	7.000837(112)	7.059185(131)	-0.843033(280)
$\delta_J \times 10^3$	0.39436937(157)	0.3942978(72)	0.3956810(74)	0.3933108(91)	0.3919906(149)	0.3553806(297)
$\delta_K \times 10^3$	1.248369(34)	1.314005(70)	1.249262(70)	1.238510(90)	1.376406(135)	2.361658(274)
$\Phi_J \times 10^9$	0.417539(303)	0.40072(107)	0.42668(98)	0.40195(122)	0.28617(245)	8.0885(53)
$\Phi_{JK} \times 10^6$	0.0056633(62)	0.0063842(113)	0.0053979(114)	0.0055910(141)	0.0074508(283)	-0.100479(59)
$\Phi_{KK} \times 10^6$	-0.0415658(193)	-0.0449768(312)	-0.0413109(312)	-0.040152(42)	-0.048894(82)	-0.045983(174)
$\Phi_K \times 10^6$	0.059657(33)	0.064268(67)	0.059133(43)	0.058436(46)	0.064680(59)	0.016567(126)
$\phi_J \times 10^9$	0.222193(143)	0.22127(55)	0.21879(53)	0.21572(69)	0.18537(128)	4.01904(284)
$\phi_{JK} \times 10^9$	1.2010(40)	1.4046(86)	1.1099(86)	1.1083(112)	3.2578(204)	-18.391(45)
$\phi_K \times 10^6$	0.0170029(200)	0.019180(33)	0.0173419(311)	0.015719(48)	0.023082(96)	-0.044376(200)
$L_K \times 10^{12}$	-0.1806(43)	-0.2399(77)	[-0.1806]	[-0.1806]		
N	9363	5172	7760	9082	5442	2091
Déviations standard		submm : 0.100017 MHz / IR : 0.00012 cm^{-1} / adimensionnée : 0.99313				
		[32, 16, 35, 37]				
	GS	ν_4	ν_6	ν_3	ν_5	ν_2
ν			8455900.87(41)	10316192.76(35)	13732558.936(216)	14940637.49(33)
ν / cm^{-1}			282.058492(13)	344.111150(11)	458.0688596(72)	498.366023(11)
A	5044.367089(127)		5032.28214(169)	5036.6866(58)	5030.3903(118)	5042.5748(262)
B	2748.942296(60)		2752.44067(48)	2742.96417(123)	2736.64237(248)	2749.4430(64)
C	1918.657984(64)		1918.70317(32)	1916.957178(295)	1910.689110(124)	1917.742719(258)
$D_J \times 10^3$	1.0725459(100)		1.135913(37)	1.092708(243)	1.11303(128)	0.8059(42)
$D_{JK} \times 10^3$	-2.133234(44)		-2.19409(33)	-2.2426(39)	-4.501(45)	2.417(82)
$D_K \times 10^3$	6.868634(127)		6.82413(148)	6.9735(206)	13.476(129)	2.053(307)
$\delta_J \times 10^3$	0.3734161(46)		0.3963764(230)	0.393767(126)	0.39934(64)	0.23412(211)
$\delta_K \times 10^3$	1.230534(47)		1.255594(263)	1.24102(207)	0.4557(179)	2.162(39)
$\Phi_J \times 10^9$	0.38234(61)		[0.38234]	[0.38234]		
$\Phi_{JK} \times 10^6$	0.0054106(77)		[0.0054106]	[0.0054106]		
$\Phi_{KK} \times 10^6$	-0.0397888(230)		[-0.0397888]	[-0.0397888]		
$\Phi_K \times 10^6$	0.058070(54)		[0.058070]	[0.058070]		
$\phi_J \times 10^9$	0.203364(314)		[0.203364]	[0.203364]		
$\phi_{JK} \times 10^9$	1.1677(55)		[1.1677]	[1.1677]		
$\phi_K \times 10^6$	0.0167413(243)		[0.0167413]	[0.0167413]		
$L_K \times 10^{12}$	-0.2216(64)		[-0.2216]	[-0.2216]		
N	7770		2498	2604	1532	854
Déviations standard		submm : 0.090167 MHz / IR : 0.000292 cm^{-1} / adimensionnée : 1.03556				

trouvé aucune preuve de cette perturbation.




FIGURE 3.18 – Énergies rovibrationnelles calculées pour l'état fondamental et les bandes de ro vibration ν_2 , ν_3 , ν_4 , ν_5 et ν_6 de [32, 16, 35, 35] pour $J_{max} = 80$. Pour plus de visibilité, nous n'avons pas tracé les énergies rovibrationnelles E mais les énergies réduites $E - B^{(v)}J(J + 1)$. Chaque bande est calculée à partir de sa propre constante de rotation effective $B^{(v)}$. Les niveaux rouges correspondent aux niveaux d'énergie impliqués dans des transitions attribuées. Les courbes représentent l'énergie des axes de rotation stationnaires classiques (équilibres relatifs). Les deux niveaux verts représentent les niveaux d'énergie des bandes de combinaison $\nu_4 + \nu_6$ (474.017 cm^{-1}) et harmonique $2\nu_4$ (387.023 cm^{-1}) calculées au niveau anharmonique MP2/6-311++G(3df,3pd) [152].

3.7 Conclusions

Les spectres rovibrationnels des bandes ν_2 et ν_5 de SOCl_2 mesurés dans la région 420 cm^{-1} – 550 cm^{-1} en utilisant le spectromètre IRL-TF et la source synchrotron de la ligne AILES du synchrotron SOLEIL ont été analysés malgré la forte densité de raies et la présence de la bande fondamentale ν_2 de SO_2 produite par l'hydrolyse de SOCl_2 avec l'eau résiduelle de la cellule. La stratégie a consisté à utiliser les AEs dans un premier temps pour ajuster les constantes de rotation et le centre de bande de l'état excité en maximisant la correspondance entre les spectres expérimentaux et calculés. Les paramètres obtenus étaient suffisamment bien déterminés pour être utilisés comme valeurs de départ dans l'analyse raie-par-raie traditionnelle par diagrammes de Loomis-Wood (LWWa). En plus d'un gain de temps obtenu par les AEs, ces deux approches sont complémentaires et deviennent très performantes pour l'analyse de spectres très congestionnés. L'analyse complémentaire du spectre submillimétrique de rotation pure [155] a permis non seulement d'affiner les constantes moléculaires pour $v_2 = 1$ et $v_5 = 1$ de [32, 16, 35, 35] mais aussi d'analyser l'état vibrationnel $v_4 = 1$ quasi-inactif dans l'IRL. Un ajustement global incluant l'ensemble des données micro-onde, submillimétriques et infrarouge lointain du chlorure de thionyle a été effectué et n'a révélé aucune résonance majeure dans les niveaux d'énergie de [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37]. En plus de l'analyse globale des modes de vibration fondamentaux de SOCl_2 , cet étude a mis en évidence une méthode particulièrement efficace pour démêler une analyse difficile dans des spectres de haute résolution-rovibration très congestionnés. Même avec la méthode CCSD(T), le calcul des fréquences vibrationnelles anharmoniques ne permettent pas d'atteindre le niveau de précision obtenu par la procédure EA. Concernant les constantes de rotation, la précision relative δ obtenue avec les AEs dans les états $v_2 = 1$ et $v_5 = 1$ des isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37] montre qu'ils sont compétitifs avec le plus haut niveau de théorie des méthodes de chimie quantique. Par ailleurs, l'analyse du mode ν_1 symétrique (A') correspondant au mode d'élongation SO et calculé à 1259 cm^{-1} au niveau anharmonique CCSD(T)/cc-pV(T+d)Z reste à mesurer dans la région IRM. Une connaissance globale du spectre IR comprenant les bandes harmoniques et mixtes pourrait être obtenue par la construction d'une surface d'énergie potentielle en six dimensions de SOCl_2 .

Enfin, cette étude est un premier pas vers l'automatisation de l'analyse des spectres de rotation pure et de rovibration. Plusieurs pistes de recherche sont possible. Tout d'abord, il faudrait explorer les possibilités d'améliorer l'utilisation des AEs en collaboration avec l'équipe OSME (Optimisation, Simulation, Modélisation Evolutionnaire) du LISIC de l'Université du Littoral Côte d'Opale, spécialisée dans le développement de ce type d'algorithmes. Par ailleurs, l'Hamiltonien interne du programmes ga contenant les AEs ne permet pas de

traiter tous les effets moléculaires. Bien que j'ai pu participer à l'implémentation du Hamiltonien de type Watson en réduction S et des constantes de distorsion centrifuge d'ordre sextique, de nombreux effets restent à implémenter comme par exemple le traitement de la rotation interne dans le cas de barrière de potentiel moyenne ou basse ou le couplage nucléaire quadrupolaire.

Chapitre 4

Spectroscopie rotationnelle des nitrotoluènes : vers la détection haute-résolution de marqueurs/vapeurs d'explosifs.

Sommaire

4.1	Introduction générale	132
4.2	Méthodes expérimentales et méthodes de calculs	135
4.2.1	Propriétés spectroscopiques des mono-nitrotoluènes	135
4.2.2	Méthodes expérimentales	137
4.2.3	Calculs de chimie quantique	145
4.3	Résultats et discussions spécifiques au 3-NT	151
4.3.1	Analyse du spectre micro-onde refroidi par jet moléculaire	151
4.3.2	Analyse du spectre millimétrique à température ambiante	152
4.3.3	Constantes de couplage nucléaire quadrupolaire	158
4.3.4	Potentiel de rotation interne	160
4.3.5	Limites du modèle théorique	162
4.4	Influence de l'isomérisie : étude préliminaire des 2-NT et 4-NT .	167
4.4.1	Analyse préliminaire des spectre millimétriques à température ambiante	168
4.4.2	Influence de l'isomérisie sur le potentiel de rotation interne	171
4.5	Limite de détection	173
4.6	Conclusions	174

4.1 Introduction générale

La seconde partie de mon travail de thèse concerne la détection de marqueurs d'explosifs en spectroscopie rotationnelle. Ces dernières années, des recherches intensives ont été menées dans le but de développer un capteur de vapeurs d'explosifs compact, sélectif et peu coûteux avec des limites de détection subppm capable de remplacer la détection canine mais sans succès. Même si la spectroscopie rovibrationnelle haute résolution se révèle être un outil puissant pour la détection, l'identification et la quantification d'espèces moléculaires gazeuses d'intérêt atmosphérique et astrophysique, les méthodes optiques utilisées présentent un manque de sensibilité et/ou de sélectivité pour la détection de vapeurs explosives faiblement volatiles à température ambiante. En effet, les composés ont des pressions de vapeur très faibles à température ambiante et le TNT est l'un des explosifs les plus volatils avec une pression de vapeur de 1.3 mPa (0.013 μ bar) à 300 K [168]. Les pressions de vapeur de la plupart des autres explosifs tels que le cyclo-1,3,5-triméthylène-2,4,6-trinitramine (RDX) ou le pentaérythritol tétranitrate (PETN) sont significativement inférieures de plusieurs ordres de grandeur. La mesure spectroscopique en phase gazeuse des explosifs nécessite donc d'améliorer la sensibilité et la sélectivité des méthodes de détection.

En 2004, D. S. Moore a publié une revue en rapport avec l'instrumentation permettant de détecter les traces d'explosifs en phase gazeuse [169]. Plusieurs techniques ont été considérées mais chacune d'entre elles présente des désavantages spécifiques pour une détection sans ambiguïté de la vapeur d'explosif. Les méthodes IR de déflexion photothermique ultra-sensible [170], de détection intracavité (Cavity RingDown Spectroscopy) [171] et photoacoustique [172] ont été capables de mesurer les signatures IR en phase gazeuse du TNT et du RDX au niveau subppm mais pechent en sélectivité et ne permettent pas de discriminer sans ambiguïté les composés d'une même famille ou les isomères (avec des largeurs vibrationnelles 100 à 1000 fois plus larges que celle des raies rotationnelles). La spectroscopie Raman a également été utilisée pour détecter des explosifs résiduels dans des échantillons signatures [173] mais sa capacité à détecter de très petits échantillons solides ne permet pas de faire des mesures en phase gazeuse en raison d'un manque de sensibilité. Finalement, des résultats prometteurs ont été obtenus dans le domaine UV/visible par photofragmentation laser [174] ou par ionisation à photon unique [175], mais ces méthodes n'excluent pas la possibilité de fragmentation de la molécule mère.

Afin de contourner le problème de la faible pression de vapeur des explosifs, divers marqueurs utilisés ou présents naturellement dans de nombreux explosifs fabriqués industriellement peuvent être ciblés [16]. Les isomères du mono-nitrotoluène peuvent notamment être utilisés comme marqueurs pour la détection du TNT. En effet, le 3-nitrotoluène (3-NT)

(abondance : 0.5%) et le 2-nitrotoluène (2-NT) (abondance : 0.5%) sont utilisés dans de nombreux explosifs fabriqués commercialement au même titre que le dinitrate d'éthylèneglycol (EGDN) (abondance : 0.2%) ou le 2,3-diméthyl-2,3-dinitrobutane (DMNDB) (abondance : 0.1%) [176, 177]. La détection en phase gazeuse des mono-nitrotoluènes ($C_7H_7NO_2$) comme marqueurs du TNT est donc cruciale pour les intérêts défense et la sécurité civile. En plus de leur intérêt défense et sécurité civile, la surveillance de ces composés est pertinente dans le domaine de l'environnement industriel car ils sont largement utilisés dans la fabrication de colorants, de caoutchoucs, de pesticides et de médicaments et parce qu'ils sont persistants dans les conditions naturelles.

Les pressions de vapeur des mono-nitrotoluènes présentées dans la table 4.1 ont été mesurées à différentes températures par J. A. Widegren *et al.* [178]. Elles sont en moyenne autour de 10 Pa [178] à température ambiante, soit 10^4 fois plus élevées que celle du TNT, ce qui rend possible leur détection en phase gazeuse à l'état de traces avec les techniques de spectroscopie habituelles. Les pressions de vapeurs des dinitrotoluènes (DNT) déterminées à partir de mesures expérimentales [168] sont également indiquées. Ces précurseurs du TNT peuvent également être ciblés comme traceurs mais leur détection en phase gazeuse n'est pas envisagée car les tensions de vapeur sont trop faibles pour les techniques utilisées. On peut donc concevoir qu'il est plus simple de détecter le marqueur, même présent en quantités minimales, que l'explosif lui-même. Pour ces raisons, des études spectroscopiques rotationnelles et vibrationnelles de vapeurs de dérivés nitrés d'explosifs dans le domaine THz ont été menées ces dernières années.

TABLE 4.1 – Pression de vapeur en Pa des nitrotoluènes (NT) [178], dinitrotoluènes (DNT) [168] et trinitrotoluène (TNT) [168] à différentes températures (de 10 à 30 °C).

T	2-NT	3-NT	4-NT	2,4-DNT	2,6-DNT	2,4,6-TNT
/K	/Pa	/Pa	/Pa	/Pa	/Pa	/Pa
283.15	5.53 ^a	3.39 ^b	1.25 ^b	0.004 ^b	0.011 ^b	0.00004 ^b
293.15	12.7 ^a	8.55 ^a	3.79 ^b	0.020 ^b	0.040 ^b	0.00027 ^b
303.15	29.7 ^a	19.5 ^a	10.2 ^b	0.066 ^b	0.133 ^b	0.00133 ^b

^a pression de vapeur en phase liquide. ^b pression de vapeur en phase solide.

Dans une étude précédente, les sections efficaces IRL des trois isomères du nitrotoluène ont été mesurées et attribuées à basse résolution ($\Delta\nu = 0.5 \text{ cm}^{-1}$) en phase gazeuse et à température ambiante [179]. Les résultats mettent en évidence la sélectivité de la spectroscopie THz/FIR en phase gazeuse permettant une identification des composés nitro-aromatiques mais il n'a pas été possible de résoudre la structure de rotation des bandes IRL rovibrationnelles. Malgré la plus haute résolution disponible du spectromètre FTIR de la ligne AILES du

synchrotron SOLEIL (10^{-3} cm^{-1}), la densité des raies rovibrationnelles est si grande qu'elle ne permet pas d'observer les raies individuelles de rotation à température ambiante. Ceci est probablement dû à la faible valeur des constantes de rotation, des bandes chaudes et des dédoublements de raies dues aux mouvements de grande amplitude. Nous avons opté pour l'étude de la rotation pure dans les gammes de longueurs d'ondes micro-onde (MW) et millimétrique (mm) à l'aide de sources électroniques avec l'avantage de présenter de meilleures résolutions et des largeurs Doppler plus petites que dans l'IR. En ciblant les isomères du mono-nitrotoluène, c'est à dire le 2-nitrotoluène (isomère ortho), le 3-nitrotoluène (isomère méta) et le 4-nitrotoluène (isomère para), les difficultés expérimentales et théoriques ont pu être surmontées. D'un point de vue expérimental, une instrumentation à haute performance en terme de pureté spectrale et de sensibilité est nécessaire pour détecter ces molécules et résoudre leurs signatures rotationnelles. En effet, la sensibilité doit permettre de mesurer des signaux faibles avec un rapport signal/bruit (S/B) suffisant à température ambiante et la sélectivité doit permettre de mesurer à haute résolution les spectres fortement congestionnés. Concernant l'analyse de spectres, un hamiltonien efficace spécifique prenant en compte les effets de mouvement de grande amplitude et de structure hyperfine a été nécessaire. En particulier, la rotation interne du groupe méthyle par rapport au reste de la molécule ($\text{C}_7\text{H}_7\text{NO}_2$) doit être spécifiquement traitée en fonction de la hauteur de la barrière de potentiel caractéristique à chaque isomère. A ce jour, aucune étude de rotation à haute résolution n'avait été réalisée sur les nitrotoluènes et seul un nombre limité de systèmes contenant à la fois des rotateurs internes quasi libres et un atome d'azote (noyau quadrupolaire) ont été étudiés par spectroscopie rotationnelle [110, 113, 180]. À notre connaissance, une seule tentative de résolution des structures de rotation pure en phase gazeuse d'un traceur explosif avait été réalisée en 2006 par Foltynowicz et al. [181] en utilisant la spectroscopie THz résolue en temps à moyenne résolution. Cette étude met l'accent sur la difficulté de mesurer le spectre de rotation en phase gazeuse d'un dérivé explosif tel que le 2,4-dinitrotoluène (2,4-DNT). En effet, les meilleurs résultats ont été obtenus dans des conditions de pression inférieure à 0.005 Pa et à 150°C pendant 4 heures. La rotation pure de la vapeur de 2,4-DNT a été observée en dessous de 0.5 THz avec un rapport S/B relativement faible (< 3) mais aucune attribution individuelles n'a pu être effectuée en raison d'une résolution et d'une sensibilité trop faibles.

Dans cette section, les spectres millimétriques des isomères du nitrotoluène mesurés pour la première fois à température ambiante en utilisant la chaîne de multiplication du LPCA (voir section 2.3.1) sont présentés. Les calculs de chimie quantique et l'analyse préliminaire des spectres micro-onde mesurés avec le SIMO du PhLAM (voir section 2.2) ont été essentiels pour démarrer l'analyse des spectres millimétriques en raison de la densité et la congestion des raies rotationnelles. Les difficultés expérimentales et théoriques sont présentées, en particulier

celles liées à la faible intensité des raies expérimentales et à la présence de la rotation interne du groupe méthyle. Parmi les trois isomères, nous avons choisi d'étudier en premier le 3-NT en raison de la position intermédiaire du $-\text{CH}_3$ qui présente un potentiel triplement dégénéré V_3 avec une barrière basse qu'il a été possible d'étudier en collaboration avec I. Kleiner avec son code BELGI- C_s -hyperfine adapté pour l'étude de cet isomère en raison de ses propriétés spectroscopiques.

4.2 Méthodes expérimentales et méthodes de calculs

4.2.1 Propriétés spectroscopiques des mono-nitrotoluènes

3-Nitrotoluène

Le 3-NT est une toupie asymétrique prolata ($\kappa = -0.75$) appartenant au groupe de permutation inversion G_6 (une molécule C_s et un rotateur interne C_{3v} [115]) avec un fort moment dipolaire permanent ($\mu \simeq 5.4\text{D}$) contenu dans le plan (a,b) (cf. Figure 4.1). La géométrie à l'équilibre de la molécule optimisée au niveau MP2/cc-pVQZ est présentée en figure 4.1 dans le système d'axes principaux (PAM). Cette molécule possède 45 modes de




FIGURE 4.1 – Géométrie à l'équilibre du 3-nitrotoluène dans le système d'axes principaux optimisée au niveau MP2/cc-pVQZ.

vibration fondamentaux dont une dizaine sont prédits à quelques centaines de cm^{-1} ou moins et peuvent donc être peuplés à température ambiante dans le spectre millimétrique.

2-Nitrotoluène

Le 2-NT est une toupie très asymétrique prolata ($\kappa = -0.44$) de symétrie C_1 avec un rotateur interne C_{3v} . L'encombrement stérique entre le NO_2 et le CH_3 a pour effet d'avoir un groupe NO_2 hors plan et d'augmenter considérablement la hauteur de la barrière V_3 .

La géométrie à l'équilibre du 2-nitrotoluène (2-NT) optimisée au niveau MP2/cc-pVQZ est présentée en figure 4.2 dans le système d'axes principaux (PAM). Le moment dipolaire est légèrement moins élevé que pour les autres isomères ($\mu \simeq 4.3\text{D}$) et contenu dans le plan (a,b) (cf. Figure 4.2).




FIGURE 4.2 – Géométrie à l'équilibre du 2-nitrotoluène dans le système d'axes principaux optimisée au niveau MP2/cc-pVQZ : (a) dans le plan (a,b) et (b) incliné pour observer la torsion du NO_2 .

4-Nitrotoluène

Le 4-NT est une toupie faiblement asymétrique prolatae ($\kappa = -0.91$) de symétrie C_{2v} contenant un rotateur interne C_{3v} avec un fort moment dipolaire permanent ($\mu \simeq 5.8\text{D}$) coaxial avec a (cf. Figure 4.3). À la différence des deux autres isomères, le CH_3 a six positions équivalentes, la barrière de potentielle associée à la rotation interne est donc de type V_6 . La géométrie à l'équilibre de la molécule optimisée au niveau MP2/cc-pVQZ est présentée en figure 4.2 dans le système d'axes principaux (PAM).




FIGURE 4.3 – Géométrie à l'équilibre du 4-nitrotoluène dans le système d'axes principaux optimisée au niveau MP2/cc-pVQZ.

4.2.2 Méthodes expérimentales

Spectroscopie FP-FTMW en jet moléculaire

Le spectromètre FP-FTMW du laboratoire PhLAM de Lille a permis de sonder les transitions micro-ondes à basse température des trois isomères du mono-nitrotoluène (voir section 2.2). Un injecteur chauffé a permis de mélanger la vapeur de NT avec le gaz porteur (Néon) pour une pression en flux de 0.2 MPa. Des températures de 373 K à 393 K ont été utilisées pour optimiser le rapport S/B des raies mesurées. Le mélange de gaz ainsi obtenu a été introduit dans la cavité FP à l'aide d'une buse de 0.8 mm (General Valve de série 9) et en utilisant une fréquence de répétition de 1.5 Hz. Les molécules refroidies par détente adiabatique (T_{rot} de quelques degrés K) ont été polarisées dans leur expansion supersonique par un pulse micro-onde de 2 μ s. Le signal de précession libre (FID) a été mesuré par détection hétérodyne à 30 MHz, et digitalisée avec un taux de répétition de 120 MHz avec une carte d'acquisition de 14 bit de résolution. Les signaux FID ont été accumulés entre 50 et 1000 fois en fonction de l'intensité de la raie pour obtenir le meilleur S/B. Enfin, les spectres ont été enregistrés avec 65536 points, ce qui correspond à une grille de fréquence de 1.8 kHz permettant de résoudre la largeur Doppler de quelques kHz. D'après cette valeur, la précision expérimentale des raies micro-onde mesurées a été fixée à 2 kHz pour l'ajustement.

Des exemples de transitions rotationnelles $J'_{K'_a, K'_c} \rightarrow J''_{K''_a, K''_c}$ (type a et type b) observées autour de 11 GHz sont présentés en figure 4.4 pour le 3-NT, en figure 4.5 pour le 2-NT et en figure 4.6 pour le 4-NT. Chaque multiplet est composé de six raies associées au doublet Doppler des trois composantes de couplage nucléaire quadrupolaire (CNQ) les plus intenses. Les dédoublement des raies A et E du 3-NT dû aux effets de rotation interne ont été particulièrement difficiles à identifier car les écarts sont très variables et parfois supérieurs à 1 GHz dans la région micro-onde. Pour le 2-NT, les dédoublements A-E sont très proches ou non résolus, il en résulte des structures complexes à interpréter mélangeant les doublets Doppler des structures hyperfines et des dédoublements A-E (voir figure 4.5). Concernant le 4-NT, les écarts A-E sont très variables comme pour le 3-NT, on note que deux des trois composantes hyperfines ne sont pas résolues pour la plupart des raies observées et qu'il n'y a pas de transitions de type *b* en raison d'une projection du moment dipolaire nulle selon *b* (voir figure 4.6).




FIGURE 4.4 – Spectre expérimental de transitions micro-ondes du 3-NT de type aR ($7_{07} \rightarrow 6_{06}$, 50 scans co-additionnés pour les espèces A et E) et de type bR ($8_{08} \rightarrow 7_{17}$, 300 et 1000 scans co-additionnés pour les espèces A et E, respectivement). Les structures hyperfines du couplage nucléaire quadrupolaire de ^{14}N sont clairement observées ($F' \leftarrow F''$).




FIGURE 4.5 – Différentes transitions micro-ondes du 2-NT de type ^aR et de type ^bR. Des structure complexes sont observées mélangeant la structure hyperfine de couplage nucléaire quadropolaire de ¹⁴N et les dédoublements A-E.




FIGURE 4.6 – Différentes transitions micro-ondes du 4-NT de type aR , la structure hyperfine de couplage nucléaire quadrupolaire de ${}^{14}\text{N}$ présente trois composantes dont deux non résolues et les dédoublements A-E sont bien résolus.

Spectroscopie millimétrique à température ambiante

Le spectre d'absorption du 3-NT a premièrement été mesuré à température ambiante dans la région millimétrique (70-220 GHz). Bien que cette molécule possède un moment dipolaire permanent élevé, l'intensité des raies est très faible en raison d'une fonction de partition élevée. Le spectre du 3-NT n'a donc pas été directement identifié et de nombreuses tentatives ont été menées en testant différentes configurations et conditions expérimentales. Par exemple, la cellule a été chauffée jusqu'à 80°C pour augmenter la pression de vapeur du 3-NT mais la présence de points froids sur les parois et fenêtres en Teflon n'a pas permis de maintenir la pression de vapeur à la température souhaitée, le taux de fuite de la cellule a également dû être mesuré (2.9 μ bar/heure) à l'aide d'un programme LABVIEW afin de la discriminer de montée en pression dans la cellule par les vapeurs de 3-NT. Un flux continu de 8 μ bar de 3-NT a donc été utilisé et maintenu par le système de pompage au travers de la cellule d'absorption en simple passage (voir section 2.3.1). Le spectre n'ayant pas été immédiatement identifié, la pureté de 99% fournie par Sigma-Aldrich a dû être vérifiée en spectroscopie de masse par chromatographie en phase gazeuse (GC-MS) en collaboration avec Dr. F. Cazier du Centre Commun de Mesures (CCM) de l'ULCO. La pureté a ainsi été vérifiée et des traces négligeables de 2-NT (0.2%) et 4-NT (0.7%) ont été identifiées. Après plusieurs jours d'expositions à la lumière, le 3-NT en phase liquide de couleur jaunâtre initialement est devenu marron en raison de la dimérisation et trimérisation du produit révélée par GC-MS et par des mesures par résonance magnétique nucléaire (NMR) de Dr. F. Delattre de l'Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV) de l'ULCO. La faible abondance et la masse importante de ces polymères n'étant pas favorables à leur observation dans le spectre de rotation pure, leur présence n'a donc pas été un problème pour l'observation du 3-NT.

Le spectre du 3-NT a été enregistré en spectroscopie à modulation de fréquence en utilisant une fréquence de modulation de 10 kHz, 40 kHz de profondeur de modulation délivrée par le synthétiseur, une constante de temps de 200 ms et un pas en fréquence de 100 kHz. Le spectre mesuré est très dense, faible en intensité et compliqué par la présence de nombreuses raies provenant des états excités à température ambiante. La plupart des raies observées sont congestionnées et ont des intensités beaucoup plus faibles que les variations de ligne de base dus aux effets Fabry-Pérot (FP). Deux effets FP majeurs ont été observés avec deux ISL différents de 100 MHz et 118 MHz correspondants à des ondes stationnaires entre la source et le détecteur ($L=150$ cm) et entre les deux fenêtres de la cellule ($L=125$ cm), respectivement. Ces effets ayant une amplitude beaucoup plus grande que l'intensité des raies moléculaires mesurées et des oscillations plus larges que la FWHM des raies d'au moins un ordre de grandeur, ils sont donc facilement supprimés en utilisant un filtre passe-bas ensuite soustrait

au spectre expérimental (voir figure 4.7). D'autres régularités ont également été observées mais leur origine n'a pas été clairement identifiée. Celles-ci présentent une largeur de 1 MHz proche de la largeur des raies moléculaires, il n'a donc pas été possible de les éliminer avec un filtre FFT sans altérer le profil des raies moléculaires (voir figure 4.11). À la différence du




FIGURE 4.7 – Traitement de la ligne de base pour le spectre du 3-nitrotoluène.

spectre micro-onde mesuré en jet moléculaire, le spectre millimétrique mesuré à température ambiante présente un quasi-continuum de raies avec un mélange complexe des composantes A-E dans les états fondamental et excités de torsion/vibration [12, 182]. Bien que le profil de raie soit limité par le régime Doppler ($\Delta\nu_D \simeq 40$ kHz (HWHM)), les raies observées sont congestionnées et artificiellement élargies par la modulation de fréquence [124] qui limite la résolution spectrale à 100 kHz. La structure hyperfine n'est pas résolue dans le spectre millimétrique car les valeurs de J impliquées dans les transitions millimétriques sont trop élevées (composantes séparées de 0.2 kHz pour $J'' = 50$) [183]. L'erreur expérimentale des raies mesurées a été estimée à partir de l'équation 2.37 autour de 100 kHz en tenant compte du rapport S/B estimé < 13 .

Les spectres millimétriques d'absorption du 4-NT (70-220 GHz) et du 2-NT (70-330 GHz) ont ensuite été mesurés à température ambiante dans la région millimétrique. L'intensité des raies ayant été très faible pour le 3-NT, une légère amélioration du S/B a pu être obtenue en améliorant la configuration de la cellule en double passage. Les spectres ont été enregistrés en spectroscopie à modulation de fréquence en utilisant une fréquence de modulation de 10

kHz, 30 kHz de profondeur de modulation délivrée par le synthétiseur, un pas en fréquence de 100 kHz, une pression en flux de $8 \mu\text{bar}$, une constante de temps de 200 ms pour la bande 1 (utilisation d'une diode Schottky pour la détection) et une constante de temps de 50 ms pour les bandes 2 et 3 (utilisation du bolomètre InSb). Les produits 2-NT (pureté à 99%) et 4-NT (pureté à 99%) ont été conditionnés par AlphaAesar (Thermo Fischer Scientific) et utilisés sans purification supplémentaire. La pression de vapeur du 2-NT (forme liquide) étant la plus élevée des trois isomères, elle a pu être introduite plus facilement dans la cellule que pour les deux autres isomères. Enfin, bien que la pression de vapeur du 4-NT (forme solide) soit la plus basse, la méthode utilisée pour mesurer le 3-NT a été appliquée avec la même efficacité.

Tout comme pour le 3-NT, les spectres mesurés sont très denses et congestionnés, faibles en intensité et compliqués par la présence de nombreuses raies provenant des états excités à température ambiante, néanmoins le double passage a permis de gagner en rapport S/B. L'erreur expérimentale des raies mesurées a été estimée autour de 70 kHz pour en tenant compte du rapport S/B estimé < 19 .

Comme pour le 3-NT, des effets FP ont été observés avec une amplitude plus grandes et des oscillations plus larges que la largeur des raies. En cellule double passage, l'origine des effets FP sont les mêmes que pour le 3-NT mesuré en simple passage, on note que l'effet FP entre la source et le détecteur correspond à une distance plus longue ($L = 3.7 \text{ m}$, $ISL = 40 \text{ MHz}$). Ils ont été aisément reproduits en utilisant un filtre passe-bas et soustraits au spectre expérimental (voir figures 4.8 et 4.9).




FIGURE 4.8 – Traitement de la ligne de base pour le spectre du 2-nitrotoluène et comparaison avec le spectre simulé des espèces A.




FIGURE 4.9 – Traitement de la ligne de base pour le spectre du 4-nitrotoluène et comparaison avec le spectre simulé des espèces A.

4.2.3 Calculs de chimie quantique

Les calculs de chimie quantique des 3-NT, 2-NT et 4-NT ont été réalisés avec Gaussian 09 rev D.01 [89] sur le serveur de calculs du laboratoire PhLAM par M. Goubet. L’approximation du noyau gelé a été utilisée avec l’ensemble de bases de corrélations consistantes de Dunning cc-pVXZ (X=D,T,Q) [184]. Toutes les géométries ont été entièrement optimisées aux niveaux MP2 et B98 en utilisant le critère de convergence stricte. Des extrapolations à l’ensemble de bases complètes (CBS) pour les énergies (incluant les corrections d’énergie de point zéro (ZPE)) et les constantes rotationnelles ont été réalisées en utilisant les formules de Dunning [185]. Les fréquences et les constantes de rotation de l’état fondamental ($v = 0$) ont été calculées au niveau anharmonique (calculs VPT2 implémentés dans le programme Gaussian [186]) avec un critère de convergence SCF étroit et l’option de grille intégrale ultrafine. Les corrections anharmoniques ont été extrapolées des calculs DFT (B98) au niveau MP2 en suivant une méthode suggérée par Barone *et al.* [187] qui a récemment été utilisée avec succès dans divers systèmes [188, 189] (dénommé “hybride” ci-après). En effet, puisque les calculs anharmoniques au niveau MP2 sont difficilement abordables pour une molécule relativement grande, les constantes de rotation appelée hybrides d’un état vibrationnel v sont estimées en ajoutant l’anharmonicité DFT (B98/CBS) aux constantes MP2 calculées à l’équilibre (MP2/CBS) tel que :

$$A_v^{hybrid} = A_{eq}^{MP2} - (A_{eq}^{B98} - A_v^{B98}) \quad (4.1)$$

$$B_v^{hybrid} = B_{eq}^{MP2} - (B_{eq}^{B98} - B_v^{B98}) \quad (4.2)$$

$$C_v^{hybrid} = C_{eq}^{MP2} - (C_{eq}^{B98} - C_v^{B98}) \quad (4.3)$$

où A_v , B_v and C_v sont les constantes rotationnelles de l’état vibrationnel v et A_{eq} , B_{eq} et C_{eq} sont les constantes rotationnelles à l’équilibre.

Puis, il a été nécessaire d’avoir une première estimation des paramètres de torsion F et ρ et de la hauteur de la barrière de rotation interne $V(\alpha)$ afin d’avoir une première estimation du dédoublements des fréquences de transitions en espèces A et E. Concernant le 3-NT, la hauteur V_3 de la barrière de potentiel de rotation du CH_3 a été estimée au niveau MP2/CBS en optimisant l’état de transition du groupe méthyle, elle a ensuite été corrigée ZPE à partir du calcul harmonique des fréquences à l’équilibre et de la géométrie des états de transition. Avec trois positions équivalentes du groupe CH_3 par rapport au reste de la molécule, le terme V_6 peut être négligé en première approximation pour l’étude de l’état fondamental $v_t = 0$. La constante de rotation interne F et les composantes ρ_g du vecteur ρ liées aux moments d’inertie principaux de la molécule $I_g = I_a, I_b$ et I_c , aux cosinus directeurs du rotateur interne et au moment d’inertie I_α ont été calculés à partir de la structure optimisée

à l'équilibre au niveau MP2/cc-pVQZ. Enfin, les constantes rotationnelles ont été corrigées avec une approche perturbative détaillée par D. R. Herschbach [45] permettant de prendre en compte le couplage entre la rotation globale du 3-NT et la rotation interne du groupement méthyle. Une perturbation au deuxième ordre est ainsi introduite pour corriger les constantes hybrides A_0^{hybrid} et B_0^{hybrid} de l'état $v_t = 0$ en suivant les équations de Herschbach :

$$A_{0\sigma}^{corr.} = A_0^{hybrid} + FW_{0\sigma}^{(2)} \left(\lambda_a \frac{I_\alpha}{I_a} \right)^2 \quad (4.4)$$

$$B_{0\sigma}^{corr.} = B_0^{hybrid} + FW_{0\sigma}^{(2)} \left(\lambda_b \frac{I_\alpha}{I_b} \right)^2 \quad (4.5)$$

$W_{0\sigma}^{(2)}$ est un coefficient de perturbation adimensionné du second ordre estimé à partir de la barrière réduite $s = \frac{4V_3}{9F}$ pour un niveau de torsion donné ($v_t = 0$) et pour un état A ($\sigma = 0$) ou E ($\sigma = \pm 1$). Dans la référence [45], les valeurs de $W_{0\sigma}^{(2)}$ sont tabulées pour $8 \leq s \leq 100$. Les valeurs $W_{00}^{(2)} = 0.6532$ et $W_{0\pm 1}^{(2)} = -0.3130$ ont été obtenues en extrapolant les valeurs tabulées pour une barrière réduite très faible ($s \simeq 1$ for 3-NT). Enfin, pour une correction complète, la moyenne des valeurs corrigées pour les espèces A et E du formalisme de D. R. Herschbach a été appliquée tel que $A_0^{corr.} = 0.5 * (A_{00}^{corr.} + A_{0\pm 1}^{corr.})$ et $B_0^{corr.} = 0.5 * (B_{00}^{corr.} + B_{0\pm 1}^{corr.})$. La valeur C_0^{hybrid} n'a pas été corrigée car elle n'est pas affectée par la rotation interne. Concernant les constantes CNQ, de grandes différences ont été observées entre les résultats MP2 et B98, par conséquent d'autres calculs ont été menés dans le but d'obtenir une meilleure caractérisation du tenseur de gradient de champ électrique induit par le couplage avec le spin nucléaire ^{14}N . Des calculs au niveau de théorie B2PLYP, B3PW91 and MP2(full) ont été testés avec des ensembles de base spécifiques (voir table 4.9) et comparés aux paramètres expérimentaux obtenus à partir de l'ajustement des données.

Les méthodes de calcul utilisées pour les paramètres de rotation interne du 3-NT ont également été appliquées au 2-NT et 4-NT. On note que les corrections Herschbach s'appliquent aux barrières triplement dégénérées, elles ne sont donc pas applicables au 4-NT. Concernant le 2-NT avec une barrière réduite de $s = 40.8$, les corrections Herschbach calculées ne modifient que de 0.01 MHz les constantes rotationnelles pour les espèces A et E, elles ne sont donc pas utilisées. L'ensemble des paramètres calculés pour les 3-NT, 2-NT et 4-NT sont détaillés dans les tables 4.2, 4.3 et 4.4, respectivement.

Enfin, les potentiels de rotation interne simulés pour chaque isomère à partir des valeurs V_3 et V_6 calculées *ab initio* sont représentés en figure 4.10.




FIGURE 4.10 – Représentations du potentiel de rotation interne du groupe méthyle des 3-NT, 2-NT et 4-NT à partir des hauteurs de barrière V_3 et V_6 calculées *ab initio*.

TABLE 4.2 – Calculs de chimie quantique du 3-NT au niveau de théorie MP2 et B98 dans l'ensemble de bases cc-pVXZ (X=D,T,Q) pour les constantes rotationnelles, les constantes de distorsion centrifuge, les constantes de couplage nucléaire quadrupolaire, les composantes de moment dipolaire électrique et les constantes de couplage avec la rotation interne. Les constantes rotationnelles et la hauteur de barrière de potentiel V_3 ont été calculées à la limite CBS, les constantes rotationnelles hybrides corrigées par les équations de Herschbach sont également indiquées.

Unité	B98/cc-pVXZ			MP2/cc-pVXZ			Hybrid ^c	CBS	X=Q	X=D	X=T	X=Q	Corr. $_{\sigma=0}$ ^d	Corr. $_{\sigma=\pm 1}$ ^d	Corr. ^d
	X=D	X=T	X=Q	X=D	X=T	X=Q									
A_e	2648.546	2673.448	2676.045	2677.354	2629.009	2668.483	2676.982	2681.742				2676.982	2681.742		
B_e	975.941	983.219	983.992	984.383	973.516	988.391	991.314	992.936				991.314	992.936		
C_e	716.370	722.063	722.666	722.971	713.676	724.497	726.683	727.900				726.683	727.900		
A_0	2621.205	2645.938	2651.814	2653.491										2650.551	2661.861 ^b
B_0	971.597	979.272	981.011	981.989										990.542	991.031 ^b
C_0	712.457	718.483	719.862	720.639										725.568 ^{a,b}	725.568
Δ_J	0.0214	0.0216	0.0218		0.0214	0.0216	0.0218 ^{a,b}								
Δ_K	0.3151	0.2997	0.3062		0.3151	0.3000	0.3062 ^{a,b}								
Δ_{JK}	-0.0170	-0.0158	-0.0144		-0.0170	-0.0158	-0.0144 ^{a,b}								
δ_J	0.00676	0.00670	0.00681		0.00676	0.00670	0.00681 ^{a,b}								
δ_K	0.0203	0.0325	0.0273		0.0203	0.0325	0.0273 ^{a,b}								
μ_a	4.6	4.8	4.9		4.1	4.3	4.4 ^{a,b}								
μ_b	1	1	1		0.8	0.9	0.9 ^{a,b}								
χ_{aa}	-0.983	-1.159	-1.244		-0.3412	-0.5641	-0.664 ^{a,b}								
χ_{bb}	0.076	-0.122	-0.082		0.6923	0.5326	0.6028 ^{a,b}								
χ_{cc}	0.906	1.281	1.326		-0.3511	0.0315	0.0637 ^{a,b}								
χ_{ab}	-0.355	-0.346	-0.388		-0.3444	-0.417	-0.4247 ^{a,b}								
F							5.458 ^{b,e}								
ρ	sans unité						0.012675 ^{b,e}								
V_3	cm ⁻¹				5.49	14.27	8.34	4.61							
V_3 ZPE	cm ⁻¹				0.40	12.23	7.73	6.63 ^b							

^a constantes initiales utilisées pour l'analyse préliminaire SPFIT des espèces A.

^b constantes initiales utilisées pour l'analyse des espèces A et E avec BELGI-C_s-hyperfine.

^c voir équations 4.1, 4.2 et 4.3.

^d voir équations 4.4 et 4.5.

^e estimé à partir des constantes A_0^{hybrid} , B_0^{hybrid} et C_0^{hybrid} et des cosinus directeur λ_g et I_α estimés par la structure à l'équilibre MP2/cc-pVQZ.

TABLE 4.3 – Calculs de chimie quantique pour le 2-NT au niveau de théorie MP2 et B98 dans l'ensemble de bases cc-pVXZ (X=D,T,Q) pour les constantes rotationnelles, les constantes de distorsion centrifuge, les constantes de couplage nucléaire quadrupolaire, les composantes de moment dipolaire électrique et les constantes de couplage avec la rotation interne. Les constantes rotationnelles et la hauteur de barrière de potentiel V_3 ont été calculées à la limite CBS, les constantes rotationnelles hybrides corrigées par les équations de Herschbach sont également indiquées.

Unité	B98/cc-pVXZ			MP2/cc-pVXZ			Hybrid ^c	Corr. _{$\sigma=0$} ^d	Corr. _{$\sigma=\pm 1$} ^d	Corr. ^d
	X=D	X=T	X=Q	X=D	X=T	X=Q				
A_e	2237.160	2260.791	2263.684	2265.189	2279.886	2286.348	2289.906			
B_e	1255.826	1258.633	1258.511	1258.404	1250.620	1255.224	1257.873			
C_e	812.790	825.715	827.676	828.731	841.990	844.280	845.511			
A_0	2189.864	2258.007	2243.947					2268.664 ^{a,b}	2268.609	2268.691
B_0	1243.449	1233.226	1240.751					1240.220 ^{a,b}	1240.230	1240.222
C_0	799.427	835.102	824.279					841.059 ^{a,b}	841.0590	841.0590
ΔJ	0.0454	0.04835	0.05129		0.04797	0.05696	0.05899 ^a			
ΔK	0.14492	0.15423	0.16276		0.14461	0.17192	0.17906 ^a			
ΔJK	-0.02002	-0.02131	-0.02744		-0.00308	-0.01782	-0.0239 ^a			
δJ	0.00902	0.01012	0.00999		0.00943	0.01118	0.01148 ^a			
δK	0.12759	0.14303	0.1564		0.14521	0.1792	0.18468			
μ_a	4.06	4.17	4.24		4.7	4.7	4.7 ^a			
μ_b	0.69	0.72	0.75		0.8	0.7	0.8 ^a			
χ_{aa}	-1.0634	-1.2424	-1.3381		-0.4333	-0.6906	-0.7747 ^a			
χ_{bb}	0.1999	0.1104	0.1788		0.5491	0.5192	0.5742 ^a			
χ_{cc}	0.8635	1.132	1.1593		-0.1158	0.1714	0.2006 ^a			
χ_{ab}	0.0986	0.0964	0.1074		0.0535	0.0683	0.0776 ^a			
χ_{ac}	0.0038	-0.014	-0.0164		0.0707	0.0546	0.0549 ^a			
χ_{bc}	-0.1124	-0.3551	-0.371		0.516	0.3496	0.3629 ^a			
F							5.464 ^c			
F_0^f					161.8555 ^{b,e}					
$\angle(i, a)$							0.6314 ^{b,e}			
ρ							0.01281 ^{b,e}			
V_3					571.073	553.076	553.515			553.954
$V_3 ZPE$					521.422	502.055	501.337			501.027 ^b

^a constantes initiales utilisées pour l'analyse préliminaire SPFIT des espèces A.

^b constantes initiales utilisées pour l'analyse des espèces A et E avec XIAM.

^c voir équations 4.1, 4.2 et 4.3.

^d voir équations 4.4 et 4.5.

^e estimé à partir des constantes A_0^{hybrid} , B_0^{hybrid} et des cosinus directeur λ_g et I_α estimés par la structure à l'équilibre MP2/cc-pVQZ.

^f $F_0 = 505.379/I_\alpha$ tel que défini dans XIAM.

TABLE 4.4 – Calculs de chimie quantique pour le 4-NT au niveau de théorie MP2 et B98 dans l'ensemble de bases cc-pVXZ (X=D,T,Q) pour les constantes rotationnelles, les constantes de distorsion centrifuge, les constantes de couplage nucléaire quadrupolaire, les composantes de moment dipolaire électrique et les constantes de couplage avec la rotation interne. Les constantes rotationnelles et la hauteur de barrière de potentiel V_3 ont été calculées à la limite CBS, les constantes rotationnelles hybrides corrigées par les équations de Herschbach sont également indiquées.

	Unité	B98/cc-pVXZ			MP2/cc-pVXZ			Hybrid ^c
		X=D	X=T	X=Q	X=D	X=T	X=Q	
A_e	MHz	3871.536	3913.803	3918.187	3920.394	3901.045	3913.344	3920.225
B_e	MHz	809.479	815.503	816.163	816.499	818.463	821.012	822.431
C_e	MHz	672.326	677.722	678.305	678.601	679.372	681.496	682.68
A_0	MHz	3849.755	3886.509	3894.604				3894.435 ^{a,b}
B_0	MHz	799.846	809.260	808.181				814.113 ^{a,b}
C_0	MHz	665.509	673.004	672.524				676.603 ^{a,b}
ΔJ	kHz	0.012136	0.012466	0.01243		0.011698	0.012259	0.012357 ^a
ΔK	kHz	0.303715	0.312632	0.311554		0.302345	0.320588	0.321328
ΔJK	kHz	0.018502	0.020555	0.022397		0.012129	0.008274	0.009828 ^a
δJ	kHz	0.00237	0.002419	0.002412		0.002279	0.00239	0.002404
δK	kHz	-0.321622	-0.118252	-0.129346		-0.015377	0.006916	-0.00542 ^a
μ_a	Debye	5.05	5.22	5.32		5.798	5.787	5.801 ^a
μ_b	Debye	0.00	0.00	0.00		0.000	0.000	0.000
χ_{aa}	MHz	-1.0777	-1.2581	-1.3557		-0.4305	-0.6928	-0.7829 ^a
χ_{bb}	MHz	0.1796	-0.0141	0.0387		0.7832	0.6651	0.7257 ^a
χ_{cc}	MHz	0.8981	1.2722	1.317		-0.3527	0.0277	0.0572 ^a
χ_{ab}	MHz	0.0025	0	0		0.0000	0.0000	0.0000 ^a
χ_{ac}	MHz	0	-0.0078	-0.0083		-0.0002	-0.0012	0.0043 ^a
χ_{bc}	MHz	0	0	0		-0.0599	-0.0335	0.0000 ^a
F	cm ⁻¹						5.528 ^{b,e}	
ρ	sans unité						0.024061 ^{b,e}	
V_6	cm ⁻¹					8.121	13.388	9.437
$V_6 ZPE$	cm ⁻¹					4.145	9.144	11.283 ^b

^a constantes initiales utilisées pour l'analyse préliminaire SPFIT des espèces A.

^b constantes initiales utilisées pour l'analyse des espèces A et E avec XIAM.

^c voir équations 4.1, 4.2 et 4.3.

^d voir équations 4.4 et 4.5.

^e estimé à partir des constantes A_0^{hybrid} , B_0^{hybrid} et C_0^{hybrid} et des cosinus directeur λ_y et I_α estimés par la structure à l'équilibre MP2/cc-pVQZ.

4.3 Résultats et discussions spécifiques au 3-NT

L'analyse du spectre micro-onde a permis d'ajuster le modèle théorique jusqu'à $J'' = 11$ en traitant à la fois la rotation interne du groupe méthyle et le couplage quadrupolaire nucléaire (CNQ) dû à l'atome de ^{14}N . Les constantes obtenues ont ensuite été utilisées comme paramètres de départ pour l'analyse du spectre millimétrique mesuré à température ambiante (jusqu'à $J'' = 74$). Un ajustement global a ainsi été effectué à partir des spectres micro-onde et millimétrique de l'état fondamental ($v_t = 0$) et du spectre millimétrique du premier état excité de torsion ($v_t = 1$) permettant de reproduire les spectres à la précision expérimentale. Cette étude a permis de caractériser l'énergie rotationnelle du 3-NT dans ses états $v_t = 0$ et 1, la structure hyperfine due au noyau ^{14}N , le potentiel de rotation interne associé à la rotation interne quasi libre du groupe méthyle ($V_3 = 6.7659(24) \text{ cm}^{-1}$) et de discuter les limites du modèle de description des niveaux d'énergie. En vue d'une future détection in situ du 3-NT, la limite de détection a pu être estimée et une liste de fréquences des raies rotationnelles observées et de leur intensité calculée a été établie.

4.3.1 Analyse du spectre micro-onde refroidi par jet moléculaire

Pour une hauteur de barrière réduite $s = \frac{4V_3}{9F} = 0.36$ aussi basse ($V_3 = 6.63 \text{ cm}^{-1}$ calculée au niveau MP2/CBS corrigé ZPE et $F = 5.458 \text{ cm}^{-1}$ calculée au niveau MP2/cc-pVQZ), de larges splittings entre les espèces A et E de quelques centaines de MHz à plusieurs GHz étaient attendus dans le spectre micro-onde et les doublets A-E ont été difficilement identifiés même dans l'état fondamental de torsion $v_t = 0$. On note qu'avec une telle barrière de rotation interne, les niveaux d'énergie rotationnels des espèces E sont situés au dessus de la hauteur de la barrière et le nombre quantique de rotation libre m devrait être utilisé au lieu de v_t comme décrit dans les références [43, 44]. Cependant, v_t est utilisé par le modèle actuellement implémenté dans BELGI- C_s -hyperfine, nous avons donc décidé de conserver l'utilisation de ce nombre quantique dans l'étude.

Dans un premier temps, comme ρ était relativement faible, les espèces A ont pu être attribuées indépendamment des espèces E en utilisant les programmes SPFIT/SPCAT et un Hamiltonien semi-rigide de toupie asymétrique prolata de type Watson en représentation I^r et en réduction A. Les constantes moléculaires de départ utilisées sont : les constantes rotationnelles hybrides corrigées pour tenir compte de la rotation interne en utilisant les équations 4.4 et 4.5 pour les espèces A du formalisme de D. R. Herschbach, les composantes du moment dipolaire et les constantes CNQ calculées au niveau MP2/cc-pVQZ (voir table 4.2). L'ajustement des espèces A seules sans tenir compte de la rotation interne du CH_3 a permis d'obtenir un modèle effectif en incluant les termes de couplage hyperfin.

Le code BELGI-C_s-hyperfine a ensuite été utilisé dans le but d’attribuer les espèces E dans le spectre micro-onde. Les constantes rotationnelle hybrides corrigées pour les espèces A et E à partir des équations 4.4 et 4.5 ont été utilisées comme constantes de départ (voir table 4.6) et les attributions des espèces A de SPFIT/SPCAT ont été réutilisées dans ce code. Afin d’utiliser code BELGI-C_s-hyperfine, les constantes rotationnelles et les composantes du moment dipolaire définies dans le système PAM ont du été converties dans le système d’axes RAM par une rotation des axes a et b d’un angle $\theta_{RAM} = -19.318^\circ$ calculé à partir de 1.49 (voir section 1.6.2). Les constantes CNQ de départ sont issues de l’ajustement avec SPFIT et également transformées dans le système RAM. Enfin, les constantes V_3 , F et ρ estimées à partir de la structure moléculaire à l’équilibre ont été introduites dans le code BELGI-C_s-hyperfine. La table 4.2 résume l’ensemble des paramètres utilisés comme valeur de départ. L’analyse micro-onde a permis un ajustement intermédiaire des constantes de rotation A , B , C , des constantes de distorsion centrifuge à l’ordre quartique, de la constante D_{ab} du système RAM liée aux constantes de rotation, des paramètres de torsion ρ , V_3 , F et de trois termes d’ordre supérieur en couplage rotation-torsion F_v , d_{ab} et c_2 (voir table 1.8 pour leurs définitions et 4.5 pour leurs valeurs ajustées). Un total de 105 multiplets A and 88 multiplets E correspondant à 300 et 260 transitions hyperfines (uniquement les plus intenses pour $\Delta F = \Delta J$) ont été ajustées fournissant un ensemble de constantes déterminées, qui ont permis d’ajuster le spectre micro-onde jusqu’à $J'' = 11$ et $K''_a = 6$ à la précision expérimentale avec une déviation standard de 2.1 kHz.

Par ailleurs, le code BELGI-C_s-hyperfine permet un ajustement global des espèces A et E de l’ensemble des niveaux de torsion du CH₃ fondamental et excités avec le même jeu de constantes rotationnelles. Cependant, il n’a pas été possible d’identifier l’état $v_t = 1$ dans le spectre micro-onde même en modifiant les conditions du jet et la température de l’injecteur.

4.3.2 Analyse du spectre millimétrique à température ambiante

Le spectre d’absorption millimétrique a été mesuré dans la gamme 70-220 GHz avec la chaîne de multiplication de fréquence du LPCA, néanmoins il a pu être analysé dans la gamme 70-110 GHz uniquement en raison des limitations du modèle théorique détaillées en section 4.3.5. Le spectre 70-110 GHz est présenté en figure 4.11 avec trois agrandissements caractéristiques de 40 MHz. Ce quasi-continuum de raies présenté dans la figure 4.11(a) est également pollué par des artefacts saturées probablement correspondants aux effets décrits dans la section 4.2.2. Les constantes moléculaires de l’ajustement des données micro-onde ont été utilisées pour prédire les transitions rotationnelles impliquant des niveaux d’énergie avec $J \geq 38$ de la région millimétrique. Aucune mesure n’a pu être effectuée dans la gamme 20 GHz–70 GHz et aucune transition impliquant des niveaux d’énergie de $10 \leq J \leq 39$ n’a donc




FIGURE 4.11 – Le spectre expérimental millimétrique du 3-NT est comparé au spectre calculé après ajustement des données micro-ondes et millimétriques. (a) est le spectre expérimental 70 – 110 GHz (noir) et (b) est le spectre global simulé pour les états $v_t = 0$ et $v_t = 1$ (orange). Quelques motifs de raies caractéristiques du 3-NT sont présentés dans (c), (d) et (e) : les contributions individuelles des espèces A et E de $v_t = 0$ (rouge et bleu, respectivement) et $v_t = 1$ (rose et vert, respectivement). Toutes les artefacts intenses saturés de (a) sont dues aux effets décrits dans la section 4.2.2 (voir section 4.2.2).

été sondée. Néanmoins, même s'il avait été possible de mesurer cette région à température ambiante, la sensibilité nécessaire aurait été plus importante car les raies moléculaires y sont également plus faibles. Les attributions raie-par-raie ont été effectuées en comparant les spectres expérimental et calculé à l'aide des interfaces graphiques SVIEW/ASCP du package AABS [96, 97]. Afin de coupler l'utilisation de cette interface avec BELGI, j'ai mis au point un code en Fortran90 permettant de convertir automatiquement les fichiers d'entrée et de sortie de BELGI au format SPCAT/SPFIT utilisé dans AABS et de calculer les intensités de raies en nm^2MHz à partir de la force de raie de BELGI et des fonctions de parition, ce code est mis à la disposition des utilisateurs de BELGI.

TABLE 4.5 – Paramètres de rotation-torsion du 3-nitrotoluène ajustés le système d'axes RAM pour les espèces A et E avec le code BELGI-C_s-hyperfine avec les données micro-onde de $v_t = 0$, avec les données micro-onde et millimétriques de $v_t = 0$ et pour l'ajustement global des données micro-onde et millimétriques des états $v_t = 0, 1$. La déviation standard adimensionnée (σ_W) et le nombre de transitions ajustées N sont également indiqués.

	$v_t = 0$ ^a		$v_t = 0, 1$ ^a		Opérateur ^b
	Unité	micro-onde	micro-onde et millimétrique	micro-onde et millimétrique	
A	MHz	2479.382(34)	2481.643(40)	2481.321(34)	P_a^2
B	MHz	1163.665(20)	1163.608(12)	1163.6231(28)	P_b^2
C	MHz	721.65004(47)	721.6453(27)	721.63029(35)	P_c^2
D_{ab}	MHz	-521.824(24)	-521.824(24)	-521.6881(37)	$(P_a P_b + P_b P_a)$
d_{ab}	MHz	1.646(27)	1.515(14)	1.4933(42)	$(1 - \cos(3\alpha))(P_a P_b + P_b P_a)$
Δ_J	kHz	0.03912(46)	0.03321(26)	0.03404(18)	$-P^4$
Δ_{JK}	kHz	-0.3105(68)	-0.2169(40)	-0.2309(28)	$-P^2 P^2$
Δ_K	kHz	0.721(16)	0.5200(95)	0.5531(64)	$-P^4$
δ_J	kHz	0.01541(25)	0.01239(13)	0.012797(91)	$-2P^2(P_a^2 - P_b^2)$
δ_K	kHz	-0.0448(20)	-0.02333(80)	-0.02599(55)	$-\{P_a^2, (P_b^2 - P_c^2)\}$
χ_{aa}	MHz	-0.6561(56)	-0.6565(43)	-0.6566(44)	$2P_a^2(f(I, J, F)/J(J+1))$ ^c
χ_{cc}	MHz	0.8499(94)	0.8509(20)	0.8507(20)	$2P_c^2(f(I, J, F)/J(J+1))$ ^c
χ_{ab}	MHz	0.7135(34)	0.7133(47)	0.7132(48)	$2(P_a P_b + P_b P_a)(f(I, J, F)/J(J+1))$ ^c
V_3	cm ⁻¹			6.7659(24)	$(1/2)(1 - \cos(3\alpha))$
V_6	cm ⁻¹			6.7893(31)	$(1/2)(1 - \cos(6\alpha))$
ρ	sans unité	0.012306(11)	0.01274346(59)	0.02333(22)	$P_a P_a$
F	cm ⁻¹	5.5726(54)	5.385528(95)	5.386202(82)	P_a^2
F_v	MHz	0.797(11)	0.8337(75)	0.8337(16)	$(1 - \cos(3\alpha))P_a^2$
c_2	MHz	0.476(11)	0.5080(58)	0.4919(16)	$(1 - \cos(3\alpha))(P_b^2 - P_c^2)$
c_1	MHz			-0.000712(47)	$2P_a^2(P_b^2 - P_c^2)$
G_v	MHz		-0.00271(15)	-0.003384(91)	$P_a^2 P^2$
k_5	MHz		-3.446(40)	-3.086(38)	$(1 - \cos(3\alpha))P_a^2$
σ_W	micro-onde/millimétrique ^d	1.06 / -	0.952 / 0.953	0.942 / 0.983	
N	micro-onde/millimétrique ^e	560 / 0	560 / 1222	560 / 1522	

^a Toutes les constantes se réfèrent au système d'axes RAM, le tenseur d'inertie n'est donc pas diagonal et les constantes ne peuvent pas être directement comparées à celles du système d'axe PAM. On note que BELGI-C_s-hyperfine utilise uniquement un seul ensemble de paramètres rotationnels pour décrire les deux états de torsion $v_t = 0, 1$. Les incertitudes sur les paramètres sont donnés entre parenthèses sur les dernières décimales. ^b P_a, P_b, P_c sont les composantes du moment angulaire de rotation de la molécule, P_α est le moment angulaire de rotation interne selon l'angle de torsion α du CH₃ et $f(I, J, F)$ est la fonction de Casimir. $\{u, v\}$ est l'anti-commutateur $\{u, v\} = uv + vu$. Le produit du paramètre et de l'opérateur d'une rangée donnée donne le terme réellement utilisé dans l'Hamiltonien de rotation-torsion, sauf pour F, ρ et A qui apparaissent dans l'Hamiltonien sous la forme $F(P_\alpha - \rho P_a)^2 + AP_a^2$.

^c Pour traiter le couplage nucléaire quadrupolaire faible, une approche de perturbation similaire à celle utilisée pour l'acétamide a été utilisée [180] et implémentée directement dans le code de BELGI-Cs [110].

^d La déviation standard adimensionnée de l'ajustement est définie par l'équation 1.85

^e nombre de transitions dans l'ajustement.

Malgré la complexité du spectre millimétrique, plusieurs motifs caractéristiques des états $v_t = 0$ et $v_t = 1$ ont pu être attribués même si les écarts A-E sont 2 à 5 fois plus grands que ceux observés dans le spectre micro-onde (voir la section 4.3.4). Le spectre de rotation de l'état fondamental $v_t = 0$ a été analysé jusqu'à $J'' = 74$ et $K''_a = 23$. Un total de 1222 transitions (705 A et 517 E) correspondant à 431 raies congestionnées (258 A et 173 E) ont été ajustées avec une déviation standard de 95.3 kHz correspondant à la précision expérimentale estimée à 100 kHz. On note que l'ajout des données millimétriques à l'ajustement a légèrement amélioré la déviation standard des données micro-ondes à 1.9 kHz.

Par ailleurs, l'état $v_t = 1$ a pu être attribué dans le spectre millimétrique jusqu'à $J'' = 74$ et $K''_a = 9$ à partir des constantes issues de l'analyse de l'état fondamental $v_t = 0$ et en libérant V_6 . Un total de 300 transitions dans l'état $v_t = 1$ (181 A et 119 E) correspondant à 100 raies congestionnées (50 A et 50 E) ont été ajustés avec l'état $v_t = 0$ pour une déviation standard de 98.3 kHz. Enfin, les paramètres expérimentaux obtenus dans le système RAM à chaque étape de l'ajustement avec BELGI-C_s-hyperfine sont présentés dans la table 4.5, on note qu'un seul ensemble de constantes rotationnelles est nécessaire pour décrire les deux états de torsion $v_t = 0$ et $v_t = 1$.

Les paramètres RAM de BELGI-C_s-hyperfine obtenus dans l'ajustement global de $v_t = 0$ et $v_t = 1$ ont ensuite été convertis en PAM en appliquant la matrice de rotation autour de l'axe c d'un angle $-\theta_{RAM}$ obtenu expérimentalement (voir équation 1.58). On note également que l'angle $\angle(i, a)$ entre l'axe i du rotateur interne et l'axe a du repère principal d'inertie (PAM) a pu être déterminé en réécrivant l'équation 1.58 :

$$\tan \angle(i, a) = \frac{\lambda_b}{\lambda_a} = \frac{I_b}{I_a} \tan(\theta_{RAM}) \quad (4.6)$$

Ces paramètres sont comparés aux calculs de chimie quantique de la section 4.2.3 dans la table 4.6. Pour tous les paramètres de l'ajustement global, l'accord avec les calculs MP2 est excellent. La qualité de l'ajustement global est attesté par une déviation standard très proche de 1 pour les données micro-ondes et les données millimétriques. Le nombre de transitions, les valeurs maximales de J''_{max} et de $K''_{a, max}$, les déviations standard (σ) des états $v_t = 0$ et $v_t = 1$ pour les espèces A et E sont présentées dans la table 4.7, toutes les déviations standards sont très proches de la précision expérimentale des spectres micro-onde (2 kHz) et millimétrique (100 kHz) (voir sections 4.2.2 et 4.2.2).

Comme le montre la figure 4.11 (c-e), les raies les plus intenses de $v_t = 0$ et $v_t = 1$ sont reproduites efficacement mais de nombreuses raies plus faibles ne sont pas reproduites. Ces raies restantes correspondent à des transitions entre niveaux de basse énergie peuplés à la température ambiante dans les états de torsion $v_t \geq 2$ de CH₃, de torsion de NO₂ ou

TABLE 4.6 – Paramètres de rotation et de torsion-rotation du 3-NT ajustés avec le code BELGI-C_s-hyperfine, convertis dans le système PAM et comparés aux valeurs calculées (voir section 4.2.3). Toutes les constantes se réfèrent au système PAM et la précision sur les paramètres moléculaires est donnée entre parenthèses sur les dernières décimales, la déviation standard adimensionnée est également indiquée.

	Unité	BELGI-C _s -hyperfine	calculé
A	MHz	2662.853(33)	2661.861 ^a
B	MHz	982.0909(41)	991.031 ^a
C	MHz	721.63029(35)	725.568 ^a
V_3	cm ⁻¹	6.7659(24)	6.63 ^b
V_6	cm ⁻¹	0.02333(22)	
ρ	unitless	0.01273920(48)	0.001267 ^c
F	cm ⁻¹	5.386202(82)	5.4584 ^c
θ_{RAM}	deg	-19.18639(74) ^d	-19.318 ^c
$\angle(i, a)$	deg	-43.3346(17) ^e	-43.248 ^c

Déviati on standard adimensionnée micro-onde : 0.942 / millimétr ique : 0.983

^a les constantes rotationnelles calculées sont $A_0^{corr.}$, $B_0^{corr.}$ et C_0^{hybrid} , voir section 4.2.3 pour plus de détails.

^b barrière de rotation interne V_3 calculée au niveau MP2/CBS corrigé ZPE.

^c ρ (voir équation 1.40), F (voir équation 1.41), θ_{RAM} (see Eq.1.49), $\angle(i, a)$ (voir équation 4.6), I_a, I_b et I_c sont estimés à partir des constantes A_0^{hybrid} , B_0^{hybrid} et C_0^{hybrid} , et les cosinus directeurs λ_g et le moment d'inertie I_α sont estimés de la structure MP2/cc-pVQZ à l'équilibre.

^d θ_{RAM} obtenu avec l'équation 1.58 et les constantes de l'ajustement de BELGI-C_s-hyperfine, l'incertitude sur les dernières décimales est calculée par la méthode de propagation des erreurs.

^e $\angle(i, a)$ obtenue avec l'équation 4.6 et les constantes de l'ajustement de BELGI-C_s-hyperfine, l'incertitude sur les dernières décimales est calculée par la méthode de propagation des erreurs.

^f nombre de transitions dans l'ajustement.

TABLE 4.7 – Nombre N de transitions différentes ajustées, valeurs maximales du nombre quantique J''_{max} , de $K''_{a, max}$ et déviation standard (σ) de chaque état ($v_t = 0, 1$) et chaque symétrie (espèces A et E).

state	sym	spectre micro-ondes				spectre millimétr ique			
		J''_{max}	$K''_{a, max}$	N^a	σ /kHz	J''_{max}	$K''_{a, max}$	N^a	σ /kHz
$v_t = 0$	A	11	6	300	1.8	74	23	705	93.2
$v_t = 0$	E	11	6	260	2.0	73	20	517	96.5
$v_t = 1$	A					74	8	181	116.1
$v_t = 1$	E					74	9	119	109.7

^a Nombre de transitions attribuées dans l'ajustement.

d'autres modes de basse énergie mesurés et calculés par Cuisset *et al.* [179]. Les nombres d'ondes vibrationnels du premier état de torsion $v_t = 1$ et de l'harmonique $v_t = 2$ de torsion du CH₃ calculés avec le code BELGI-C_s-hyperfine sont présentés dans la table 4.8 et comparés avec les calculs harmoniques au niveau MP2/cc-pVQZ and B98/cc-pVQZ. Pour de tels modes de basse fréquence, les calculs utilisant la méthode VPT2 échouent généralement à fournir des fréquences anharmoniques fiables [187]. Néanmoins, en utilisant les nombres d'onde de torsion de BELGI-C_s-hyperfine pour $v_t = 1$ et $v_t = 2$, il a été possible d'estimer une correction anharmonique empirique (constante d'anharmonicité diagonale) pour l'appliquer aux nombres d'ondes harmoniques calculés en utilisant les équations 1.33, 1.34 et 1.35.

Les calculs harmoniques MP2/cc-pVQZ et anharmoniques B98/cc-pVQZ sont en bon accord avec les nombres d'ondes vibrationnels de BELGI-C_s-hyperfine, assurant la prédiction des états de torsion CH₃ excités $v_t = 1$ et $v_t = 2$ autour de 30 cm⁻¹ et 70 cm⁻¹, respectivement. Les calculs de chimie quantique ont également estimé les nombres d'ondes harmoniques de la torsion du NO₂ en utilisant les méthodes B98 et MP2 dans la base cc-pVQZ (voir table 4.8). Les deux états $v_{t_{\text{NO}_2}} = 1$ et $v_{t_{\text{NO}_2}} = 2$ sont prédits en dessous de 100 cm⁻¹ (45 cm⁻¹ pour $v_{t_{\text{NO}_2}} = 1$ et 90 cm⁻¹ pour $v_{t_{\text{NO}_2}} = 2$). La plupart des raies non-attribuées restantes du spectre millimétrique proviennent donc probablement de $v_t = 2$ de torsion du CH₃ et de $v_{t_{\text{NO}_2}} = 1, 2$ de la torsion du groupe nitro, néanmoins la forte congestion des raies ne permet pas d'attribuer le spectre de ces états sans aucune ambiguïté. On note que pour la torsion de NO₂, aucune séparation des raies A-E n'est attendue en raison d'une barrière de rotation interne très élevée ($V_2 \simeq 1700$ cm⁻¹[190]).

TABLE 4.8 – Nombre d'ondes des états de torsion excités inférieurs à 100 cm⁻¹ prédits par BELGI-C_s-hyperfines ($J = K = 0$) et calculs harmonique au niveau MP2/cc-pVQZ et B98/cc-pVQZ. Partie supérieure : positions des états de torsion excités par le méthyle $v_t = 1$ et $v_t = 2$. Partie inférieure : positions des états de torsion excités de torsion du groupe nitro $v_{t_{\text{NO}_2}} = 1$ et $v_{t_{\text{NO}_2}} = 2$.

	Unités	BELGI-C _s -hyperfine ^a	MP2/cc-pVQZ		B98/cc-pVQZ	
			harmonique	anharmonique ^b	harmonique	anharmonique ^b
CH ₃ torsion						
$v_t = 1$	cm ⁻¹	27.207	38.380	46.296	16.695	24.611
$v_t = 2$	cm ⁻¹	70.244	76.761	100.508	33.389	57.138
NO ₂ torsion						
$v_{t_{\text{NO}_2}} = 1$	cm ⁻¹		42.422		48.885	
$v_{t_{\text{NO}_2}} = 2$	cm ⁻¹		84.844		97.771	

^a les valeurs tabulées sont calculées à partir d'une moyenne pondérée entre les énergies corrigées ZPE des espèces A et E ($E_{v_t} = \frac{1}{3}(E_{v_t,A} + 2E_{v_t,E})$ selon leur dégénérescence.

^b les positions anharmoniques sont déterminées en corrigeant les valeurs harmoniques calculées avec une constante d'anharmonicité empirique $\chi_{\text{BELGI}} = (\frac{v_t=2}{2}) - (v_t = 1) = 7.916$ cm⁻¹ obtenu à partir des positions de $v_t = 1$ et $v_t = 2$ de BELGI-C_s-hyperfine (voir section 1.5.2).

L'ensemble des transitions attribuées dans l'ajustement global de $v_t = 0$ et $v_t = 1$ est donné en annexes S3 et S4 de la référence [14] pour les transitions micro-onde et millimétriques, respectivement. Dans ces annexes, chaque transition est caractérisée par : les nombres quantiques de transition, la force de raie calculée par BELGI-C_s-hyperfine, l'intensité calculée, la fréquence expérimentale, la fréquence calculée et la différence entre les deux. Le calcul de l'intensité est fait automatiquement pour chaque transition à partir de mon programme de conversion des fichiers de BELGI au format SPFIT/SPCAT en utilisant l'équation 1.76 avec la force de raie calculée par BELGI-C_s-hyperfine et les fonctions de partition : $Q(T) = Q_{\text{rot.}}(T) \times Q_{\text{tors.}}(T) \times Q_{\text{vib.}}(T) = 3662$ à 10K ou $Q(T) = Q_{\text{rot.}}(T) \times Q_{\text{tors.}}(T) \times Q_{\text{vib.}}(T) = 4035508$ à 293K. L'intensité en nm²MHz est également

convertie en $\text{cm}^{-1}/(\text{molécule}/\text{cm}^2)$ en utilisant l'équation 1.78. Plus spécifiquement, la table S4 de [14] des données millimétriques et de leur intensité calculée à température ambiante pourra être utilisée pour la détection future du 3-NT à température ambiante.

4.3.3 Constantes de couplage nucléaire quadripolaire

La structure hyperfine due au spin $I = 1$ de ^{14}N est clairement observé dans le spectre micro-onde. Les deux constantes CNQ les plus grandes χ_{aa} et χ_{cc} ont été utilisées dans l'ajustement pour optimiser l'incertitude statistique sur les paramètres, la troisième constante CNQ diagonale χ_{bb} est déduite des précédentes avec la trace nulle du tenseur CNQ diagonal :

$$\chi_{aa} + \chi_{bb} + \chi_{cc} = 0 \quad (4.7)$$

Les constantes CNQ de l'ajustement global de BELGI-C_s-hyperfine ont également été converties de RAM à PAM en appliquant la matrice de rotation autour de c à la matrice CNQ d'un angle $-\theta_{RAM}$. Les valeurs CNQ obtenues par BELGI-C_s-hyperfine ont été comparées aux constantes CNQ du fit préliminaire des espèces A en utilisant SPFIT dans la table 4.9. L'accord entre les deux ensembles de paramètres CNQ démontre que les constantes CNQ ne sont pas perturbées par la rotation interne. La constante hors diagonale χ_{ab} a été fixée sur la valeur MP2/cc-pVQZ dans SPFIT car seules les transitions les plus intenses ($\Delta F = \Delta J$) ont pu être observées et ajustées alors qu'elle est libérée dans BELGI-C_s-hyperfine. En effet, bien que l'ajustement de BELGI-C_s-hyperfine contienne plus de transitions attribuées avec l'ajout des espèces E, seules les structures les plus intenses avec $\Delta F = \Delta J$ ont été attribuées, ce qui ne justifie pas de libérer χ_{ab} . Néanmoins, le paramètre χ_{ab} du système RAM est différent du système PAM en raison de la rotation de la matrice CNQ autour de l'axe c . Ainsi χ_{ab} en RAM est une combinaison de χ_{ab} , χ_{aa} et χ_{bb} définis dans le système PAM et peut être libéré. Dans la table 4.9, différents ensembles de constantes CNQ calculées sont présentées. Étonnamment, les calculs MP2 et MP2(full) ont échoué pour prédire correctement les constantes CNQ, quel que soit la taille de l'ensemble de bases. Cependant, les méthodes de la théorie fonctionnelle de la densité (DFT) B2PLYP (méthode double-hybride récemment développée), B98 (utilisée dans ce travail pour le calcul des autres paramètres moléculaires) et B3PW91 (suggérée par W.C. Bailey [191, 192]) fournissent des résultats fiables avec des incertitudes relatives de quelques %.

Le tenseur CNQ $\chi_{i,j}$, après conversion de RAM à PAM ($i, j = a, b, c$), a ensuite été diagonalisé dans le système d'axes principaux propres au noyau ^{14}N ($i, j = x, y, z$) dans le but de lier les constantes CNQ à la géométrie moléculaire et à la structure électronique (voir équation 1.20). Cette diagonalisation implique le calcul de l'angle α (équation 1.26)

entre l'axe a du repère d'inertie de la molécule et l'axe principal z du noyau orienté, dans une première approximation, le long de l'axe internucléaire C–N [193, 194]. Les valeurs de α déterminées par les constantes CNQ expérimentales et calculées sont en accord. Finalement, l'orientation du gradient de champ électrique peut être évaluée avec le paramètre d'asymétrie η (équation 1.25). Dans la table 4.9, les valeurs expérimentales et calculées de η indiquent une forte déviation du gradient du champ électrique par rapport à la symétrie cylindrique habituellement admise autour de l'axe z presque coïncidente avec la liaison C–N. En effet, les deux valeurs expérimentales η sont très proches de 0.45 et les valeurs calculées de η sont toujours > 0.5 . Cette spécificité est plus probablement due au groupe fonctionnel NO₂ caractérisé avec une contribution partielle de la double liaison (électron délocalisé) ; du point de vue du CNQ, l'azote de NO₂ se comporte comme s'il était quadruplement lié à un atome fictif (les deux oxygènes) de plus basse électronégativité [195, 196]. Cela devrait fortement perturber la distribution électronique autour du noyau quadrupolaire, ce qui peut expliquer l'échec des méthodes à "électrons localisés" tels que MP2 pour prédire les constantes CNQ.

TABLE 4.9 – Constantes de couplage nucléaire quadrupolaire ajustées et calculées $\chi_{i,j}$ dans le système d'axes principaux ($i, j = a, b, c$), leur déviation standard sur les dernières décimales, constantes $\chi_{i,j}$ diagonalisées dans le système d'axes principaux du noyau ¹⁴N ($i, j = x, y, z$), paramètre d'asymétrie η et angle α entre les axes a et z calculés pour chaque ensemble de paramètres avec leur incertitude sur les dernières décimales calculée par la méthode de propagation des erreurs.

	Unité	BELGI–C _s -hyperfine (PAM)	SPFIT (PAM)	B98 cc-pVQZ	B2PLYP(full) cc-pVTZ	B3PW91 6-311+G(df,pd)	MP2 cc-pVQZ	MP2(full) cc-pVTZ
χ_{aa}	MHz	-1.0494(16)	-1.0460(21)	-1.244	-0.9898	-1.1151	-0.664	-0.6287
χ_{bb}	MHz	0.1986(91) ^a	0.1947(47) ^a	-0.082	0.1360	0.0627	0.6028	0.5419
χ_{cc}	MHz	0.8507(20)	0.8513(26)	1.326	0.8539	1.0523	0.0637	0.0867
χ_{ab}	MHz	(-)0.4106(31) ^b	[-0.4247] ^b	-0.388	-0.4296	-0.3937	-0.4247	-0.3913
χ_{xx}	MHz	0.3244(102)	0.3261(45)	0.036	0.281	0.182	0.064	0.087
χ_{yy}	MHz	0.8507(20)	0.8513(26)	1.326	0.854	1.052	0.732	0.661
χ_{zz}	MHz	-1.17507(50)	-1.1775(24)	-1.362	-1.135	-1.235	-0.793	-0.747
η ^d	sans unité	0.4479(106)	0.4461(69)	0.947	0.505	0.704	0.842	0.768
α ^e	deg	16.831(263)	17.198(108)	16.868	18.675	16.882	16.921	16.882

^a calculé à partir de $\chi_{aa} + \chi_{bb} + \chi_{cc} = 0$, la déviation standard a été indirectement obtenue à partir de la déviation standard de χ_{aa} et χ_{cc} .

^b fixée à la valeur calculée pour SPFIT mais libérée dans BELGI–C_s-hyperfine, voir le texte pour plus de détails.

^c paramètre d'asymétrie $\eta = \frac{\chi_{xx} - \chi_{yy}}{\chi_{zz}}$.

^d angle entre l'axe principal a de la molécule et l'axe principal z du quadrupole nucléaire, sa valeur est déterminée à partir de la diagonalisation de matrice des χ (voir équation 1.26).

4.3.4 Potentiel de rotation interne

La détermination des paramètres de rotation interne permet de caractériser le potentiel de rotation interne du groupe méthyle. Les niveaux d'énergie des espèces A et E dans l'état fondamental sont présentés sur la figure 4.12 en fonction de J (axe des abscisses supérieur). Sur la même figure, le potentiel de rotation interne est également représenté en fonction de l'angle de torsion (axe des abscisses inférieur). La barrière de potentiel V_3 est très basse et le groupe méthyle est dans un régime de rotation quasi libre, cette limite extrême a permis de tester les limites du modèle prédit par BELGI- C_s -hyperfine. Tous les niveaux d'énergie de rotation des espèces E se trouvent au-dessus de la barrière. Pour les espèces A, seuls les niveaux $J < 6$ ont une énergie en dessous de la barrière.




FIGURE 4.12 – Potentiel de rotation interne triplement dégénéré du groupe méthyle calculé à partir des valeurs expérimentales de V_3 et V_6 selon l'angle de torsion (axe des abscisses inférieur). Les niveaux d'énergie des espèces A et E dans l'état fondamental sont présentés en noir et en rouge, respectivement, jusqu'à $J=10$ (axe des abscisses supérieur).

L'évolution de la séparation des espèces A et E avec les nombres quantiques J et K_a est présentée en figure 4.13 pour les transitions de type a et b de l'état $v_t = 0$ impliquant

des niveaux d'énergie de rotation avec $0 < J < 60$ et $0 < K_a < 14$. Les problèmes de labelling de nombre quantique apparaissent avec le BELGI-C_s-hyperfine pour les nombres quantiques J et K_a supérieurs, lorsque les fonctions propres sont fortement mélangées. Cette figure souligne que les écarts A-E des transitions de type b peuvent être plus importants que pour les type a. Pour chaque série K_a , la dépendance en J de l'écart A-E montre des régularités avec minima et maxima également observés dans d'autres molécules couplée à la rotation interne d'un CH₃ [197]. Ces extrema montrent une dépendance linéaire en J et varie de centaines de MHz pour les transitions de type a à plus de 10 GHz pour les transitions de type b. On note également que les plus grandes écarts entre les espèces A et E sont observées pour les transitions impliquant $J \simeq 4K_a$ à la fois pour les transitions de type a et de type b, c'est ce que montre par exemple la figure 4.14 tracée en fonction de K_a/J (maximum pour $K_a/J \simeq 0.25$).




FIGURE 4.13 – Variation des écarts entre les transitions d'espèces A et E rotationnelles dans l'état fondamental jusqu'à $J = 60$ et $K_a = 13$. Différentes séries sont présentées pour les branches R : (a) transitions de type a pour $K_c' = J' - K_a' + 1$ et $K_c'' = J'' - K_a'' + 1$, (b) transitions de type a pour $K_c' = J' - K_a'$ et $K_c'' = J'' - K_a''$, (c) transitions de type b pour $K_c' = J' - K_a' + 1$ et $K_c'' = J'' - K_a''$, et (d) transitions de type b pour $K_c' = J' - K_a'$ et $K_c'' = J'' - K_a'' + 1$. Les écarts entre espèces A et E minimaux et maximaux montrent une certaine linéarité indiquée par les droites rouges et noires, respectivement.




FIGURE 4.14 – Variation des écarts A-E pour les transitions de type a pour $K'_c = J' - K'_a + 1$ et $K''_c = J'' - K''_a + 1$ dans l'état fondamental jusqu'à $K_a = 11$ en fonction de K_a/J .

4.3.5 Limites du modèle théorique

Dans cette étude, la première limite résidait dans le calcul : les données de $v_t = 0$ et $v_t = 1$ ont été ajustées pour des transitions rotationnelles jusqu'à $J_{max} = 79$ seulement en raison du coût élevé de la mémoire de calcul requis par la diagonalisation en deux étapes de BELGI- C_s -hyperfine. Alors que la première diagonalisation de l'hamiltonien est effectuée sur une matrice limitée en taille (21×21) sans aucune dépendance en J , la seconde diagonalisation (en rapport avec la rotation, la distorsion centrifuge et les termes de couplage rotation-torsion) est effectuée sur une matrice de dimension $9(2J + 1) \times 9(2J + 1)$ (voir [46] et les références citées pour plus de détails).

La deuxième limitation du modèle se produit pour les niveaux d'énergie impliquant des nombres quantiques J et K_a élevés quand les fonctions d'onde commencent à se mélanger, ce qui conduit à des problèmes de labelling des nombres quantiques associés aux niveaux d'énergie et donne la possibilité d'interactions locales entre les niveaux d'énergie comme les croisements évités [198]. La figure 4.17 illustre ce dernier point, les niveaux d'énergie réduite de rotation calculés sont présentés en fonction de $J(J + 1)$. Les espèces A et E sont présentées séparément pour une meilleure lisibilité car elles ont une symétrie différente et ne peuvent donc pas interagir les unes avec les autres. Des séries en K_a ont été identifiées afin

de discuter les limites d'attributions et les interactions possibles. Le labelling est effectué en fonction des valeurs K_a positives et négatives considérées par le code BELGI-C_s-hyperfine code. Bien que J , K_a et K_c sont de bons nombres quantiques pour décrire les espèces A, il a été montré que la signification des nombres K_c des espèces E doit être basée sur autre chose que les propriétés de symétrie [46]. Pour cette raison, un labelling spécifique des niveaux d'énergie de rotation pour les espèces A et E a été proposée par I. Kleiner dans ref.[46]. Dans la figure 4.17 (partie inférieure), les niveaux d'énergie des espèces A sont labellisés J , $K_a \pm$ avec \pm le nombre quantique de "parité". Si K_a est pair, les valeurs de K_a+ et K_a- correspondent à $K_c = J - K_a$ et $K_c = J - K_a + 1$, respectivement, et vice-versa si K_a est impair. Dans la figure 4.17 (partie supérieure), à la différence des espèces A, les labels $\pm K_a$ des espèces E sont associés aux niveaux $K_c = J - K_a$ et $K_c = J - K_a + 1$ avec $E_{J-K_a+1} > E_{J-K_a}$ [115]. Trois régions des niveaux d'énergie réduite ont été sélectionnées : la première région (a) correspond aux niveaux d'énergie impliquant de basses valeurs de K_a et J dont les transitions ont été sondées par spectroscopie micro-onde, la deuxième région (b) correspond aux niveaux d'énergie de $v_t = 0$ étudiés en spectroscopie millimétrique, et la troisième région (c) correspond aux niveaux d'énergie de $v_t = 0$ et $v_t = 1$ plus élevée et mélangés les uns avec les autres.

Dans la région (a), de basses valeurs de J et K_a sont attribuées à la fois pour les espèces A et E. La plupart des niveaux deviennent doublement dégénérés pour $J(J + 1) > 200$ avec une dégénérescence différente observée pour des valeurs de K_a faibles et élevées : dégénérés avec les mêmes valeurs de K_c pour les niveaux d'énergie les plus bas mais dégénérés avec les mêmes valeurs de K_a pour les niveaux d'énergie les plus élevés pour les espèces A.

Dans la région (b), presque tous les niveaux d'énergie représentés sont impliqués dans des transitions expérimentales. La présence de niveaux non attribués est juste due à des artefacts expérimentaux comme la superposition avec les effets FP intenses (voir section 4.2.2)). Toutes les séries de niveaux d'énergie sont doublement dégénérées, à la fois pour les espèces A et les espèces E. Pour les espèces A, les niveaux dégénérés sont des niveaux avec le même K_c et différents K_a .

Enfin, dans la région (c), des séries croisées sont observées entre les deux états $v_t = 0$ et $v_t = 1$, par conséquent de nombreux niveaux d'énergie n'ont pas pu être attribués, mettant en évidence certaines limites du modèle. Pour $v_t = 1$, des problèmes de labelling se produisent et il n'a pas été possible d'attribuer les transitions impliquant des niveaux d'énergie avec $K_a > 8$. Une version de BELGI-C_s-hyperfine pour $J_{max} = 100$ a également été mise au point pour compléter l'étude pour une partie du spectre millimétrique (140-220 GHz) et installée sur le serveur de calcul CALCULCO de l'ULCO. Cependant, à ces hautes valeurs de J et K_a , les prédictions et leur intensité sont faussées par les problèmes de labelling. L'évolution des

écarts entre les espèces A et E pour les hautes valeurs de K_a et $J > 60$ illustre ce problème (figure 4.15). Enfin, comme indiqué par Ilyushin *et al.* [44], le nombre quantique vibrationnel




FIGURE 4.15 – Variation des écarts entre les transitions d’espèces A et E rotationnelles dans l’état fondamental jusqu’à $J = 79$ et $K_a = 21$. Les séries sont présentées pour les branches R de transitions de type a pour $K'_c = J' - K'_a + 1$ et $K''_c = J'' - K''_a + 1$.

d’oscillateur harmonique v_t n’est pas bien défini pour les niveaux au-dessus de la barrière et le nombre quantique de rotateur libre m n’est pas bien défini pour les niveaux en dessous de la barrière. Dans le cas présent d’une très faible barrière, le nombre quantique de rotateur libre m devrait être plus approprié que v_t dans les états de torsion élevés. En effet, on peut ainsi mentionner des interactions possibles entre $v_t = 1$ et $v_t = 2$ pour les espèces A puisque leurs origines ($J = K = 0$) sont attendues très proches avec 0.11 cm^{-1} d’écart prédit par BELGI- C_s -hyperfine (voir figure 4.16). On note d’ailleurs que si la barrière était nulle, ces deux états seraient dégénérés et correspondraient à $m = \pm 3$.




FIGURE 4.16 – Niveaux d'énergie réduite $E - B^{(v)}J(J + 1)$ en fonction de $J(J + 1)$ calculés à partir de l'ajustement global des données avec BELGI-C_s-hyperfine. Les niveaux d'énergie en noir appartiennent sont impliqués dans les transitions expérimentales attribuées




FIGURE 4.17 – Énergies de rotation calculées dans l'état $v_t = 0$ (points liés en rouge) et l'état $v_t = 1$ (points liés en bleu) jusqu'à $J = 63$. Les énergies réduites $E - B^{(v)}J(J+1)$ ont été utilisées à la place de E pour plus de visibilité. Les points noirs appartiennent aux niveaux d'énergie réduits impliqués dans les transitions expérimentales attribuées et les labels correspondent aux valeurs de K_a . Trois parties sont présentées : (a) analyse micro-onde de $v_t = 0$, (b) analyse millimétrique de $v_t = 0$ et (c) analyse millimétrique de $v_t = 1$. Les espèces A (graphiques du bas) et E (graphiques du haut) sont présentées séparément.

4.4 Influence de l'isométrie : étude préliminaire des 2-NT et 4-NT

L'analyse des spectres micro-ondes et millimétriques des 2-NT et 4-NT est en cours. Néanmoins, les espèces A de l'état fondamental ont pu être identifiées dans les spectres millimétriques. Un ajustement des espèces A avec un Hamiltonien de type Watson en réduction A est donc présenté dans cette section.

Concernant la rotation interne du 2-NT, le dédoublement des transitions en espèces A et E est résolu dans le spectre micro-onde uniquement. Le 2-NT étant une molécule C_1 et la barrière prédite relativement haute (autour de 500 cm^{-1}), les espèces E et de la structure hyperfine sont analysés en utilisant XIAM. Des essais ont également été menés pour utiliser SPFITint pour analyser le spectre micro-onde du 2-NT, mais cette approche est peu pratique car le paramètre ρ doit être indiqué dans le modèle mais il ne peut pas être ajusté. Cette approche pourra néanmoins être comparée à celle de XIAM en utilisant le paramètre ρ ajusté par XIAM. La difficulté de l'analyse de la rotation interne du 2-NT réside notamment dans la proximité des transitions A et E qui ne sont pas toujours résolues dans le spectre micro-onde. En ce qui concerne le 4-NT, on s'attend à des écarts A-E similaires au 3-NT dans les spectres millimétrique et micro-onde. L'analyse des espèces E de cette molécule C_{2v} nécessite l'utilisation du code RAM36, une collaboration avec V. Ilyushin a donc été initiée afin d'analyser la structure hyperfine du spectre micro-onde et d'utiliser son programme pour attribuer les espèces E du spectre millimétrique à des valeurs de $J \leq 180$. La difficulté de l'analyse du 4-NT n'est uniquement due à la basse barrière de potentiel V_6 (barrière réduite $s \simeq 1$) qui induit de larges dédoublements A-E mais aussi au paramètre ρ calculé deux fois plus élevé que pour le 3-NT. Cette valeur calculée de ρ peut s'expliquer par la rotation interne co-axiale avec la rotation globale de la molécule qui implique une interaction plus forte entre la rotation de la molécule et la torsion, cette hypothèse devra être validée par une valeur de ρ expérimentale. Les états excités dans les spectres millimétriques des 2-NT et 4-NT seront également étudiés afin d'exploiter au maximum les données spectrales et de caractériser complètement leur potentiel de rotation interne. À de telles valeurs de J pouvant être attribuées, on pourra s'attendre à observer des interactions. J'ai également codé des routines de conversion des fichiers d'entrée et sortie de XIAM et de RAM36 au format SPFIT/SPCAT pour utiliser ASCP/SVIEW.

4.4.1 Analyse préliminaire des spectre millimétriques à température ambiante

2-Nitrotoluène

Le spectre d'absorption millimétrique du 2-NT mesuré dans la gamme 70 – 330 GHz avec la chaîne de multiplication de fréquence du LPCA a pu être analysé en partie pour les espèces A de l'état fondamental à l'aide de SPFIT/SPCAT jusqu'à $J'' = 186$ et $K''_a = 34$. Une portion du spectre présentant de nombreux motifs caractéristiques intenses (165 – 215 GHz) est présentée en figure 4.18 avec trois agrandissements caractéristiques de 100 MHz. Avec une telle barrière de potentiel de rotation interne, les écarts A-E sont à priori non résolus dans le spectre millimétrique, néanmoins, l'analyse du spectre micro-onde avec XIAM permettra de déterminer les paramètres de rotation interne avec suffisamment de précision pour extrapoler la prédiction de ces dédoublements dans la région millimétrique et ainsi vérifier qui ne sont pas résolus. Le résultat préliminaire de l'analyse des espèces A est présenté dans la table 4.10 et comparé aux paramètres initiaux calculés par les méthodes de chimie quantique.

TABLE 4.10 – Paramètres de rotation pure de l'analyse préliminaire du spectre millimétrique du 2-NT ajustés avec SPFIT et comparés aux valeurs calculées avec les méthodes de chimie quantique (voir section 4.2.3). Toutes les constantes se réfèrent au système PAM et la déviation standard sur les paramètres moléculaires est donnée entre parenthèses sur les dernières décimales.

	Unité	SPFIT	calculé
A	MHz	2265.17684(143)	2268.664 ^a
B	MHz	1247.21697(63)	1240.220 ^a
C	MHz	834.263842(67)	841.059 ^a
Δ_J	kHz	0.059573(66)	0.05899 ^b
Δ_K	kHz	0.26037(261)	0.17906 ^b
Δ_{JK}	kHz	-0.05043(91)	-0.0239 ^b
δ_J	kHz	0.011211(34)	0.01148 ^b
δ_K	kHz	0.18244(38)	0.18765 ^b
Φ_J	mHz	-0.0542(45)	
Φ_{JJK}	mHz	-2.403(121)	
Φ_{JKK}	Hz	0.01672(93)	
Φ_K	Hz	-0.01056(175)	
ϕ_J	mHz	-0.03172(225)	
ϕ_{JK}	mHz	-1.503(60)	
ϕ_K	mHz	5.06(36)	
Déviation standard adimensionnée ^c		1.20	
N^d		5956	

^a les constantes rotationnelles calculées sont A_0^{hybrid} , B_0^{hybrid} et C_0^{hybrid} , voir section 4.2.3 pour plus de détails.

^b constantes de distorsion centrifuge calculées au niveau MP2/CBS.

^c la déviation standard adimensionnée de l'ajustement est définie par l'équation 1.85.

^d nombre de transitions dans l'ajustement.

4-Nitrotoluène

Le spectre d'absorption millimétrique du 4-NT mesuré dans la gamme 70 – 220 GHz avec la chaîne de multiplication de fréquence du LPCA a également pu être analysé en partie pour les espèces A de l'état fondamental à l'aide de SPFIT/SPCAT jusqu'à $J'' = 154$ et $K_a'' = 16$. À la différence du 2-NT, l'intensité du 4-NT est trop faible pour mesurer le spectre sur la gamme 220 – 330 GHz. Une portion du spectre présentant de nombreux motifs caractéristiques intenses (165 – 215 GHz) est présentée en figure 4.18 avec trois agrandissements caractéristiques de 100 MHz. Avec une telle barrière de potentiel de rotation interne, de nombreuses transitions d'espèce E devront être attribuées dans le spectre millimétrique. Comme pour le 3-NT, une forte congestion des transitions est attendue pour le 4-NT, néanmoins l'identification des espèces E dans le spectre micro-onde permettra d'identifier celles du spectre millimétrique pour accroître la correspondance entre les spectres expérimental et simulé.

Le résultat de l'analyse préliminaire des espèces A est présenté dans la table 4.11 et comparé aux paramètres initiaux calculés par les méthodes de chimie quantique. La détermination des constantes de distorsion d'ordre quartique doit encore être améliorée en attribuant des transitions à valeurs de $K_a'' > 16$.

TABLE 4.11 – Paramètres de rotation pure de l'analyse préliminaire du spectre millimétrique du 4-NT ajustés avec SPFIT et comparés aux valeurs calculées avec les méthodes de chimie quantique (voir section 4.2.3). Toutes les constantes se réfèrent au système PAM et la déviation standard sur les paramètres moléculaires est donnée entre parenthèses sur les dernières décimales.

	Unité	SPFIT	calculé
A	MHz	3984.378(44)	3894.435 ^a
B	MHz	815.43849(165)	814.113 ^a
C	MHz	677.376473(130)	676.603 ^a
Δ_J	kHz	0.012780(61)	0.012357 ^b
Δ_K	kHz	2.145(60)	0.321574 ^b
Δ_{JK}	kHz	-0.11223(288)	0.009828 ^c
δ_J	kHz	0.0025055(309)	0.002411 ^b
δ_K	kHz	[-0.00542] ^d	-0.00542 ^c
Déviation standard adimensionnée ^e		1.13	
N ^f		644	

^a les constantes rotationnelles calculées sont A_0^{hybrid} , B_0^{hybrid} et C_0^{hybrid} , voir section 4.2.3 pour plus de détails.

^b constantes de distorsion centrifuge calculées au niveau MP2/CBS.

^c constantes de distorsion centrifuge calculées au niveau MP2/cc-pVQZ.

^d valeur fixée dans l'ajustement.

^e la déviation standard adimensionnée de l'ajustement est définie par l'équation 1.85.

^f nombre de transitions dans l'ajustement.




FIGURE 4.18 – Portions du spectre expérimental millimétrique du 2-NT et du 4-NT comparées au spectre calculé après ajustement préliminaire des espèces A de l'état fondamental. (a) est le spectre expérimental 165 – 215 GHz (noir) et (b) est le spectre global simulé pour les espèces A de l'état fondamental ($v_t = 0$) (orange). Quelques motifs de raies caractéristiques sont présentés dans (c), (d) et (e) avec le même code couleur que (a) et (b). Les spectres bâtons utilisés pour simuler le spectre calculé à partir de l'ajustement des espèces A dans l'état fondamental est également représenté (en noir).

4.4.2 Influence de l'isométrie sur le potentiel de rotation interne

Plus généralement, une barrière de potentiel faible caractérise la rotation interne des groupes méthyle pour les formes isomères méta et para des dérivés du toluène. En effet, la barrière de rotation interne du groupe méthyle est très sensible à son environnement stérique et électronique. Une densité d'électrons symétrique autour du carbone auquel est attaché le groupe $-\text{CH}_3$ conduit généralement à des barrières de rotation interne plus faibles [199]. Par conséquent, pour les dérivés toluène en forme ortho, la barrière est significativement plus grande, typiquement plusieurs centaines de nombre d'onde (par exemple : $\simeq 200 \text{ cm}^{-1}$ pour le 2-toluidine ; $\simeq 700 \text{ cm}^{-1}$ pour le 2-tolunitrile [200])

Dans la table 4.12, les barrières $V_{3,6}$ et les défauts d'inertie $\Delta I''$ déterminés dans les formes ortho, méta et para des dérivés du toluène mono-substitués sont comparés aux résultats expérimentaux sur le 3-NT (méta) et aux calculs *ab initio* pour les 2-NT (ortho) et 4-NT (para). En fonction de la molécule, les valeurs de V_3 et V_6 ont été ajustées à partir de mesures rotationnelles micro-onde [201, 202, 43, 203, 204, 205] ou ajustées et/ou calculées de spectres d'excitation de fluorescence [206, 207, 208, 209, 200]. Pour le 3-NT, la valeur de V_3 du 3-NT est entre celle du 3-xylene et du 3-toluidine où la rotation interne quasi libre est gênée par un groupe méthyle et un groupe amino, respectivement. Néanmoins, pour des barrières aussi basses, les valeurs V_3 sont plutôt proches et leur niveau de précision est donc très important si l'on veut dégager l'influence de l'environnement moléculaire sur la hauteur de la barrière de rotation du groupe CH_3 . Avec une précision relative supérieure à 1%, les paramètres de barrière ajustés du 3-NT atteignent un niveau de précision significativement meilleur que les autres. En particulier, la faible correction V_6 est bien déterminée fournissant un ratio $\frac{V_6}{V_3}$ égal à $(3.45 \pm 0.03) \times 10^{-3}$. Ce rapport est faible et suggère que la distribution électronique autour du méthyle est faiblement affectée par le groupe NO_2 .

Concernant les barrières $V_{3,6}$ des 2-NT et 4-NT obtenues par les calculs *ab initio*, les calculs MP2/CBS sont en cohérence avec le fluorotoluène et la toluidine. Une compréhension plus fine de l'influence de l'isométrie sur la hauteur de la barrière sera possible avec la détermination expérimentale des constantes $V_{3,6}$ du 2-NT et V_6 du 4-NT. On note que la comparaison des résultats du nitrotoluène avec ceux des formes ortho de la toluidine et du tolunitrile souligne la nécessité de déterminer V_6 pour le 2-NT qui n'est probablement pas négligeable.

Concernant le défaut d'inertie, les formes méta et para ont un défaut d'inertie proche de zéro pour le tolunitrile, le fluorotoluène et la toluidine. Concernant la forme ortho, il est d'environ $\Delta I'' \simeq 3 \text{ amu}\text{\AA}^2$ en raison de l'encombrement stérique du substituent avec le $-\text{CH}_3$. Pour le nitrotoluène, $\Delta I'' = -22.54 \text{ amu}\text{\AA}^2$ (expérimental sur A seules) pour la forme ortho est également plus important que dans les formes méta avec $\Delta I'' = -4.05 \text{ amu}\text{\AA}^2$ (experimental) et para avec $\Delta I'' = -0.52 \text{ amu}\text{\AA}^2$ (expérimental sur A seules). L'ensemble des

isomères ortho sont donc légèrement hors-plan en raison de l'encombrement stérique, avec une particularité pour le nitrotoluène où le défaut d'inertie devient très important quand $-\text{CH}_3$ et le NO_2 sont très proches, ce qui laisse supposer que le groupe NO_2 ait un encombrement plus important que les autres substituants présentés dans la table 4.12.

TABLE 4.12 – Constantes de barrière de rotation interne de dérivés du toluène monosubstitués dans leur forme ortho, méta et para. Le défaut d'inertie est obtenu par $\Delta I'' = I_c - I_a - I_b$.

Molécule	Substituant	$\Delta I'' / \text{amu } \text{Å}^2$	V_3 / cm^{-1}	V_6 / cm^{-1}	Méthode
Toluène	–	0.02	–	4.83783617(94)	spectroscopie micro-ondes [202, 43]
o-nitrotoluène	–NO₂	-22.54	501.027	–	MP2/CBS et ce travail (en cours)
m-nitrotoluène	–NO₂	-4.05	6.7659(24)	0.02333(22)	ce travail
p-nitrotoluène	–NO₂	-0.52	–	11.283	MP2/CBS et ce travail (en cours)
o-fluorotoluène	–F	-3.02	228.1	6.6	fluorescence [208] et micro-ondes [205]
m-fluorotoluène	–F	-0.11	15.8(1)	7.97(17)	fluorescence [208] et micro-ondes [204]
p-fluorotoluène	–F	-0.021	–	13.638(18)	fluorescence [208] et micro-onde [210]
o-Toluidine	–NH ₂	-3.51	703	62	fluorescence [206]
m-Toluidine	–NH ₂	-0.414	9	-10	fluorescence [206]
p-Toluidine	–NH ₂	-0.51	–	5.6	fluorescence [209]
o-Tolunitrile	–CN	-2.87(1)	178.09(31)	31.3(78)	spectroscopie rovibronique [200]
m-Tolunitrile	–CN	-0.02(1)	13.58(23)	-13.68(560)	spectroscopie rovibronique [200]
m-Xylene	–CH ₃	-6.26	4.49(13)	–	spectroscopie FTMW [201]
o-cresol-OD (cis)	–OD	-3.25	669.100	–	fluorescence [207] et FTMW [203]
o-cresol-OD (trans)	–OD	-3.17	371.047	–	fluorescence [207] et FTMW [203]
m-cresol-OD (cis)	–OD	-3.27	21.341(52)	–	fluorescence [207] et FTMW [203]
m-cresol-OD (trans)	–OD	-3.25	3.188(180)	–	fluorescence [207] et FTMW [203]

4.5 Limite de détection

Une liste de raies complète jusque 110 GHz avec une précision en fréquence de 100 kHz est maintenant disponible (tables S3 et S4 des annexes de [14]), celle-ci constitue un outil crucial pour la détection future in situ en phase gazeuse. Cependant, il serait difficile de détecter le 3-NT à des niveaux de traces avec le spectromètre à ondes millimétriques utilisé dans des conditions expérimentales décrites dans la section 4.2.2. En effet, l'intensité maximale est estimée à $I_{max} \simeq 1.22 \times 10^{-24} \text{ cm}^{-1}/(\text{molécule}/\text{cm}^2)$ à partir des raies millimétriques les plus intenses (autour de 109 GHz) et la limite de détection (LDD) a pu être estimée à 600 ppm en comparant avec la LDD d'espèces polaires de petite taille mesurées avec le même spectromètre dans des conditions expérimentales similaires [124]. Cette LDD est largement supérieure à la limite d'exposition professionnelle fixée à 2 ppm dans plusieurs pays comme la France [211].

Concernant les deux autres isomères du mono-nitrotoluène, la LDD ne peut pas être estimée sans une analyse de la torsion qui permettra de prédire correctement les intensités. Sans tenir compte de la torsion, une première estimation "haute" de $I_{max} \simeq 10^{-22} \text{ cm}^{-1}/(\text{molécule}/\text{cm}^2)$ est obtenue pour les transitions les plus intenses des trois isomères, ce qui correspond à 20 ppb. Dans le cas du 3-NT, cette estimation avait été revue à la baisse en raison du dédoublement des raies A-E de la rotation interne (calcul des forces de raie en utilisant les fonctions d'onde de rotation-torsion) et en ajoutant Q_{tors} dans le calcul de la fonction de partition totale Q_{tot} .

Par ailleurs, le spectre du 3-NT a été réenregistré sur la gamme 175-180 GHz en utilisant la cellule en double passage et les mêmes conditions expérimentales que le 2-NT et le 4-NT afin d'avoir une comparaison du spectre expérimental des trois isomères (voir figure 4.19). Il apparaît que le spectre du 2-NT est quasiment dix fois plus intense que celui du 3-NT et le spectre du 4-NT environ deux fois plus intense que celui du 3-NT. Sachant que le 4-NT est le marqueur du TNT le moins abondant des trois isomères du mono-nitrotoluène (0.5% de 2-NT et 0.5% de 3-NT) et que le 3-NT présente des transitions plus faibles que le 2-NT, on peut supposer que le 2-NT est le meilleur marqueur du TNT pour une détection à partir des signatures rotationnelles millimétriques.




FIGURE 4.19 – Comparaison des spectres du 2-NT, 3-NT et 4-NT dans la gamme 175.5-176 GHz.

4.6 Conclusions

Les mesures et analyses à haute résolution du 3-NT ont été réalisées pour la première fois dans des conditions de refroidissement en jet dans la région micro-onde et à température ambiante dans la région millimétrique, fournissant une liste de raies qui pourra être utilisée pour la future détection *in situ* en phase gazeuse des marqueurs d'explosifs (TNT). Les difficultés expérimentales et théoriques ont été surmontées : un spectre de rotation faible et congestionné à température ambiante a été mesuré et des niveaux d'énergie perturbés par la rotation quasi libre du groupe méthyle ont été calculés. La fonction de potentiel de rotation interne du groupe méthyle a été déterminée à partir de l'analyse spectroscopique. Une très basse barrière a été obtenue par l'ajustement des états $v_t = 0, 1$ avec une précision excellente ($V_3 = 6.7659(24)\text{cm}^{-1}$ et $\frac{V_6}{V_3} = 0.00345(3)$). Les limitations informatiques des calculs et physiques du modèle ont été discutées. Des propriétés structurales du 3-NT ont également été dérivées de l'analyse spectroscopique pour les liaisons C-CH₃ et C-NO₂ étant tout deux dans la plan (a, b). La structure hyperfine résolue dans la région micro-ondes a permis de déterminer l'angle entre la liaison C-NO₂ et l'axe a ($\alpha = 16.66(32)^\circ$). D'autre part, l'angle $\theta = -19.18639(74)^\circ$ déterminé par la conversion de RAM à PAM des paramètres rotationnels a permis de déterminer l'angle entre la liaison C-CH₃ et l'axe a ($\angle(i, a) = -43.3346(17)^\circ$). L'étude des 2-NT et 4-NT en cours permettra d'une part d'étudier l'influence de la forme isomérique sur le potentiel de rotation interne et d'autre part de permettre d'identifier un marqueur spécifique pour l'étude de mélanges des différents isomères tel qu'il a été démontré

dans l'infrarouge lointain avec des empreintes vibrationnelles [182].

Dans une revue en 2010, Frank C. De Lucia a considéré que de grandes opportunités se présentaient en terme de détection en phase gazeuse pour la spectroscopie submillimétrique [15]. En particulier, alors que les technologies (sub)millimétriques sont utilisées en spectroscopie de laboratoire, leur croissance et leur avenir dépendent de leur interaction avec d'autres domaines, en particulier avec la communauté de la télédétection qui utilisera la spectroscopie rotationnelle pour des applications analytiques. Par ailleurs, la LDD des mono-nitrotoluènes pourrait être améliorée à court terme de plusieurs ordres de grandeur en utilisant des schémas de détection ultra-sensibles actuellement utilisés en spectroscopie IR tels que les systèmes photo-acoustiques [212] ou les techniques de cavité haute-finesse [213] qui pourraient être transférées à des longueurs d'onde plus longues, permettant de réduire le bruit de détection et d'augmenter la longueur d'interaction. Ce gain en sensibilité est requis pour la surveillance du mono-nitrotoluène dans des milieux réalistes et pour la détection de dérivés de TNT moins volatils tels que le 2,4 et le 2,6-Dinitrotoluène. [182].

La présente étude s'inscrit dans cette ambition et constitue la première étape du développement d'une base de données de signatures rotationnelles à haute résolution pour les traceurs explosifs également étudiés avec les sections IR de vibration [214, 179].

Chapitre 5

Spectroscopie millimétrique de précurseurs d'AOS : les méthoxyphénols

Sommaire

5.1	Introduction générale	177
5.2	Mesures expérimentales du 3-MP dans la région millimétrique .	180
5.3	Calculs de chimie quantique	182
5.4	Analyse du spectre millimétrique du 3-MP	185
5.5	Conclusions	191

5.1 Introduction générale

Les méthoxyphénols $C_7H_8O_2$ sont émis en quantités lors des feux de biomasse en raison de la pyrolyse de la lignine du bois et leur oxydation dans l'atmosphère participe à la production d'aérosols organiques secondaires dont l'impact sur le climat semble décisif [18, 19]. Des études précédentes réalisées dans la chambre de simulation LPCA-ONE ont permis de caractériser les rendements en AOS produits par oxydation des méthoxyphénols dans des conditions atmosphériques (294K) [19]. En particulier, la figure 5.1 met en évidence la production d'AOS en comparant les profils de concentration du 2-méthoxyphénol (2-MP) au cours du temps en présence du radical OH (décroissance exponentielle) avec la distribution en nombre et en volume des AOS produits au cours du temps. La détection en phase gazeuse des méthoxyphénols dans l'atmosphère nécessite une connaissance précise des sections efficaces d'absorption rovibrationnelles [215] qui peuvent être simulées sous réserve de connaître




FIGURE 5.1 – Profils de concentration du 2-méthoxyphénol en présence du radical OH (conditions initiales : $4715\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ guaiacol et $2.4 \times 10^6 \text{ OH}\cdot\text{cm}^{-3}$) et distribution en nombre (a) et en volume (b) des AOS produits au cours du temps (mesures SMPS). Les points gris représentent les concentrations de 2-MP mesurées par GC-FID et les courbes grises correspondent à l’ajustement exponentiel sur les concentrations expérimentales de 2-MP. (source : Lauraguais *et al.* [19]).

le paysage conformationnel et les constantes moléculaires de l’état fondamental et des états excités de vibration de basse énergie accessibles par la spectroscopie millimétrique de rotation pure. Le groupe de M. Schmitt *et al.*, a étudié le paysage conformationnel des trois isomères du méthoxyphénols en combinant la spectroscopie électronique à basse température en jet moléculaire rotationnellement résolue et les calculs *ab initio*. Les résultats expérimentaux et théoriques ont montré une forte dépendance de la flexibilité conformationnelle avec la forme isomérique. Pour le 2-MP, également appelé gua

left(iacol, une seule conformation stabilisée par la formation d'une liaison hydrogène entre les groupes fonctionnels phénol et méthoxy a été observée en référence [216]. Le 4-méthoxyphénol (4-MP), également appelé méquinol, a été étudié dans cette même étude et deux conformères (trans et cis) ont été identifiés. Très récemment, le paysage conformationnel du 3-méthoxyphénol (3-MP) a été spécifiquement étudié par le même groupe de recherche [217]. Pour ce dernier, quatre conformères sont attendus correspondants aux positions relatives des groupes $-OH$ et $-OCH_3$ dans le plan du cycle benzénique. Néanmoins, seulement trois des quatre conformères possibles ont été caractérisés dans leur état fondamental électronique sur la base des paramètres moléculaires tels que les constantes de rotation, les défauts d'inertie et l'orientation du moment dipolaire de transition électronique. Leurs résultats sont en accord avec les mesures de "hole-burning" précédentes dans les spectres REMPI effectués par Ulrich *et al.*, qui n'ont pas observé le quatrième conformère avec les groupes $-OH$ et $-OCH_3$ en position "up" [218]. L'absence d'un conformère a été expliquée par la structure non-planaire du 3-MP dans l'état singulet électronique en affaiblissant la transition électronique avec un facteur défavorable de Franck-Condon.

Pour le 3-MP, cette difficulté a pu être surmontée en sondant des transitions rotationnelles pures dans l'état fondamental mais l'analyse spectroscopique a été compliquée par la congestion des spectres de rotation due à des constantes rotationnelles plutôt faibles, par des modes de vibration basse fréquence et par différentes contributions conformationnelles. À notre connaissance, aucune spectroscopie rotationnelle pure à haute résolution n'avait été réalisée sur des méthoxyphénols à l'exception du 3-MP où la gamme de fréquences micro-ondes de 28 à 40 GHz avait été étudiée par Caminati *et al.* en 1993 [219]. Dans cette étude, le spectre de rotation du 3-MP a été mesuré avec un spectromètre conventionnel Stark modulé et l'analyse a révélé la présence d'un seul conformère alors que quatre conformères possibles étaient attendus.

Dans notre travail, la chaîne de multiplication de fréquence du LPCA a été utilisée pour mesurer les transitions de rotation pure du 3-MP dans la gamme de fréquence 70–330 GHz à la limite Doppler et à température ambiante. Des calculs théoriques *ab initio* de haut niveau théorique ont également été effectués pour analyser la flexibilité conformationnelle du 3-MP. Par rapport aux travaux précédents [217, 218, 219], les analyses expérimentales et théoriques s'accordent sur l'observation de quatre conformations stables contribuant aux spectres de rotation de 3-MP à température ambiante. En plus de l'attribution des transitions dans l'état fondamental de vibration, des transitions de rotation dans les deux modes de pliage de plus basses fréquences ont été attribuées pour deux conformères.

5.2 Mesures expérimentales du 3-MP dans la région millimétrique

Le 3-MP conditionné par AlphaAesar (Thermo Fischer Scientific) avec une pureté de 97% a été purifié de traces identifiées de méthanol par un pompage continu sur l'échantillon. Le spectre d'absorption à température ambiante du 3-MP a été mesuré dans la région millimétrique (70–330 GHz) à l'aide du spectromètre à chaîne de multiplication de fréquence du LPCA. À température ambiante, le 3-MP est de forme liquide et présente une pression de vapeur saturante estimée autour de 2 Pa, soit 0.02 mbar. Un flux continu de 11 μ bar d'échantillon a été maintenu par pompage continu à travers la cellule d'absorption (125 cm de longueur et 56 mm de diamètre) en configuration double passage. Le signal est détecté à l'aide d'une diode Schottky (70–110 GHz) et du bolomètre (InSb) (140 – 330 GHz). Le spectre a été enregistré en modulation de fréquence 2F en utilisant une fréquence de modulation de 10 kHz, une profondeur de modulation de 33 kHz de la fréquence délivrée par le synthétiseur, une constante de temps de 50 ms (pour 110–330 GHz) ou 200 ms (pour 70 – 110 GHz) et des pas en fréquence de 60 à 180 kHz afin de suivre l'élargissement Doppler. La ligne de base résultant des effets PF avec une amplitude et une largeur environ 50 fois plus grandes que les intensités moléculaires et les largeurs de ligne, a été facilement éliminée en utilisant le filtre FFT passe-bas soustrait du spectre comme décrit dans la section 2.3.5. Les raies observées sont à la fois limitées par le régime Doppler ($\Delta\nu_{Doppler} \simeq 90$ kHz (FWHM)) et artificiellement élargies par la modulation de fréquence qui limite la résolution spectrale à 100 kHz.

Des mesures complémentaires ont été réalisées avec le spectromètre d'émission millimétrique à dérive de fréquence du LPCA dans la gamme 190–210 GHz. L'intérêt de ces mesures était d'acquérir des données permettant d'atteindre un meilleur rapport S/B et de comparer les deux méthodes. Le spectre d'émission stimulée du 3-MP a été enregistré par pas de 1 GHz [220] en accumulant 16 000 000 spectres pour une durée totale de 22 heures. Pour cela, 23 impulsions de 700 ns avec une bande passante de 1 GHz et un chevauchement de 100 MHz entre chaque impulsion ont été utilisées, le signal de précession libre a été enregistré pendant 4 μ s après la fin de l'impulsion excitatrice (20 ns) et la pression a été maintenue en flux à 9 μ bar à travers la cellule en simple passage.

Afin de comparer le spectre obtenu avec celui de la chaîne de multiplication de fréquence, le spectre d'absorption 2F a été de nouveau mesuré sur la gamme 190–210 GHz en cellule simple passage avec un pas de 200 kHz et une constante de temps de 200 ms, ce qui correspond à un temps global d'acquisition équivalent. Bien que l'intérêt de spectromètre à dérive de fréquence est de permettre l'enregistrement du spectre large bande, il n'a pas permis d'ob-

tenir un spectre mieux résolu malgré un rapport S/B légèrement meilleur. Une comparaison des deux spectres enregistrés avec le même temps d'acquisition sur la gamme 196.60–196.75 GHz est présentée en figure 5.2.




FIGURE 5.2 – (a) le spectre d'absorption du 3-MP mesuré en modulation de fréquence $2F$ à l'aide du spectromètre à chaîne de multiplication de fréquence du LPCA et (b) le spectre d'émission stimulée du 3-MP mesuré avec le spectromètre à dérive de fréquence du LPCA.

5.3 Calculs de chimie quantique

Afin d'identifier les conformations stables du 3-MP et de prédire aussi précisément que possible les constantes rotationnelles et moments dipolaires de l'état fondamental, des calculs chimique quantique ont été effectués avec un haut niveau de théorie à l'aide du logiciel Gaussian 16 [221] sur le cluster du centre de ressources informatiques de l'université de Lille. Notre stratégie a consisté à utiliser un ensemble de bases plus grand que les études *ab initio* antérieures [218, 217]. Les ensembles de base cohérents de corrélations de Dunning *et al.* de cc-pVDZ à cc-pV5Z ont été utilisées [184]. Les extrapolations à la limite de base CBS pour les énergies (y compris les corrections ZPE), les constantes rotationnelles et les moments dipolaires ont été effectuées en utilisant les équations de Dunning [185] avec la méthode B3LYP. Des calculs au niveau MP2 ont également été effectués mais limités à la base cc-PVQZ en raison du coût de calcul important.

La figure 5.3(a) montre un scan de la surface d'énergie potentielle (PES) du 3-MP dans l'état fondamental en fonction des angles diédraux des groupes –OH et –OCH₃ par rapport au groupe benzène. Cette PES a été construite avec un pas de 5° au niveau de théorie B3LYP/6-311++G(d,p). Quatre conformères ont été identifiés et labellisés *C1*(180; 180), *C2*(0; 0), *C3*(180; 0) et *C4*(0; 180) en accord avec les valeurs des angles diédraux $D(C; C; O; H)$ et $D(C; C; O; C)$, respectivement, et classifiés selon leur stabilité relative, du plus stable au moins stable. Sur cette PES, les énergies précises des quatre minima et des quatre points selles ont été calculés aux niveaux de théorie B3LYP/CBS et MP2/cc-PVQZ. Toutes les géométries ont été entièrement optimisées aux niveaux MP2 et B3LYP en utilisant le critère de convergence stricte. Les hauteurs des barrières entre les conformères sont incluses entre 1070 cm⁻¹ et 1230 cm⁻¹. De plus, la barrière V_3 caractérisant le potentiel de rotation interne du CH₃ a été calculée autour de 900 cm⁻¹ pour les quatre conformères. Avec de telles hauteurs de barrières, les dédoublements des raies rotationnelles par effet tunnel ne peuvent pas être résolus dans les spectres millimétriques. Les géométries optimisées au niveau MP2/cc-PVQZ sont présentées en figure 5.3(b).

Les stabilités et populations relatives des quatre conformères de 3-MP déterminées par les calculs MP2/cc-PVQZ et B3LYP/CBS sont reportées dans la table 5.3 avec les différentes propriétés moléculaires comme les constantes de rotation de l'état fondamental, les défauts d'inertie et les composantes polaires des moments dipolaires permanents. Nos résultats obtenus à la limite CBS sont comparés avec les calculs au niveau CC2/cc-PVTZ de la référence [217], les valeurs expérimentales obtenues dans la gamme UV [217], dans la gamme micro-onde [219] et la gamme millimétrique de notre travail. Concernant les calculs *ab initio*, les résultats obtenus dans ce travail sont en bon accord avec les calculs CC2/cc-PVTZ effectués




FIGURE 5.3 – (a) Surface d'énergie potentielle décrivant le paysage conformationnel du 3-MP calculée avec un pas de 5° au niveau B3LYP/6-311++G(d,p). Les minima locaux et points selles sont marqués par des points rouges et des croix vertes, respectivement. (b) géométries des quatre conformères stables de 3-MP optimisés au niveau MP2/cc-pVQZ représentées dans le plan d'inertie ab avec le vecteur de moment dipolaire permanent (flèche bleue).

dans la référence [217] à l'exception des composantes de moment dipolaire. Ceci s'explique facilement par le fait que nos mesures millimétriques considèrent le moment dipolaire per-

TABLE 5.1 – Paramètres calculés et expérimentaux de l'état fondamental pour les quatre conformères du 3-MP : énergies relatives ΔE , populations calculées et semi-expérimentales à T=298.15K, défauts d'inertie $\Delta I'' = I_c - I_a - I_b$ et coordonnées polaires ($\mu; \theta$) du vecteur moment dipolaire permanent.

	Unit	Calculé			Expérimental	
		Réf. [217] : CC2/cc-PVTZ	Ce travail : MP2/cc-PVQZ	Ce travail : B3LYP/CBS	Réf.[219] : MW	Réf.[217] : UV
C1(180;180)						
ΔE	cm ⁻¹	0	0	0		
Population	%	36.2	35.3	35.2		45.6
A''	MHz	2830.76	2849.26	2860.46		2841.06(11)
B''	MHz	1313.51	1319.46	1301.83		2840.8815(55)
C''	MHz	902.32	906.99	899.76		1303.52742(143)
$\Delta I''$	amu.Å ²	-3.20	-3.19	-3.20		899.02(2)
μ	D		0.77	0.72		898.982164(103)
θ	°	16	±35.6	±41.3		-3.42823(83)
						±19.9(1)
C2(0;0)						
ΔE	cm ⁻¹	50	36	45		
Population	%	28.3	29.6	28.2		25.3
A''	MHz	3641.40	3663.76	3654.95	3628.68(5)	3628.47(74)
B''	MHz	1132.48	1138.26	1129.45	1129.682(3)	3628.74476(136)
C''	MHz	868.58	873.24	867.56	866.625(3)	1129.75(3)
$\Delta I''$	amu.Å ²	-3.2	-3.20	-3.20	-3.479	-3.50
μ	D		1.74	1.78		1129.694225(50)
θ	°	7	±5.3	±7.1	±15.5(13)	866.618684(49)
						-3.46823(10)
						±9.9(3)
C3(180;0)						
ΔE	cm ⁻¹	98	81	77		
Population	%	22.4	23.7	24.1		21.5
A''	MHz	3634.53	3656.55	3654.63		3624.13(62)
B''	MHz	1135.29	1141.07	1131.30		3625.235359(91)
C''	MHz	869.84	874.48	868.63		1131.59(2)
$\Delta I''$	amu.Å ²	-3.2	-3.19	-3.20		1131.967582(42)
μ	D		2.01	1.92		867.48(2)
θ	°	3	±80.3	±78.6		867.7652716(288)
						-3.475145(40)
						±8.8(2)
C4(0;180)						
ΔE	cm ⁻¹	206	229	211		
Population	%	13.1	11.4	12.5		7.6
A''	MHz	2839.75	2858.40	2864.91		2847.05497(54)
B''	MHz	1307.00	1312.90	1297.13		1298.127597(128)
C''	MHz	900.16	904.82	897.95		897.065116(38)
$\Delta I''$	amu.Å ²	-3.21	-3.19	-3.20		-3.453841(96)
μ	D		2.41	2.45		
θ	°	19	±54.1	±53.2		

manent de 3-MP dans l'état fondamental tandis que les transitions électroniques sondées par Wilke *et al.* impliquent le moment dipolaire de transition entre l'état fondamental et le premier état excité électroniquement [217].

5.4 Analyse du spectre millimétrique du 3-MP

Les spectres millimétriques du 3-MP ont été analysés en utilisant SPFIT/SPCAT et l'interface graphique ASCP/SVIEW du package AABS. Un Hamiltonien semi-rigide de type Watson (réduction A and représentation I^r) développé jusqu'à l'ordre quartique a été utilisé pour reproduire les transition mesurées à la précision expérimentale. L'état fondamental du conformère $C2(0;0)$ a été tout d'abord attribué en utilisant les constantes rotationnelles expérimentales et le moment dipolaire expérimental de Caminati *et al.* [219]. L'ajustement a été étendu de $J''_{\max} = 22$ à 175 en incluant 6570 transitions. Les conformères $C1(180;180)$ et $C3(180;0)$ ont été identifiés dans le spectre millimétrique à partir des constantes rotationnelles de l'état fondamental ($A''; B'', C''$) déterminées par l'analyse moléculaire UV (voir Table 5.3 et Réf. [217]). Dans la gamme de fréquence 70–330 GHz, 1176 et 4623 transitions rotationnelles ont été attribuées pour $C1(180;180)$ et $C3(180;0)$, respectivement. Le plus petit nombre de transitions attribuées pour le conformère le plus stable $C1(180;180)$ est expliqué par de plus faibles composantes moments dipolaires selon a et b en comparaison avec $C2(0;0)$ et $C3(180;0)$. Des sections de 15 GHz, 1.5 GHz et 0.3 GHz du spectre millimétrique du 3-MP autour de 200 GHz sont présentées en figure 5.4 (spectre noir) mettant en évidence l'énorme densité de lignes. Même après l'analyse de l'état fondamental des trois conformères les plus stables, de nombreuses lignes de rotation sont restées non identifiées (voir figure 5.4 (spectre bleu)). En plus de reproduire au mieux le spectre expérimental, notre stratégie a été




FIGURE 5.4 – Le spectre expérimental millimétrique du 3-MP (en noir) est comparé à deux simulations de spectres : le premier (en bleu) inclut l'état fondamental de $C1(180;180)$, $C2(0;0)$ et $C3(180;0)$ observés dans d'autres gammes de fréquences dans des études précédentes ; le second (en rouge) inclut les contributions précédentes et l'état fondamental de $C4(0;180)$ et les états excités de pliage de $C2(0;0)$ et $C3(180;0)$. Une section de 15 GHz (a) est agrandie dans une fenêtre de 1.5 GHz (b), elle-même agrandie dans une section de 0.3 GHz (c), montrant ainsi la densité de raies d'absorption observées.

d'identifier la signature spectroscopique du quatrième conformère $C4(0; 180)$ jamais observé et d'analyser les états de vibration excités les plus bas. Comme le conformère $C4(0; 180)$ n'avait jamais été observé, nous avons commencé l'analyse en utilisant les constantes *ab initio* calculées au niveau de théorie B3LYP/CBS (voir table 5.3) et corrigées par un facteur d'échelle correspondant au rapport entre les constantes rotationnelles expérimentales et calculées du conformère $C2(0; 0)$. Comme pour le chapitre 3, cette méthode a permis de prédire les constantes rotationnelles de $C4(0; 180)$ avec une précision relative supérieure à 10^{-3} . Ainsi, le quatrième conformère stable du 3-MP a été observé et mis en évidence pour la première fois, 4623 transitions de type a et b dans l'état fondamental ont été attribuées dans le spectre millimétrique. Les transitions de rotation pure dans les états de pliage excités les plus bas en énergie pour les conformères $C2(0; 0)$ et $C3(180; 0)$ ont été observées et attribuées (voir table 5.4).

TABLE 5.2 – Résumé des paramètres ajustés de l'état fondamental, les incertitudes 1σ sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Dans la deuxième partie de la table sont indiqués : le nombre d'attributions N de l'ajustement, les valeurs maximales de J''_{\max} et $K''_{a \max}$, les déviations standards et les déviations standard adimensionnées.

Paramètre	Unité	C1 :(180;180)	C2 :(0;0)	C3 :(180;0)	C4 :(0;180)
		Exp.	Exp.	Exp.	Exp.
A	MHz	2840.8815(55)	3628.74476(136)	3625.235359(91)	2847.05497(54)
B	MHz	1303.52742(143)	1129.694225(50)	1131.967582(42)	1298.127597(128)
C	MHz	898.982164(103)	866.618684(49)	867.7652716(288)	897.065116(38)
Δ_J	kHz	0.05094(36)	0.02355328(113)	0.02332568(184)	0.0503420(72)
Δ_K	kHz	0.4022(153)	0.54057(103)	0.532587(35)	0.38337(36)
Δ_{JK}	kHz	-0.09793(244)	0.0631726(88)	0.0651291(157)	-0.091484(53)
δ_J	Hz	18.214(183)	5.96063(66)	5.87244(87)	17.9047(36)
δ_K	Hz	79.73(106)	85.686(40)	84.3342(277)	81.030(48)
N a-type		934	6570	0	1850
N b-type		842	0	4623	2063
J''_{\max}		130	175	159	149
$K''_{a \max}$		22	63	50	31
Déviati on standard	MHz	0.0724	0.0748	0.0758	0.0759
Déviati on standard adimensionnée	sans unité	1.035	1.065	1.083	1.084

Des calculs B3LYP/cc-PVTZ anharmoniques avec un critère de convergence SCF serré et l'option de grille intégrale ultra fine ont été réalisés pour caractériser les modes vibrationnels les plus bas et calculer le plus précisément possible la variation des constantes de rotation associées. Les deux modes fondamentaux les plus bas du 3-MP observés correspondent au pliage hors plan du groupe $-OCH_3$ et à la torsion $-CH_3$. Concernant le niveau d'énergie du pliage du methoxy $v_b = 1$, le centre de bande a été mesuré en spectroscopie IRL-TF à 78.3 cm^{-1} par le LPCA en référence [215]. Quant à la torsion du groupe méthyle, elle n'est pas active dans l'IRL et seuls des calculs DFT ont permis d'avoir une approximation de l'énergie de torsion du méthyle autour de 240 cm^{-1} [215]. Par ailleurs, une bande vibrationnelle très faible centrée autour de 152 cm^{-1} a également été observée dans le spectre IRL-TF [215], cette bande peut être associée à l'harmonique $v_b = 2$ du pliage méthoxy calculée au niveau B3LYP/cc-pVTZ anharmonique à 159 cm^{-1} (pour $C2(0; 0)$). L'ajustement des transitions

rotationnelles dans l'état excité de pliage pour le conformère $C2(0;0)$ a permis de confirmer cette hypothèse. En effet, la table 5.4 met en évidence un excellent accord entre les constantes de rotation ajustées et calculées pour $C2(0;0)$ dans $v_b = 1$ et $v_b = 2$ et pour $C3(180;0)$ dans $v_b = 1$, ce qui est également le cas pour le défaut d'inertie $\Delta I''$. Avec des valeurs négatives, $\Delta I''$ caractérise la non-planéité de la molécule qui s'amplifie par excitation de quanta vibrationnels basse-fréquence [222].

TABLE 5.3 – Première partie : résumé des paramètres ajustés dans les états excités de pliage $v_b = 1$ et $v_b = 2$ comparés aux calculs B3LYP/cc-pVTZ anharmoniques. Les incertitudes 1σ sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le défaut d'inertie est obtenu par $\Delta I'' = I_c - I_a - I_b$. Deuxième partie : le nombre N d'attributions dans l'ajustement, les valeurs maximales du nombre quantique J''_{\max} et de $K''_{a\max}$, et les déviations standard avec et sans unité.

Parameter	Unit	$v_b = 1$ C2 :(0;0)		$v_b = 1$ C3 :(180;0)		$v_b = 2$ C2 :(0;0)	
		Exp.	Calcd*	Exp.	Calc.*	Exp.	Calcd*
ν_{harm}	cm ⁻¹		87.3		86.6		174.6
ν_{anharm}	cm ⁻¹	78.3**	80.2	78.3**	82.9	151.9**	159.0
A	MHz	3615.98914(157)	3615.79	3605.03423(137)	3612.28	3603.19449(189)	3602.86
B	MHz	1130.478542(55)	1130.42	1133.495105(159)	1132.69	1131.283069(70)	1131.15
C	MHz	867.650530(47)	867.59	868.812985(55)	868.73	868.692281(56)	868.55
ΔI	amu.Å ²	-4.34266(11)	-4.284	-4.35697(15)	-4.297	-5.21953(14)	-5.192
Δ_J	kHz	0.02393331(137)		0.0235124(104)		0.02435709(178)	
Δ_K	kHz	0.55091(150)		0.49908(115)		0.52144(174)	
Δ_{JK}	kHz	0.0637319(148)		0.062605(274)		0.0642602(183)	
δ_J	Hz	5.98882(74)		5.7885(52)		6.00687(97)	
δ_K	Hz	84.276(46)		78.627(122)		81.346(59)	
N a-type		4861		0		3117	
N b-type		0		997		0	
J''_{\max}		170		144		160	
$K''_{a\max}$		57		25		55	
Déviati on standard	MHz	0.0791		0.0819		0.079	
Déviati on standard adimensionnée	unitless	1.123		1.169		1.106	

* Les fréquences et les constantes de rotation ont été calculés au niveau de théorie B3LYP/cc-pVTZ. Les constantes de rotation A, B, C ont été corrigées grâce aux équations : $[A, B, C]_{\text{Corr.}}^{v_b}(Ci) = [A, B, C]_{\text{exp.}}^0(Ci) \times \frac{[A, B, C]_{ab\text{ initio}}^{v_b}(Ci)}{[A, B, C]_{ab\text{ initio}}^0(Ci)}$.

** mesures IRL-TF [215].

A l'époque, l'analyse de Caminati *et al.* du spectre enregistré dans la bande fréquence 28-40 GHz avait conduit à l'attribution du conformère C2 (0;0) comme le plus stable et des raies de rotation pure dans un état vibrationnel excité attribué à la torsion avaient été identifiées [219]. Notre étude sur une plus large bande de fréquences couplée à des calculs ab initio plus performants corrige cette attribution avec le conformère C1 (180;180) identifié comme le plus stable et l'attribution de raies de rotation pure dans l'état de pliage du groupement méthoxy. L'étude millimétrique a permis d'étendre les attributions dans $v_b = 1$ et $v_b = 2$ de $C2(0;0)$ jusqu'à $J_{\max} = 170$ à partir des résultats de Caminati *et al.* avec une complète détermination des constantes de distorsion centrifuge. Les transitions rotationnelles dans l'état $v_b = 1$ ont également été observées et attribuées pour $C3(180;0)$. Dans ce dernier cas, une très bonne estimation des constantes rotationnelles a été obtenue en corrigeant les constantes expérimentales de l'état fondamental en appliquant un facteur d'échelle

défini par le rapport entre les constantes rotationnelles calculées B3LYP/cc-pVTZ de l'état $v_b = 1$ et celles de l'état fondamental (voir table 5.4). Il est également à noter que nous n'avons pas pu attribuer les transitions rotationnelles dans l'état $v_b = 1$ de $C1(180;180)$ et $C4(0;180)$ en raison d'intensités trop faibles. Comme le montrent les tables 5.4 et 5.4, tous les ajustements de cette étude donnent une déviation standard proche de 80 kHz (la déviation standard adimensionnée est également autour de 1) et toutes les constantes rotationnelles sont déterminées expérimentalement jusqu'aux termes d'ordre quartique et permettent de reproduire les spectres expérimentaux millimétriques à la précision expérimentale.

L'amplitude et l'orientation du moment dipolaire permanent sont très différents selon la conformation (voir table 5.3 et figure 5.3). Les calculs *ab initio* montrent que le conformère $C1(180;180)$ dont l'énergie est la plus faible a le moment dipolaire le plus faible et, réciproquement, le conformère $C4(0;180)$ avec la plus haute énergie a le plus fort moment dipolaire. Cette situation explique pourquoi les quatre conformères stables contribuent significativement au spectre des ondes millimétriques avec des raies moléculaires de l'état fondamental proches en intensité comme le montre la figure 5.5. Le bon accord entre la valeur calculée du vecteur moment dipolaire pour le conformère $C2(0;0)$ et la mesure de Stark effectuée par Caminati *et al.* [219] et sa cohérence avec le nombre de transitions de type a et de type b attribuées dans les ajustements (voir table 5.4) assure la qualité des calculs de moments dipolaires pour les autres conformères à la fois au niveau de théorie MP2/cc-PVQZ et B3LYP/CBS. Pour les conformères $C1(180;180)$ et $C4(0;180)$, des transitions de type a et de type b ont pu être attribuées, alors que pour les conformères $C2(0;0)$ et $C3(180;0)$, seules des transitions de type b et seules des transitions de type a ont été observées, respectivement. Les spectres millimétriques de l'état fondamental présentés en figures 5.4 et 5.5 ont été générés en utilisant le programme SPCAT et les composantes du vecteur dipolaire dans le plan d'inertie ab ont été fixées aux valeurs *ab initio* et les populations conformationnelles ont été ajustées à l'aide du programme ASCP afin de respecter les intensités relatives entre conformères. Par conséquent, les populations semi-expérimentales ont été déterminées pour chaque conformère (voir table 5.3). Les valeurs déterminées ne modifient pas la classification énergétique entre les quatre conformères mais les populations semi-expérimentales sont légèrement différentes des prédictions *ab initio* avec $C1(180;180)$ et $C4(0;180)$ respectivement plus et moins abondants. La figure 5.6 a montre l'évolution de la précision relative des constantes de rotation de l'état fondamental à chaque étape pour les quatre conformères du 3-MP. En comparaison avec les calculs précédents CC2/cc-PVTZ [217], les calculs B3LYP/CBS permettent une meilleure prédiction des constantes B et C d'un ordre de grandeur. Du point de vue expérimental, les constantes de rotation de l'état fondamental sont déterminées avec une précision de l'ordre du kHz et toutes les corrections de distorsion centrifuge quartiques sont déterminées. Cette




FIGURE 5.5 – (a) Le spectre millimétrique (70 - 110 GHz) en noir est comparé avec les spectres ajustés de chaque conformère dans l'état fondamental et dans les états excités de vibration ($v_b = 1, 2$). (b) et (c) sont des agrandissements de 300 MHz dans les régions 94350 et 103150 MHz, respectivement, chaque contribution est identifié avec le même code couleur que (a).

précision sur les constantes de rotation de l'état fondamental et donc sur les défauts d'inertie ont ainsi été améliorées d'au moins deux ordres de grandeur par rapport aux mesures UV [217] (voir table 5.3). Avec un tel degré de précision, on peut conclure que le défaut d'inertie n'est pas sensible ni à la conformation, ni à l'isomérisation compte tenu des résultats obtenus en spectroscopie UV résolue en rotation pour les 2-MP et 4-MP [216]. Par ailleurs, la table 5.4 montre une augmentation du défaut d'inertie avec l'excitation du pliage du groupe méthoxy, tel qu'il a déjà été observé dans le domaine micro-onde par Caminati *et al.* [219], et la bonne correspondance des valeurs de défaut d'inertie avec les calculs de chimie quantique permet de s'assurer de la bonne attribution des états excités avec le bon mode de vibration (un défaut d'inertie hors plan est négatif [222]). La molécule d'anisole présente des défauts inertiels très proches de 3-MP [223], ce dernier point semble indiquer que le groupe phénol n'a pas d'impact sur la planéité de la molécule 3-MP contrairement au groupement méthyle dans




FIGURE 5.6 – Évolution de la précision relative $\delta = |\text{expérience} - \text{calcul}| / \text{expérience}$ des constantes rotationnelles pour l'état fondamental des quatre conformères en (a) et pour les états excités de $C2(0;0)$ et $C3(180;0)$ en (b). Les constantes de rotation A, B et C correspondent respectivement aux triangles, aux carrés et aux cercles. Dans la figure (a), les calculs de niveau théorique CC2/cc-PVTZ se réfèrent aux travaux de [217], les calculs B3LYP/CBS ont été effectués dans cette étude, M. Wilke *et al.* sont des valeurs expérimentales de la référence [217], et Caminati *et al.* sont les valeurs expérimentales de la référence [219]. Dans la figure (b) les calculs anharmoniques B3LYP/cc-PVTZ ont été effectués dans cette étude, et les valeurs corrigées sont déterminées en appliquant aux constantes expérimentales de l'état fondamental le rapport $\frac{[A,B,C]_{ab}^{v_b \text{ initio}}(C_i)}{[A,B,C]_{ab}^0 \text{ initio}}(C_i)$ obtenu par les calculs anharmoniques B3LYP/cc-PVTZ.

le méthylanisole où les défauts d'inertie sont significativement plus importants que ceux du méthoxyphénol [224, 225].

5.5 Conclusions

Le spectre millimétrique de rotation pure du 3-MP a été mesuré à température ambiante en utilisant la chaîne de multiplication de fréquence du LPCA. Des calculs au niveau B3LYP/CBS et MP2/cc-PVQZ ont été réalisés dans le but d'analyser la flexibilité conformationnelle du 3-MP. En comparaison avec les travaux précédents [217, 218, 219], les analyses expérimentales et théoriques s'accordent dans l'observation de quatre conformères stables contribuant significativement au spectre de rotation du 3-MP à température ambiante, où le conformère ayant la plus basse énergie a le plus faible moment dipolaire et réciproquement, le conformère avec la plus haute énergie a le plus fort moment dipolaire. Les mesures millimétriques ont permis l'attribution de raies dans l'état fondamental au niveau de précision du kHz et de déterminer l'ensemble des constantes de distorsion centrifuge. En plus des attributions dans l'état fondamental, les transitions rotationnelles dans les états vibrationnellement excités associés au pliage hors plan du groupe methoxy ont pu être attribuées pour deux conformères. Alors que le degré de non-planéité ne semble pas sensible à la conformation et à l'isomérisation du 3-MP, cette vibration hors plan contribue au défaut inertiel de la molécule. J'ai également contribué au lancement d'une étude similaire actuellement menée par Atef Jabri (postdoc LPCA) sur le 2-MP (guaiacol) et le 4-MP (méquinol). Cette étude permettra de mieux comprendre l'influence de l'isomérisation sur le paysage conformationnel des composés méthoxy-aromatiques. Un résumé des premiers résultats de cette étude est présenté en annexe B.

Conclusions générales

La spectroscopie moléculaire a bénéficié du progrès des spectromètres, notamment en terme de sélectivité et sensibilité, et de méthodes d'analyse et de calculs de chimie quantique toujours plus avancés. Désormais, la spectroscopie rotationnelle s'oriente vers l'analyse de systèmes moléculaires plus complexes caractérisés spectralement par une forte densité de raies. La congestion spectrale des espèces étudiées dans ma thèse s'explique non seulement par de faibles constantes rotationnelles mais aussi par la présence d'états vibrationnels excités à température ambiante, une forte richesse isotopique, un haut degré de splittings dus aux mouvements de grande amplitude ou encore par un paysage conformationnel complexe. Cette thèse illustre ainsi divers scénarii à travers les études du chlorure de thionyle, des nitrotoluènes et des méthoxyphénols.

Dans cette thèse, les algorithmes évolutionnaires ont été testés sur les spectres IRL du chlorure de thionyle d'intérêts défense, environnemental et industriel. Les limites de cette méthode ont été discutées et l'analyse complétée par une approche plus traditionnelle basée sur les diagrammes de Loomis-Wood [12]. Puis, les spectres des trois isomères du nitrotoluène ciblés pour leur intérêt défense pour la Direction Générale de l'Armement ont été mesurés en phase gazeuse et à température ambiante en utilisant des méthodes hautement sélectives, réversibles et non invasives. L'analyse à haute résolution des spectres micro-ondes et millimétriques du 3-nitrotoluène (3-NT) a été valorisé dans l'article [14] présenté en annexe C et les spectres des autres isomères (2-NT et 4-NT) sont en cours d'analyse. Les résultats expérimentaux portant sur la barrière de potentiel des 2-NT et 4-NT permettront d'étudier avec précision l'influence de l'isomérisation sur la hauteur de la barrière de potentiel et de proposer des listes de raies pour leur détection future. Enfin, les méthoxyphénols ont été étudiés pour leur intérêt atmosphérique dans le cadre de mon financement par la région Haut-De-France. Le paysage conformationnel du 3-méthoxyphénol a été complètement étudié grâce aux calculs de chimie quantique et à l'analyse du spectre millimétrique mesuré à température ambiante [17]. L'étude des autres isomères du méthoxyphénol (2-MP et 4-MP) est également en cours ce qui permettra de discuter complètement du paysage conformationnel pour les différents isomères.

Mes travaux de thèse ont ouvert de nombreuses perspectives. J'ai pu développer de nouvelles collaborations au sein du laboratoire, notamment avec I. Kleiner de l'Université Paris-Est Créteil et avec W. L. Meerts de l'Université de Nimègue aux Pays-Bas et apporter de nouvelles compétences au sein du laboratoire comme l'étude de la rotation interne et l'utilisation des algorithmes évolutionnaires. Les algorithmes évolutionnaires maintenant installés sur le serveur de calculs CALCULCO pourront être utilisés dans de futurs travaux au sein du LPCA et pourront être améliorés en collaboration avec l'équipe OSME (Optimisation, Simulation, Modélisation Evolutionnaire) du LISIC de l'Université du Littoral Côte d'Opale spécialisée dans ce type d'algorithmes. L'étude des nitrotoluènes, le traitement des données utilisé et les améliorations instrumentales ont également ouvert le champs à l'étude de molécules faiblement volatiles présentant des spectres faiblement intenses et très denses. L'étude des nitrotoluènes est également un premier pas vers la détection d'explosifs, elle a permis de mettre en évidence les points forts et les lacunes de la spectroscopie de rotation pure. En plus d'être hautement sélectif, le développement d'un appareil portatif utilisant les technologies millimétriques devra donc satisfaire une grande sensibilité afin d'utiliser les listes de raies générées par l'étude en laboratoire de ces composés. Enfin, l'étude de molécules aromatiques oxygénées de type méthoxyphénols s'inscrivent parfaitement dans les thématiques atmosphériques du laboratoire en tant que précurseurs d'AOS issus de la combustion de feux de biomasse. L'observation de ce type de molécules dans l'atmosphère permettra d'améliorer la compréhension des mécanismes de réaction dans l'atmosphère à partir des résultats obtenus en chambre de simulation [19].

Bibliographie

- [1] G. Herzberg. *Atomspektren und Atomstruktur. Eine Einführung für Chemiker, Physiker und Physikochemiker*. Steinkopf, Dresden/Leipzig, 1936.
- [2] G. Herzberg. *Molecular Spectra and Molecular Structure, Vol. I, Spectra of Diatomic Molecules*. van Nostrand Reinhold, New York, 1950.
- [3] G. Herzberg. *Molecular Spectra and Molecular Structure, Vol. II, Infrared and Raman Spectra of Polyatomic molecules*. van Nostrand, New York, 1945.
- [4] G. Herzberg. *Molecular Spectra and Molecular Structure, Vol. III, Electronic Spectra and Electronic Schedule*. Dunod, 1966.
- [5] J. A. Hageman, R. Wehrens, R. de Gelder, W. L. Meerts, and L. M. C. Buydens. *J. Chem. Phys.*, 113(18) :7955–7962, 2000.
- [6] W. L. Meerts, M. Schmitt, and G. C. Groenenboom. *Can. J. Phys.*, 82(6) :804–819, 2004.
- [7] W. L. Meerts and M. Schmitt. *Phys. Scripta*, 73(1) :C47, 2005.
- [8] W. L. Meerts and M. Schmitt. *Int. Rev. Phys. Chem.*, 25(3) :353–406, 2006.
- [9] J. Wilke, M. Wilke, W. L. Meerts, and M. Schmitt. *J. Chem. Phys.*, 144 :044201, 2016.
- [10] G. M. P. Just, P. Rupper, T. A. Miller, and W. L. Meerts. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 12(18) :4773–4782, 2010.
- [11] J. van Wijngaarden, D. Desmond, and W. L. Meerts. *J. Mol. Spectrosc.*, 315 :107–113, 2015.
- [12] A. Roucou, G. Dhont, A. Cuisset, M.-A. Martin-Drumel, S. Thorwirth, D. Fontanari, and W. L. Meerts. *J. Chem. Phys.*, 147(5) :054303, 2017.
- [13] T. J. Johnson, R. S. Disselkamp, Y.-F. Su, R. J. Fellows, M. L. Alexander, and C. J. Driver. *J. Phys. Chem. A*, 107(32) :6183–6190, 2003.
- [14] A. Roucou, I. Kleiner, M. Goubet, S. Bteich, G. Mouret, R. Bocquet, F. Hindle, W. L. Meerts, and A. Cuisset. *Chem. Phys. Chem.*, 2018.

- [15] F. C. De Lucia. *J. Mol. Spectrosc.*, 261(1) :1–17, 2010.
- [16] H. Diez y Riega, R. Gunawidjaja, and H. Eilers. *J. Photochem. Photobio. A*, 268 :50–57, 2013.
- [17] A. Roucou, D. Fontanari, G. Dhont, A. Jabri, C. Bray, G. Mouret, R. Bocquet, and A. Cuisset. *Chem. Phys. Chem.*, 19 :1–8, 2018.
- [18] W. Ahmad, C. Coeur, A. Tomas, T. Fagniez, J.-B. Brubach, and A. Cuisset. *Appl. Optics*, 56(11) :E116–E122, 2017.
- [19] A. Lauraguais, C. Coeur-Tourneur, A. Cassez, K. Deboudt, M. Fourmentin, and M. Choël. *Atmos. Environ.*, 86 :155–163, 2014.
- [20] C. H. Townes and A. L. Schawlow. *Microwave Spectroscopy*. McGraw-Hill, New York, 1955.
- [21] Albert Messiah. *Mécanique quantique*. Dunod, 1995.
- [22] Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu, and Franck Laloë. *Mécanique quantique. Tome I*. Hermann, 1973.
- [23] H. W. Kroto. *Molecular Rotation Spectra*. John Wiley, London, 1975.
- [24] J.J. Sakurai. *Modern Quantum Mechanics*. Benjamin Cummings Publishing, 1985.
- [25] J.J. Sakurai. *Quantum Mechanics : Non-relativistic Theory, 3rd edition*. Course of Theoretical Physics, Pergamon Press, Oxford, Vol. 3., 1985.
- [26] Walter Gordy, Robert Lee Cook, et al. *Microwave molecular spectra*. Wiley, 1984.
- [27] Quack M. Grabow, J.-U. and F. Merkt. *Handbook of high resolution spectroscopy*. John Wiley & Sons, Ltd, 2011.
- [28] John M. Brown and Alan Carrington. *Rotational Spectroscopy of Diatomic Molecules*. Cambridge University Press, 2003.
- [29] K. Yamada and M. Winnewisser. *Z. Naturforsch. A*, 31(2) :131–138, 1976.
- [30] J. K. G. Watson. *J. Chem. Phys.*, 46(5) :1935–1949, 1967.
- [31] J. K. G. Watson. *J. Mol. Spectrosc.*, 65(1) :123–133, 1977.
- [32] C. Bray, A. Cuisset, F. Hindle, G. Mouret, R. Bocquet, and V. Boudon. *J. Quant. Spectrosc. Rad. Transfer*, 203 :349–354, 2017.
- [33] C. Puzzarini, J. F. Stanton, and J. Gauss. *Int. Rev. Phys. Chem.*, 29(2) :273–367, 2010.
- [34] H. B. G. Casimir. In *On the Interaction between Atomic Nuclei and Electrons*, pages 201–283. Springer, 1936.
- [35] O. Pirali, M. Goubet, V. Boudon, L. D’accolti, C. Fusco, and C. Annese. *J. Mol. Spectrosc.*, 338 :6–14, 2017.

- [36] R. D. Suenram, G. Y. Golubiatnikov, I. I. Leonov, J. T. Hougen, J. Ortigoso, I. Kleiner, and G. T. Fraser. *J. Mol. Spectrosc.*, 208(2) :188–193, 2001.
- [37] P. F. Bernath. *Spectra of Atoms and Molecules*. Oxford University Press, New York, 1995.
- [38] G. Herzberg. *Molecular Spectra and Molecular Structure II : Infrared and Raman Spectra of Polyatomic Molecules*. Van Nostrand, Princeton, N.J., 1945.
- [39] C. C. Lin and J. D. Swalen. *Rev. Mod. Phys.*, 31(4) :841, 1959.
- [40] H. Dreizler. *Z. Naturforsch. A*, 16(12) :1354–1367, 1961.
- [41] O. Baum, T. F. Giesen, and S. Schlemmer. *J. Mol. Spectrosc.*, 247(1) :25–29, 2008.
- [42] S. Yu, J. C. Pearson, B. J. Drouin, K. Sung, O. Pirali, M. Vervloet, M.-A. Martin-Drumel, C. P. Endres, T. Shiraishi, K. Kobayashi, et al. *J. Chem. Phys.*, 133(17) :174317, 2010.
- [43] V. V. Ilyushin, Z. Kisiel, L. Pszczolkowski, H. Mäder, and J. T. Hougen. *J. Mol. Spectrosc.*, 259 :26–38, 2010.
- [44] V. V. Ilyushin, R. Rizzato, L. Evangelisti, G. Feng, A. Maris, S. Melandri, and W. Caminati. *J. Mol. Spectrosc.*, 267 :186–190, 2011.
- [45] D. R. Herschbach. *J. Chem. Phys.*, 31 :91–108, 1959.
- [46] I. Kleiner. *J. Mol. Spectrosc.*, 260(1) :1–18, 2010.
- [47] Z. Kisiel, L. Pszczółkowski, E. Białkowska-Jaworska, and S.B. Charnley. *J. Mol. Spectrosc.*, 241(2) :220–229, 2007.
- [48] A. Kraśnicki, L. Pszczółkowski, and Z. Kisiel. *J. Mol. Spectrosc.*, 260(1) :57–65, 2010.
- [49] D. Gerhard, A. Hellweg, I. Merke, W. Stahl, M. Baudelet, D. Petitprez, and G. Włodarczyk. *J. Mol. Spectrosc.*, 220(2) :234–241, 2003.
- [50] D. G. Burkhard and D. M. Dennison. *Phys. Rev.*, 84(3) :408, 1951.
- [51] E. V. Ivash and D. M. Dennison. *J. Chem. Phys.*, 21(10) :1804–1816, 1953.
- [52] K. T. Hecht and D. M. Dennison. *J. Chem. Phys.*, 26(1) :31–47, 1957.
- [53] K. T. Hecht and D. M. Dennison. *J. Chem. Phys.*, 26(1) :48–69, 1957.
- [54] D. Jelisavac, D. C. Gómez, H. Nguyen, L. Sutikdja, W. Stahl, and I. Kleiner. *J. Mol. Spectrosc.*, 257(2) :111–115, 2009.
- [55] L. A. Pugh and R. K. Narahari. In *Molecular Spectroscopy : Modern Research, Volume II*, page 165, 1976.
- [56] K.N. Rao. *Molecular Spectroscopy : Modern Research*. K.N. Rao Eds., 1985.

- [57] F. Rohart, H. Mäder, and H.-W. Nicolaisen. *J. Chem. Phys.*, 101(8) :6475–6486, 1994.
- [58] L. Galatry. *Phys. Rev.*, 122(4) :1218, 1961.
- [59] M. Nelkin and A. Ghatak. *Phys. Rev.*, 135(1A) :A4, 1964.
- [60] J. Tennyson, P. F. Bernath, A. Campargue, A. G. Császár, L. Daumont, R. R. Gamache, J. T. Hodges, D. Lisak, O. V. Naumenko, L. S. Rothman, et al. *Pure Appl. Chem.*, 86(12) :1931–1943, 2014.
- [61] M. Finch, A. Friss, A. Kustas, and J. Slavik. In *COSGC Space Research Symposium*, 2012.
- [62] P. W. Anderson. *Phys. Rev.*, 76(5) :647, 1949.
- [63] H. M. Pickett, R. L. Poynter, E. A. Cohen, M. L. Delitsky, J. C. Pearson, and H. S. P. Müller. *J. Quant. Spectrosc. Rad. Transfer*, 60(5) :883–890, 1998.
- [64] C. Favre, M. Carvajal, D. Field, J. K. Jørgensen, S. E. Bisschop, N. Brouillet, D. Despois, A. Baudry, I. Kleiner, E. A. Bergin, et al. *Astrophys. J. Suppl. S.*, 215(2) :25, 2014.
- [65] V. V. Ilyushin, I. Kleiner, and F. J. Lovas. *J Phys. Chem. Ref. Data*, 37(1) :97–265, 2008.
- [66] M. A. Mekhtiev, P. D. Godfrey, and J. T. Hougen. *J. Mol. Spectrosc.*, 194(2) :171–178, 1999.
- [67] I. E. Gordon, L. S. Rothman, C. Hill, R. V. Kochanov, Y. Tan, P. F. Bernath, M. Birk, V. Boudon, A. Campargue, K. V. Chance, et al. *J. Quant. Spectrosc. Rad. Transfer*, 203 :3–69, 2017.
- [68] The HITRAN Database : <http://www.cfa.harvard.edu/hitran>.
- [69] N. Jacquinet-Husson, L. Crepeau, R. Armante, C. Boutammine, A. Chédin, N. A. Scott, C. Crevoisier, V. Capelle, C. Boone, N. Poulet-Crovisier, et al. *J. Quant. Spectrosc. Rad. Transfer*, 112(15) :2395–2445, 2011.
- [70] The GEISA Database : <http://cds-espri.ipsl.upmc.fr/geisa/>.
- [71] The JPL database : <https://spec.jpl.nasa.gov/>.
- [72] C. P. Endres, S. Schlemmer, P. Schilke, J. Stutzki, and H. S. P. Müller. *J. Mol. Spectrosc.*, 327 :95–104, 2016.
- [73] The Cologne Database for Molecular Spectroscopy : <https://www.astro.uni-koeln.de/cdms>.
- [74] F. W. Loomis and R. W. Wood. *Phys. Rev.*, 32(1) :223–236, 1928.
- [75] M. Born and R. Oppenheimer. *Ann. Phys.*, 389(20) :457–484, 1927.

- [76] Attila Szabo and Neil S Ostlund. *Modern quantum chemistry : introduction to advanced electronic structure theory*. Courier Corporation, 2012.
- [77] C. C. J. Roothaan. *Rev. Mod. Phys.*, 23(2) :69, 1951.
- [78] P. Hohenberg and W. Kohn. *Phys. Rev.*, 136(3B) :B864, 1964.
- [79] C. Ochsenfeld, J. Kussmann, and D. S. Lambrecht. *Rev. Comp. Ch.*, 23 :1, 2007.
- [80] R. J. Bartlett. *Annu. Rev. Phys. Chem.*, 32(1) :359–401, 1981.
- [81] P. von Ragué Schleyer. *Encyclopedia of computational chemistry, vol. IV*. P. v. R. Schleyer, N. L. Allinger, T. Clark, J. Gasteiger, P. A. Kollman, H. F. Schaefer III, and P. R. Schreiner (John Wiley, New York), 1998.
- [82] C. Møller and M. S. Plesset. *Phys. Rev.*, 46(7) :618, 1934.
- [83] R. J. Bartlett. *J. Phys. Chem.-US*, 93(5) :1697–1708, 1989.
- [84] R. J. Bartlett and J. F. Stanton. *Rev. Comp. Ch.*, 5 :65–169, 2007.
- [85] R. J. Bartlett. *Modern Electronic Structure Theory*. D. R. Yarkony (World Scientific, Singapore), 1995.
- [86] J. Gauss. *Encyclopedia of Computational Chemistry, vol. III*. P. v. R. Schleyer, N. L. Allinger, T. Clark, J. Gasteiger, P. A. Kollman, H. F. Schaefer III, and P. R. Schreiner (John Wiley, New York), 1998.
- [87] T. D. Crawford and H. F. Schaefer. *Rev. Comp. Ch.*, 14 :33–136, 2000.
- [88] R. J. Bartlett and M. Musiał. *Rev. Mod. Phys.*, 79(1) :291, 2007.
- [89] M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P. Hratchian, A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery Jr, J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers, K. N. Kudin, V. N. Staroverov, R. Kobayashi, J. Normand, K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels, O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski, and D. J. Fox. Gaussian 09 Revision D.01. *Gaussian Inc. Wallingford CT*, 2009.
- [90] voir <https://bse.pnl.gov/bse/portal>.

- [91] E. R. Davidson and D. Feller. *Chem. Rev.*, 86(4) :681–696, 1986.
- [92] J. Almlöf and P. R. Taylor. Atomic natural orbital (ano) basis sets for quantum chemical calculations. In *Advances in Quantum Chemistry*, volume 22, pages 301–373. Elsevier, 1991.
- [93] K. A. Peterson T. H. Dunning Jr and D. E. Woon. *Encyclopedia of Computational Chemistry*. P. v. R. Schleyer, N. L. Allinger, T. Clark, J. Gasteiger, P. A. Kollman, H. F. Schaefer III, and P. R. Schreiner (John Wiley, Chichester), 1998.
- [94] T. H. Dunning Jr. *J. Chem. Phys.*, 90(2) :1007–1023, 1989.
- [95] D. E. Woon and T. H. Dunning Jr. *J. Chem. Phys.*, 100(4) :2975–2988, 1994.
- [96] Z. Kisiel, E. Białkowska-Jaworska, and L. Pszczółkowski. *J. Chem. Phys.*, 109(23) :10263–10272, 1998.
- [97] Z. Kisiel, E. Białkowska-Jaworska, and L. Pszczółkowski. *J. Mol. Spectrosc.*, 199(1) :5–12, 2000.
- [98] W. Lodyga, M. Kreglewski, P. Pracna, and S. Urban. *J. Mol. Spectrosc.*, 243(2) :182–188, 2007.
- [99] www.bruker.com/fr/products/infrared-near-infrared-and-raman-spectroscopy/opus-spectroscopy-software.html.
- [100] W. Lodyga, P. Pracna, M. Kreglewski, Adam Mickiewicz University, LWW software, <http://www.lww.amu.edu.pl/features.htm>.
- [101] M. H. Pickett. *J. Mol. Spectrosc.*, 148(2) :371–377, 1991.
- [102] [spinv.pdf sur https://spec.jpl.nasa.gov/ftp/pub/calpgm/](https://spec.jpl.nasa.gov/ftp/pub/calpgm/).
- [103] H. M. Pickett. *J. Chem. Phys.*, 107(17) :6732–6735, 1997.
- [104] A. J. Apponi, J. J. Hoy, D. T. Halfen, L. M. Ziurys, and M. A. Brewster. *Astrophys. J.*, 652(2) :1787, 2006.
- [105] D. T. Petkie, T. M. Goyette, P. Helminger, H. M. Pickett, and F. C. De Lucia. *J. Mol. Spectrosc.*, 208(1) :121–135, 2001.
- [106] références c060003 (Methyl Formate), c044003 (Acetaldehyde) et c075004 (Methyl Carbamate) sur <https://spec.jpl.nasa.gov/ftp/pub/catalog/archive/>.
- [107] B. J. Drouin. *J. Mol. Spectrosc.*, 340 :1–15, 2017.
- [108] H. Hartwig and H. Dreizler. *Z. Naturforsch. A*, 51(8) :923–932, 1996.
- [109] N. Hansen, H. Mäder, and T. Bruhn. *Mol. Phys.*, 97(4) :587–595, 1999.
- [110] R. Kannengießer, W. Stahl, H. V. L. Nguyen, and I. Kleiner. *J. Phys. Chem. A*, 120(23) :3992–3997, 2016.

- [111] V. V. Ilyushin, Z. Kisiel, L. Pszczółkowski, H. Mäder, and J. T. Hougen. *J. Mol. Spectrosc.*, 259(1) :26–38, 2010.
- [112] V. V. Ilyushin, E. A. Alekseev, Z. Kisiel, and L. Pszczółkowski. *J. Mol. Spectrosc.*, 339 :31–39, 2017.
- [113] V. V. Ilyushin. *J. Mol. Spectrosc.*, 345 :64–69, 2018.
- [114] O. Zakharenko. Spectroscopie thz de molécules atmosphériques. application à l'étude de composés organiques volatils. Ph. D. thesis of the University Lille 1, page 176, 2016.
- [115] J. T. Hougen, I. Kleiner, and M. Godefroid. *J. Mol. Spectrosc.*, 163(2) :559–586, 1994.
- [116] C. M. Western and B. E. Billinghurst. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 19(16) :10222–10226, 2017.
- [117] A. Gawelcyk A. Ostenmeier and N. Hansen. *Problem Solving from Nature PPSN III*. ed. Y. Davidor, H.-P. Schwefel, and R. Männer, Springer, Berlin/Heidelberg, 1994.
- [118] Nikolaus Hansen. The cma evolution strategy : a comparing review. In *Towards a new evolutionary computation*, pages 75–102. Springer, 2006.
- [119] N. Hansen and A. Ostermeier. *Evol. Comput.*, 9(2) :159–195, 2001.
- [120] Nikolaus Hansen and Stefan Kern. In *International Conference on Parallel Problem Solving from Nature*, pages 282–291. Springer, 2004.
- [121] R. Wehrens, E. Pretsch, and L. M. C. Buydens. *Anal. Chim. Acta*, 388(3) :265–271, 1999.
- [122] G. Mouret, F. Hindle, A. Cuisset, C. Yang, R. Bocquet, M. Lours, and D. Rovera. *Opt. Express*, 17(24) :22031–22040, 2009.
- [123] F. Hindle, G. Mouret, S. Eliet, M. Guinet, A. Cuisset, R. Bocquet, T. Yasui, and D. Rovera. *Appl. Phys. B*, 104(4) :763, 2011.
- [124] G. Mouret, M. Guinet, A. Cuisset, L. Croize, S. Eliet, R. Bocquet, and F. Hindle. *IEEE Sens. J.*, 13(1) :133–138, 2013.
- [125] F. Hindle, C. Bray, K. Hickson, D. Fontanari, M. Mouelhi, A. Cuisset, G. Mouret, and R. Bocquet. *J. Infrared Millim. Te.*, 39(1) :105–119, 2018.
- [126] M. Tudorie, L. H. Coudert, T. R. Huet, D. Jegouso, and G. Sedes. *J. Chem. Phys.*, 134(7) :074314, 2011.
- [127] J.-U. Grabow, W. Stahl, and H. Dreizler. *Rev. Sci. Instrum.*, 67(12) :4072–4084, 1996.
- [128] T. J. Balle and W. H. Flygare. *Rev. Sci. Instrum.*, 52(1) :33–45, 1981.
- [129] J. Grabow, W. Stahl, and H. Dreizler. *Rev. Sci. Instrum.*, 67(12) :4072–4084, 1996.

- [130] S. Kassı, D. Petitprez, and G. Włodarczak. *J. Mol. Struct.*, 517 :375–386, 2000.
- [131] <http://www.phlam.univ-lille1.fr/spip.php?article763>.
- [132] H. Lefebvre-Brion and R. W. Field. *The Spectra and Dynamics of Diatomic Molecules : Revised and Enlarged Edition*. Elsevier, 2004.
- [133] I. I. Rabi. *Phys. Rev.*, 51(8) :652, 1937.
- [134] A. M. Daly, L. Kolesnikova, S. Mata, and J. L. Alonso. *J. Mol. Spectrosc.*, 306 :11–18, 2014.
- [135] L. Dore. *J. Mol. Spectrosc.*, 221(1) :93–98, 2003.
- [136] R. Karplus. *Phys. Rev.*, 73(9) :1027, 1948.
- [137] G. Cazzoli and L. Dore. *J. Mol. Spectrosc.*, 141(1) :49–58, 1990.
- [138] J. Reid and D. Labrie. *Appl. Phys. B*, 26(3) :203–210, 1981.
- [139] G. Cazzoli and C. Puzzarini. *J. Mol. Spectrosc.*, 240(2) :153–163, 2006.
- [140] V. P. Kochanov, S. P. Belov, and G. Y. Golubiatnikov. *J. Quant. Spectrosc. Rad. Transfer*, 149 :146–157, 2014.
- [141] R. S. Winton and W. Gordy. *Phys. Lett. A*, 32(4) :219–220, 1970.
- [142] G. Y. Golubiatnikov, S. P. Belov, I. I. Leonov, A. F. Andriyanov, I. I. Zinchenko, A. V. Lapinov, V. N. Markov, A. P. Shkaev, and A. Guarnieri. *Radiophys. Quantum. El.*, 56(8-9) :599–609, 2014.
- [143] Raymond Sheridan Winton II (supervisor : W. Gordy. Observations and applications of the lamb-dip in millimeter-wave molecular-spectroscopy. Ph. D. thesis, department of Physics, Duke University, Durham, United States of America, pages 76-91, 1972.
- [144] M.-A. Martin-Drumel, F. Hindle, G. Mouret, A. Cuisset, and J. Cernicharo. *Astrophys. J.*, 799(2) :115, 2015.
- [145] J.-B. Brubach, L. Manceron, M. Rouzıeres, O. Pirali, D. Balcon, F. K. Tchana, V. Boudon, M. Tudorie, T. Huet, A. Cuisset, et al. In *AIP Conf. Proc.*, volume 1214, pages 81–84. AIP, 2010.
- [146] D. Jacquemart, L. Gomez, N. Lacome, J.-Y. Mandin, O. Pirali, and P. Roy. *J. Quant. Spectrosc. Rad. Transfer*, 111(9) :1223–1233, 2010.
- [147] Peter R Griffiths and James A De Haseth. *Fourier transform infrared spectrometry*, volume 171. John Wiley & Sons, 2007.
- [148] V.-M. Horneman, R. Anttila, S. Alanko, and J. Pietilä. *J. Mol. Spectrosc.*, 234(2) :238–254, 2005.

- [149] F. Matsushima, H. Odashima, T. Iwasaki, S. Tsunekawa, and K. Takagi. *J. Mol. Struct.*, 352 :371–378, 1995.
- [150] L. A. Corio, T. S. Ziolkowski, J. K. Walker, W. B. Jones, and T. Belisle. *J. Air Waste Manage., Pittsburgh, PA 15222(USA)*, 1996.
- [151] C. Y. Lee and M. S. Strano. *J. Am. Chem. Soc.*, 130(5) :1766–1773, 2008.
- [152] M.-A. Martin-Drumel, G. Mouret, O. Pirali, and A. Cuisset. *J. Mol. Spectrosc.*, 315 :30–36, 2015.
- [153] A. P. Uthman, P. J. Demlein, T. D. Allston, M. C. Withiam, M. J. McClements, and G. A. Takacs. *J. Phys. Chem.-US*, 82(20) :2252–2257, 1978.
- [154] D. E. Martz and R. T. Lagemann. *J. Chem. Phys.*, 22(7) :1193–1195, 1954.
- [155] M.-A. Martin-Drumel, A. Roucou, G. G. Brown, S. Thorwirth, O. Pirali, G. Mouret, F. Hindle, M. C. McCarthy, and A. Cuisset. *J. Chem. Phys.*, 144(8) :084305, 2016.
- [156] I. Merke and H. Dreizler. *Z. Naturforsch. A*, 47(11) :1150–1152, 1992.
- [157] A. Dubrulle and D. Boucher. *CR Acad. Sci. B Phys.*, 274(26) :1426, 1972.
- [158] H. S. P. Müller and M. C. L. Gerry. *J. Chem. Soc. Faraday T.*, 90(23) :3473–3481, 1994.
- [159] J. Burie, J.-L. Destombe, A. Dubrulle, and G. Journal. *CR Acad. Sci. B Phys.*, 267(1) :48, 1968.
- [160] G. Journal. PhD thesis. Ph. D. thesis of the University of Lille, 1969.
- [161] Sigma-Aldrich, Thionyl chloride, reagent grade, 97%, reference 320536. (2016).
- [162] W. J. Lafferty, J.-M. Flaud, R. L. Sams, and E. H. Abib Ngom. *J. Mol. Spectrosc.*, 252(1) :72–76, 2008.
- [163] Documentation de SPFIT et SPCAT, section “Format of the .par file and .var files”, <https://spec.jpl.nasa.gov/ftp/pub/calpgm/spinv.pdf>.
- [164] K. Raghavachari, G. W. Trucks, J. A. Pople, and M. Head-Gordon. *Chem. Phys. Lett.*, 157(6) :479–483, 1989.
- [165] G. W. Harter. *Comput. Phys. Rep.*, 8(6) :319–394, 1988.
- [166] D. A. Sadovskii and B. I. Zhilinskii. *Mol. Phys.*, 65(1) :109–128, 1988.
- [167] G. Dhont, D. Sadovskii, B. Zhilinskii, and V. Boudon. *J. Mol. Spectrosc.*, 201(1) :95–108, 2000.
- [168] H. Östmark, S. Wallin, and H. G. Ang. *Propell. Explos. Pyrot.*, 37(1) :12–23, 2012.
- [169] D. S. Moore. *Rev. Sci. Instrum.*, 75(8) :2499–2512, 2004.

- [170] A. R. Krause, C. Van Neste, L. Senesac, T. Thundat, and E. Finot. *J. Appl. Phys.*, 103(9) :094906, 2008.
- [171] M. Snels, T. Venezia, and L. Belfiore. *Chem. Phys. Lett.*, 489(1) :134–140, 2010.
- [172] R. Prasad, R. Prasad, G. Bhar, and S. Thakur. *Spectrochim. Acta A*, 58(14) :3093–3102, 2002.
- [173] A. G. Mercado, J. A. Janni, and B. Gilbert. *SPIE Proc.*, 2511 :142–152, 1995.
- [174] D. Wu, J. P. Singh, F. Y. Yueh, and D. L. Monts. *Appl. Optics*, 35(21) :3998–4003, 1996.
- [175] C. Mullen, A. Irwin, B. V. Pond, D. L. Huestis, M. J. Coggiola, and H. Oser. *Anal. Chem.*, 78(11) :3807–3814, 2006.
- [176] R. G. Ewing and C. J. Miller. *Field Anal. Chem. Tech.*, 5(5) :215–221, 2001.
- [177] S. Moore, M. Schantz, and W. MacCrehan. *Propell. Explos. Pyrot.*, 35(6) :540–549, 2010.
- [178] J. A. Widegren and T. J. Bruno. *J. Chem. Eng. Data*, 55(1) :159–164, 2009.
- [179] A. Cuisset, S. Gruet, O. Pirali, T. Chamailié, and G. Mouret. *Spectroc. Acta A*, 132 :838–845, 2014.
- [180] V. V. Ilyushin, E. Alekseev, S. Dyubko, I. Kleiner, and J. T. Hougen. *J. Mol. Spectrosc.*, 227(2) :115–139, 2004.
- [181] R. J. Foltynowicz, R. E. Allman, and E. Zuckerman. *Chem. Phys. Lett.*, 431(1) :34–38, 2006.
- [182] A. Cuisset, M. A. Martin-Drumel, F. Hindle, G. Mouret, and D. A. Sadvskii. *Chem. Phys. Lett.*, 586 :10–15, 2013.
- [183] O. Pirali, Z. Kisiel, M. Goubet, S. Gruet, M. A. Martin-Drumel, A. Cuisset, F. Hindle, and G. Mouret. *J. Chem. Phys.*, 142 :104310, 2015.
- [184] R. A. Kendall, T. H. Dunning Jr, and R. J. Harrison. *J. Chem. Phys.*, 96(9) :6796–6806, 1992.
- [185] D. E. Woon and T. H. Dunning Jr. *J. Chem. Phys.*, 101(10) :8877–8893, 1994.
- [186] V. Barone. *J. Chem. Phys.*, 122(1) :014108, 2005.
- [187] M. Biczysko, P. Panek, G. Scalmani, J. Bloino, and V. Barone. *J. Chem. Theory Comput.*, 6(7) :2115–2125, 2010.
- [188] S. Grimme and M. Steinmetz. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 15 :16031–16042, 2013.
- [189] M. Goubet, P. Soulard, O. Pirali, P. Asselin, F. Real, S. Gruet, T. R. Huet, P. Roy, and R. Georges. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 17 :7477–7488, 2015.

- [190] N. W. Larsen. *J. Mol. Struct.*, 963 :100–105, 2010.
- [191] <http://nqcc.wcbailey.net/>.
- [192] W. C. Bailey. *Chem. Phys.*, 252 :57–66, 2000.
- [193] M. Goubet, R. A. Motiyenko, L. Margulès, and J.-C. Guillemin. *J. Phys. Chem. A*, 116(22) :5405–5409, 2012.
- [194] A. C. Legon. *Angew. Chem. Int. Edit.*, 38(18) :2686–2714, 1999.
- [195] A. P. Cox, S. Waring, and K. Morgenstern. *Nature Phys. Science*, 229 :22–23, 1971.
- [196] J.-U. Grabow. *Handbook of high-resolution spectroscopy, Vol. 2*. John Wiley & Sons, Ltd, 2011.
- [197] A. Jabri. Spectroscopie à haute résolution de molécules organiques d'intérêt astrophysique et atmosphérique contenant un ou deux rotateurs internes. Ph. D. thesis of the Sorbonne Paris Cité university, page 231, 2016.
- [198] I. Kleiner, J. T. Hougen, J. U. Grabow, S. P. Belov, M. Y. Tretyakov, and J. Cosléou. *J. Mol. Spectrosc.*, 179 :41–60, 1996.
- [199] G. Myszkiwicz, W. L. Meerts, C. Ratzler, and M. Schmitt. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 23a :68–76, 1968.
- [200] J. A. Ruiz-Santoyo, J. Wilke, M. Wilke, J. T. Yi, D. W. Pratt, M. Schmitt, and L. Alvarez-Valtierra. *J. Chem. Phys.*, 144 :044303, 2016.
- [201] C. Thomsen and H. Dreizler. *Z. Naturforsch.*, 56 :635–640, 2001.
- [202] Z. Kisiel, E. Bialkowska-Jaworska, L. Pszczolkowski, H. Mäder, and J. T. Hougen. *J. Mol. Spectrosc.*, 227 :109–113, 2004.
- [203] A. Welzel, A. Hellweg, I. Merke, and W. Stahl. *J. Mol. Spectrosc.*, 215(1) :58–65, 2002.
- [204] H. D. Rudolph and A. Trinkaus. *Z. Naturforsch. A*, 23(1) :68–76, 1968.
- [205] J. Susskind. *J. Chem. Phys.*, 53(6) :2492–2501, 1970.
- [206] K. Okuyama, N. Mikami, and M. Ito. *Laser Chem.*, 7 :197–211, 1987.
- [207] G. Myszkiwicz, W. L. Meerts, C. Ratzler, and M. Schmitt. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 7(10) :2142–2150, 2005.
- [208] K. Okuyama, N. Mikami, and M. Ito. *J. Phys. Chem.-US*, 89(26) :5617–5625, 1985.
- [209] X.-Q. Tan and D. W. Pratt. *J. Chem. Phys.*, 100(10) :7061–7067, 1994.
- [210] P. N. Ghosh. *J. Mol. Spectrosc.*, 138(2) :505–520, 1989.
- [211] Iarc monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, *printing processes and printing inks, carbon black and some nitro compounds ; vol. 65*, iarc press, 1996.

- [212] M. A. Koshelev, A. I. Tsvetkov, M. V. Morozkin, M. Y. Glyavin, and M. Y. Tretyakov. *J. Mol. Spectrosc.*, 331 :9–16, 2017.
- [213] R. Braakman and G. A. Blake. *J. Appl. Phys.*, 109(6) :063102, 2011.
- [214] T. Osborn, W. A. Burns, J. Green, and S. W. Reeve. *Spectroscopy*, 26(1) :34–45, 2011.
- [215] A. Cuisset, C. Coeur, G. Mouret, W. Ahmad, A. Tomas, and O. Pirali. *J. Quant. Spectrosc. Rad. Transfer*, 179 :51–58, 2016.
- [216] J. A. Ruiz-Santoyo, M. Rodriguez-Matus, J. L. Cabellos, J. T. Yi, D. W. Pratt, M. Schmitt, G. Merino, and L. Álvarez-Valtierra. *J. Chem. Phys.*, 143(9), 2015.
- [217] M. Wilke, M. Schneider, J. Wilke, J.A. Ruiz-Santoyo, J.J. Campos-Amador, M.E. Gonzalez-Medina, L. Alvarez-Valtierra, and M. Schmitt. *J. Mol. Struct.*, 1140 :59–66, 2017.
- [218] S. Ullrich, W. D. Geppert, C. E. H. Dessent, and K. Müller-Dethlefs. *J. Phys. Chem. A*, 104(51) :11864–11869, 2000.
- [219] W. Caminati, S. Melandri, and L. B. Favero. *J. Mol. Spectrosc.*, 161(2) :427–434, 1993.
- [220] J. L. Neill, B. J. Harris, A. L. Steber, K. O. Douglass, D. F. Plusquellic, and B. H. Pate. *Opt. Express*, 21(17) :19743–19749, 2013.
- [221] M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, G. A. Petersson, H. Nakatsuji, X. Li, M. Caricato, A. V. Marenich, J. Bloino, B. G. Janesko, R. Gomperts, B. Mennucci, H. P. Hratchian, J. V. Ortiz, A. F. Izmaylov, J. L. Sonnenberg, D. Williams-Young, F. Ding, F. Lipparini, F. Egidi, J. Goings, B. Peng, A. Petrone, T. Henderson, D. Ranasinghe, V. G. Zakrzewski, J. Gao, N. Rega, G. Zheng, W. Liang, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, K. Throssell, J. A. Montgomery, Jr., J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. J. Bearpark, J. J. Heyd, E. N. Brothers, K. N. Kudin, V. N. Staroverov, T. A. Keith, R. Kobayashi, J. Normand, K. Raghavachari, A. P. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J. Tomasi, M. Cossi, J. M. Millam, M. Klene, C. Adamo, R. Cammi, J. W. Ochterski, R. L. Martin, K. Morokuma, O. Farkas, J. B. Foresman, and D. J. Fox. Gaussian~16 Revision A.03, 2016. Gaussian Inc. Wallingford CT.
- [222] T. Oka. *J. Mol. Struct.*, 352 :225–233, 1995.
- [223] B. Reinhold, I. A. Finneran, and S. T. Shipman. *J. Molec. Spectrosc.*, 270 :89–97, 2011.
- [224] L. Alvarez-Valtierra, J. T. Yi, and D. W. Pratt. *J. Phys. Chem. B*, 110 :19914–19922, 2006.

- [225] L. Ferres, H. Mouhib, W. Stahl, and H. V. L. Nguyen. *Chem. Phys. Chem.*, 18(14) :1855–1859, 2017.
- [226] P. Asselin, P. Soulard, B. Madebène, M. Goubet, T. R. Huet, R. Georges, O. Pirali, and P. Roy. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 16(10) :4797–4806, 2014.
- [227] J. A. Ruiz-Santoyo, M. Rodríguez-Matus, J. L. Cabellos, J. T. Yi, D. W. Pratt, M. Schmitt, G. Merino, and L. Álvarez-Valtierra. *J. Chem. Phys.*, 143(9) :094301, 2015.

Table des figures

1.1	Représentation des niveaux d'énergie $J_{K_a K_c}$ d'une toupie asymétrique jusque $J = 3$ en fonction de κ [27].	23
1.2	Représentation des niveaux d'énergie $J_{K_a K_c}$ d'une toupie asymétrique avec un exemple pour chaque type de transition (type a, type b, type c) et pour $\Delta J = +1$ et $\Delta J = 0$	24
1.3	Spectres synthétiques d'une toupie asymétrique proche prolata obtenus à partir de trois ensembles de constantes rotationnelles pour des transitions de type a, b ou c. Tous les spectres sont calculés avec $\mu_g = 5D$ ($g = a, b, c$), à $T = 293K$ et pour $J_{max} = 200$	25
1.4	Représentation des niveaux d'énergie hyperfins pour un spin nucléaire $I = 1$. Les transitions hyperfines possibles sont données pour deux transitions $\Delta J = +1$ et $\Delta J = 0$, respectivement $2_{12} \leftarrow 1_{11}$ et $2_{21} \leftarrow 2_{11}$	28
1.5	Simulation de trois spectres rovibrationnels synthétiques d'une toupie asymétrique proche prolata à partir des constantes rotationnelles de la bande ν_5 de SOCl_2 contenant des transitions de type a, b ou c.	32
1.6	Représentation d'une barrière de potentiel V_3 et ses niveaux d'énergie de rotation internes associés. Les nombres quantiques de torsion v_t et les sous-niveaux désignés par leur symétrie sous le groupe C_3 (A ou E) sont associés à une barrière haute (rotateur oscillant) et indiqués sur l'ordonnée de droite. Les nombres quantiques m associés à une barrière basse (rotateur libre) sont indiqué sur l'ordonnée de gauche.	34
1.7	Représentation de transitions rotationnelles, la rotation interne en symétrie A ($\sigma = 0$) ou E ($\sigma = \pm 1$).	39
1.8	Différentes configurations de population dans un système à deux niveaux et leur type de transitions observables (crédit : J. Brown and A. Carrington, Rotational Spectroscopy of Diatomic Molecule, 2003)	40
1.9	Profils de raie Gaussien, Lorentzien et Voigt (crédit : M. Finch <i>et al.</i> [61]).	42

1.10	Vue d'ensemble des méthodes de chimie quantique en termes de précision et d'applicabilité [33].	49
1.11	Interface graphique de ACSP/SVIEW pour le 2-Nitrotoluène enregistré en modulation 2F dans la région 181950-182350 MHz.	51
1.12	Diagramme de Loomis-Wood pour la branche ${}^qR(1)$ de bande ν_5 de ${}^{32}S^{16}O^{35}Cl_2$	52
1.13	Interface graphique de LWWa pour la bande ν_5 du chlorure de thionyle (toupie asymétrique proche prolate) enregistrée dans l'infrarouge lointain sur la ligne AILES du synchrotron SOLEIL. Le diagramme de Loomis-Wood sélectionné correspond à une branche ${}^qP(4)$	53
1.14	Fonctionnement de SPCAT.	57
1.15	Fonctionnement de SPFIT	58
1.16	Étapes de l'AE dans le programme ga	66
1.17	Croisement à deux points entre deux chromosomes composés de huit gènes menant à deux nouveaux chromosomes. La mutation intervient aléatoirement (bleu).	68
1.18	Convergence de l'algorithme évolutionnaire pour un spectre synthétique en fonction de la taille de la population (p), de la probabilité de mutation (m) et du taux d'élitisme (e). L'ordonnée représente la fonction de coût du meilleur individu de la population (crédit : W. L. Meerts [6]).	69
2.1	Spectre électromagnétique de la gamme micro-onde au visible. Différents types de transitions moléculaires sont attendues selon les fréquences sondées.	72
2.2	Le spectromètre à impulsions micro-ondes (SIMO) du PhLAM.	74
2.3	Processus d'émission moléculaire du spectromètre à impulsions micro-ondes (SIMO) du PhLAM (crédit : M.-A. Martin-Drumel)	75
2.4	Cavité Fabry-Pérot (FP) du spectromètre à impulsions micro-ondes (SIMO) du PhLAM (crédit : laboratoire PhLAM)	76
2.5	Transitions hyperfines ($F' \leftarrow F''$) de la transition rotationnelle $7_{07} \rightarrow 6_{06}$ (espèce A) mesurée à l'aide du spectromètre à impulsions micro-ondes (SIMO) du PhLAM pour le 3-Nitrotoluène, 50 scans sont co-additionnés dans cet exemple.	77
2.6	Chaine de multiplication de fréquence du LPCA.	78
2.7	(a) spectromètre à chaine de multiplication de fréquence du LPCA en double passage, (b) grille de polarisation et (c) miroir "rooftop" orienté à 45°	79
2.8	Configurations en (a) simple et (b) double passage du spectromètre submillimétrique du LPCA.	80

2.9	Comparaison du spectre du 3-NT enregistré en modulation 2F avec le bolomètre InSb (4K) et la diode Schottky à 105 GHz. Les spectres présentés ont été enregistrés avec une constante de temps de 200 ms et traités par filtre à Transformée de Fourier pour éliminer la ligne de base (le traitement sera expliqué en section 2.3.5).	81
2.10	Mesure du spectre du 3-NT avec le bolomètre InSb pour différentes constantes de temps $\tau = 0.05$, $\tau = 0.02$ et $\tau = 0.01s$ et un temps d'attente 4τ	82
2.11	Comparaison du signal d'absorption et de ses dérivées première et seconde centrés autour de ν_0	86
2.12	Différentes raies d'absorption $J'_{K'} \leftarrow J''_{K''}$ de l'acétonitrile dans l'état fondamental ((a) : $18_7 \leftarrow 17_7$; (b) : $18_3 \leftarrow 17_3$) et l'état excité $v_8=1$ de pliage CCN ((c) : $18_5 \leftarrow 17_5$) enregistrées en modulation d'amplitude (en noir) et en modulation de fréquence 2F (en bleu). Les effets de ligne résiduels n'ont pas été traités, ce qui explique les variations enregistrées en AM.	86
2.13	Comparaison d'une raie de l'eau enregistrée en simple passage (S/B=85) et en double passage (S/B=297).	87
2.14	Effet Lamb-Dip d'une raie de l'eau enregistrée en double passage à $3 \mu\text{bar}$. La profondeur de modulation $\delta\nu$ est ajustée afin d'observer la raie d'absorption sous un élargissement Doppler ayant une pleine largeur à mi-hauteur de 600 kHz ($\delta\nu = 2\text{kHz}$) ou la raie du Lamb-Dip de pleine largeur à mi-hauteur de 47 kHz ($\delta\nu = 30\text{kHz}$).	88
2.15	Comparaison entre un enregistrement de 100 MHz (27 minutes d'acquisition) et la moyenne de 39 spectres moyennés enregistrés (18 heures d'acquisition) avec un pas de 25 kHz et une constante de temps de 100 ms.	89
2.16	Traitement de la ligne de base pour le spectre du 3-Méthoxyphénol.	91
2.17	Spectromètre d'émission millimétrique à dérive de fréquence du LPCA.	92
2.18	Schémas de montage du spectromètre à dérive de fréquence millimétrique à transformée de Fourier du LPCA.	93
2.19	(a) Spectromètre à transformée de Fourier de la ligne AILES et (b) représentation schématique de la cellule d'absorption multipassage de la ligne AILES.	94
2.20	Gain en S/N pour la source synchrotron par rapport à une source globalbar (crédit : S. GRUET).	95
3.1	Représentation de SOCl_2 dans le repère d'inertie.	100
3.2	Modes de vibration de SOCl_2	101

3.3	Spectre expérimental de SOCl_2 (noir), spectre de la bande ν_2 de SO_2 simulé à partir des constantes moléculaires de Lafferty <i>et al.</i> [162] (rouge), et spectres calculés après analyse des bandes ν_2 et ν_5 des isotopologues [32, 16, 35, 35] (bleu) et [32, 16, 35, 37] (rose).	103
3.4	Spectre synthétique (a) avant et (b) après préparation pour l'optimisation globale via les AEs.	105
3.5	Évolution de la fonction de coût du meilleur individu de chaque génération pour l'optimisation sur un spectre synthétique.	105
3.6	(a) Spectre synthétique (noir) et spectres calculés à partir de l'optimisation par AEs pour les deux isotopologues les plus abondants [32, 16, 35, 35] (bleu) et [32, 16, 35, 37] (rose). (b) Partie de la branche P . (c) Partie de la branche Q pour [32, 16, 35, 37]. (d) Partie de la branche Q pour [32, 16, 35, 35]. (e) Partie de la branche R	106
3.7	Spectre de la bande ν_5 (a) avant et (b) après préparation pour l'optimisation globale via les AEs.	107
3.8	Spectre de la bande ν_2 (a) avant et (b) après préparation pour l'optimisation globale via les AEs.	107
3.9	Évolution de la fonction de coût du meilleur individu de chaque génération pour la bande ν_5 de [32, 16, 35, 35].	109
3.10	Evolution de la fonction de coût du meilleur individu de chaque génération pour la bande ν_2 de [32, 16, 35, 35].	110
3.11	Diagrammes de Loomis-Wood des branches ${}^qP(3)$ (triangles magenta à gauche) et ${}^qR(3)$ (triangles oranges à droite) pour chaque étape de l'analyse de l'isotopologue principal [32, 16, 35, 35] de la bande ν_5 . Les triangles noirs correspondent aux transitions attribuées de [32, 16, 35, 35] et les triangles vides aux transitions non attribuées. (a) et (b) sont créés à partir des constantes rotationnelles estimées par les équations 3.1 et 3.2, (c) et (d) donnent les diagrammes après l'étape d'optimisation globale des AEs et (e) et (f) sont créés à partir des constantes moléculaires expérimentales après l'analyse raie-par-raie finale.	112
3.12	Evolution de la fonction de coût du meilleur individu de chaque génération pour la bande ν_5 de [32, 16, 35, 37].	114
3.13	Evolution de la fonction de coût du meilleur individu de chaque génération pour la bande ν_2 de [32, 16, 35, 37].	114

- 3.14 (a) Spectre expérimental (noir) et spectres calculés de la bande ν_5 pour les deux isotopologues les plus abondants [32, 16, 35, 35] (bleu) et [32, 16, 35, 37] (rose). Le spectre rouge est le spectre global simulé pour les deux isotopologues. (b) Partie de la branche P . (c) Partie de la branche Q pour [32, 16, 35, 37]. (d) Partie de la branche Q pour [32, 16, 35, 35]. (e) Partie de la branche R 117
- 3.15 (a) Spectre expérimental (noir) et spectres calculés de la bande ν_2 band pour les deux isotopologues les plus abondants [32, 16, 35, 35] (bleu) et [32, 16, 35, 37] (rose). Le spectre rouge est le spectre global simulé pour les deux isotopologues. (b) Partie de la branche P . (c) Partie de la branche Q pour [32, 16, 35, 37]. (d) Partie de la branche Q pour [32, 16, 35, 35]. (e) Partie de la branche R 118
- 3.16 Évolution de la précision relative $\delta = |\text{expérience} - \text{calcul}| / \text{expérience}$ à chaque étape de l'analyse : calculé au niveau MP2/6-311++G(3df,3pd), estimé à partir de l'équation 3.1, affinée à partir l'équation 3.3, observé (à partir de l'intensité maximale de la branche Q dans le spectre expérimental) et obtenu par les EAs. δ est calculé pour chaque paramètre optimisé EA : constantes de rotation A , B , C et centres de bandes rovibrationnelles : (a) pour les constantes de rotation de [32, 16, 35, 35] de $\nu_5 = 1$, (b) pour les constantes de rotation de [32, 16, 35, 35] de $\nu_2 = 1$, (c) pour les constantes de rotation de [32, 16, 35, 37] de $\nu_5 = 1$, (d) pour les constantes de rotation de [32, 16, 35, 37] de $\nu_2 = 1$, (e) pour le centre de la bande des deux isotopologues de $\nu_5 = 1$ et (f) pour le centre de la bande des deux isotopologues de $\nu_2 = 1$ 120
- 3.17 (a) Spectre submillimétrique expérimental du chlorure de thionyle (en noir) et toutes les contributions individuelles expérimentales considérées dans l'analyse. (b) Comparaison entre le spectre expérimental (en noir), la simulation théorique globale (en rouge) et les contributions individuelles (la couleur de chaque contribution est en accord avec la figure (a)). Les triangles sur le spectre bâton 273.5-274.5 GHz permettent d'identifier les nouvelles attributions de cette étude. 124

3.18	Énergies rovibrationnelles calculées pour l'état fondamental et les bandes de rovibration ν_2 , ν_3 , ν_4 , ν_5 et ν_6 de [32, 16, 35, 35] pour $J_{max} = 80$. Pour plus de visibilité, nous n'avons pas tracé les énergies rovibrationnelles E mais les énergies réduites $E - B^{(v)}J(J + 1)$. Chaque bande est calculée à partir de sa propre constante de rotation effective $B^{(v)}$. Les niveaux rouges correspondent aux niveaux d'énergie impliqués dans des transitions attribuées. Les courbes représentent l'énergie des axes de rotation stationnaires classiques (équilibres relatifs). Les deux niveaux verts représentent les niveaux d'énergie des bandes de combinaison $\nu_4 + \nu_6$ (474.017 cm^{-1}) et harmonique $2 \nu_4$ (387.023 cm^{-1}) calculées au niveau anharmonique MP2/6-311++G(3df,3pd) [152].	127
4.1	Géométrie à l'équilibre du 3-nitrotoluène dans le système d'axes principaux optimisée au niveau MP2/cc-pVQZ.	135
4.2	Géométrie à l'équilibre du 2-nitrotoluène dans le système d'axes principaux optimisée au niveau MP2/cc-pVQZ : (a) dans le plan (a,b) et (b) incliné pour observer la torsion du NO_2	136
4.3	Géométrie à l'équilibre du 4-nitrotoluène dans le système d'axes principaux optimisée au niveau MP2/cc-pVQZ.	136
4.4	Spectre expérimental de transitions micro-ondes du 3-NT de type ^aR ($7_{07} \rightarrow 6_{06}$, 50 scans co-additionnés pour les espèces A et E) et de type ^bR ($8_{08} \rightarrow 7_{17}$, 300 et 1000 scans co-additionnés pour les espèces A et E, respectivement). Les structures hyperfines du couplage nucléaire quadrupolaire de ^{14}N sont clairement observées ($F' \leftarrow F''$).	138
4.5	Différentes transitions micro-ondes du 2-NT de type ^aR et de type ^bR . Des structures complexes sont observées mélangeant la structure hyperfine de couplage nucléaire quadrupolaire de ^{14}N et les dédoublements A-E.	139
4.6	Différentes transitions micro-ondes du 4-NT de type ^aR , la structure hyperfine de couplage nucléaire quadrupolaire de ^{14}N présente trois composantes dont deux non résolues et les dédoublements A-E sont bien résolus.	140
4.7	Traitement de la ligne de base pour le spectre du 3-nitrotoluène.	142
4.8	Traitement de la ligne de base pour le spectre du 2-nitrotoluène et comparaison avec le spectre simulé des espèces A.	144
4.9	Traitement de la ligne de base pour le spectre du 4-nitrotoluène et comparaison avec le spectre simulé des espèces A.	144
4.10	Représentations du potentiel de rotation interne du groupe méthyle des 3-NT, 2-NT et 4-NT à partir des hauteurs de barrière V_3 et V_6 calculées <i>ab initio</i>	147

- 4.11 Le spectre expérimental millimétrique du 3-NT est comparé au spectre calculé après ajustement des données micro-ondes et millimétriques. (a) est le spectre expérimental 70 – 110 GHz (noir) et (b) est le spectre global simulé pour les états $v_t = 0$ et $v_t = 1$ (orange). Quelques motifs de raies caractéristiques du 3-NT sont présentés dans (c), (d) et (e) : les contributions individuelles des espèces A et E de $v_t = 0$ (rouge et bleu, respectivement) et $v_t = 1$ (rose et vert, respectivement). Toutes les artefacts intenses saturés de (a) sont dues aux effets décrits dans la section 4.2.2 (voir section 4.2.2). 153
- 4.12 Potentiel de rotation interne triplement dégénéré du groupe méthyle calculé à partir des valeurs expérimentales de V_3 et V_6 selon l'angle de torsion (axe des abscisses inférieur). Les niveaux d'énergie des espèces A et E dans l'état fondamental sont présentés en noir et en rouge, respectivement, jusqu'à $J=10$ (axe des abscisses supérieur). 160
- 4.13 Variation des écarts entre les transitions d'espèces A et E rotationnelles dans l'état fondamental jusqu'à $J = 60$ et $K_a = 13$. Différentes séries sont présentées pour les branches R : (a) transitions de type a pour $K'_c = J' - K'_a + 1$ et $K''_c = J'' - K''_a + 1$, (b) transitions de type a pour $K'_c = J' - K'_a$ et $K''_c = J'' - K''_a$, (c) transitions de type b pour $K'_c = J' - K'_a + 1$ et $K''_c = J'' - K''_a$, et (d) transitions de type b pour $K'_c = J' - K'_a$ et $K''_c = J'' - K''_a + 1$. Les écarts entre espèces A et E minimaux et maximaux montrent une certaine linéarité indiquée par les droites rouges et noires, respectivement. 161
- 4.14 Variation des écarts A-E pour les transitions de type a pour $K'_c = J' - K'_a + 1$ et $K''_c = J'' - K''_a + 1$ dans l'état fondamental jusqu'à $K_a = 11$ en fonction de K_a/J 162
- 4.15 Variation des écarts entre les transitions d'espèces A et E rotationnelles dans l'état fondamental jusqu'à $J = 79$ et $K_a = 21$. Les séries sont présentées pour les branches R de transitions de type a pour $K'_c = J' - K'_a + 1$ et $K''_c = J'' - K''_a + 1$. 164
- 4.16 Niveaux d'énergie réduite $E - B^{(v)}J(J + 1)$ en fonction de $J(J + 1)$ calculés à partir de l'ajustement global des données avec BELGI-C_s-hyperfine. Les niveaux d'énergie en noir appartiennent sont impliqués dans les transitions expérimentales attribuées 165

- 4.17 Énergies de rotation calculées dans l'état $v_t = 0$ (points liés en rouge) et l'état $v_t = 1$ (points liés en bleu) jusqu'à $J = 63$. Les énergies réduites $E - B^{(v)}J(J + 1)$ ont été utilisées à la place de E pour plus de visibilité. Les points noirs appartiennent aux niveaux d'énergie réduits impliqués dans les transitions expérimentales attribuées et les labels correspondent aux valeurs de K_a . Trois parties sont présentées : (a) analyse micro-onde de $v_t = 0$, (b) analyse millimétrique de $v_t = 0$ et (c) analyse millimétrique de $v_t = 0$ et $v_t = 1$. Les espèces A (graphiques du bas) et E (graphiques du haut) sont présentées séparément. 166
- 4.18 Portions du spectre expérimental millimétrique du 2-NT et du 4-NT comparées au spectre calculé après ajustement préliminaire des espèces A de l'état fondamental. (a) est le spectre expérimental 165 – 215 GHz (noir) et (b) est le spectre global simulé pour les espèces A de l'état fondamental ($v_t = 0$) (orange). Quelques motifs de raies caractéristiques sont présentés dans (c), (d) et (e) avec le même code couleur que (a) et (b). Les spectres bâtons utilisés pour simuler le spectre calculé à partir de l'ajustement des espèces A dans l'état fondamental est également représenté (en noir). 170
- 4.19 Comparaison des spectres du 2-NT, 3-NT et 4-NT dans la gamme 175.5-176 GHz. 174
- 5.1 Profils de concentration du 2-méthoxyphénol en présence du radical OH (conditions initiales : $4715 \mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ guaiacol et $2.4 \times 10^6 \text{ OH}\cdot\text{cm}^{-3}$) et distribution en nombre (a) et en volume (b) des AOS produits au cours du temps (mesures SMPS). Les points gris représentent les concentrations de 2-MP mesurées par GC-FID et les courbes grises correspondent à l'ajustement exponentiel sur les concentrations expérimentales de 2-MP. (source : Lauraguais *et al.* [19]). . . 178
- 5.2 (a) le spectre d'absorption du 3-MP mesuré en modulation de fréquence 2F à l'aide du spectromètre à chaîne de multiplication de fréquence du LPCA et (b) le spectre d'émission stimulée du 3-MP mesuré avec le spectromètre à dérive de fréquence du LPCA. 181
- 5.3 (a) Surface d'énergie potentielle décrivant le paysage conformationnel du 3-MP calculée avec un pas de 5° au niveau B3LYP/6-311++G(d,p). Les minima locaux et points selles sont marqués par des points rouges et des croix vertes, respectivement. (b) géométries des quatre conformères stables de 3-MP optimisés au niveau MP2/cc-pVQZ représentées dans le plan d'inertie ab avec le vecteur de moment dipolaire permanent (flèche bleue). 183

5.4	Le spectre expérimental millimétrique du 3-MP (en noir) est comparé à deux simulations de spectres : le premier (en bleu) inclut l'état fondamental de $C1(180; 180)$, $C2(0; 0)$ et $C3(180; 0)$ observés dans d'autres gammes de fréquences dans des études précédentes ; le second (en rouge) inclut les contributions précédentes et l'état fondamental de $C4(0; 180)$ et les états excités de pliage de $C2(0; 0)$ et $C3(180; 0)$. Une section de 15 GHz (a) est agrandie dans une fenêtre de 1.5 GHz (b), elle-même agrandie dans une section de 0.3 GHz (c), montrant ainsi la densité de raies d'absorption observées.	185
5.5	(a) Le spectre millimétrique (70 - 110 GHz) en noir est comparé avec les spectres ajustés de chaque conformère dans l'état fondamental et dans les états excités de vibration ($v_b = 1, 2$). (b) et (c) sont des agrandissements de 300 MHz dans les régions 94350 et 103150 MHz, respectivement, chaque contribution est identifié avec le même code couleur que (a).	189
5.6	Évolution de la précision relative $\delta = \text{expérience} - \text{calcul} / \text{expérience}$ des constantes rotationnelles pour l'état fondamental des quatre conformères en (a) et pour les états excités de $C2(0; 0)$ et $C3(180; 0)$ en (b). Les constantes de rotation A, B et C correspondent respectivement aux triangles, aux carrés et aux cercles. Dans la figure (a), les calculs de niveau théorique CC2/cc-PVTZ se réfèrent aux travaux de [217], les calculs B3LYP/CBS ont été effectués dans cette étude, M. Wilke <i>et al.</i> sont des valeurs expérimentales de de la référence [217], et Caminati <i>et al.</i> sont les valeurs expérimentales de la référence [219]. Dans la figure (b) les calculs anharmoniques B3LYP/cc-PVTZ ont été effectués dans cette étude, et les valeurs corrigées sont déterminées en appliquant aux constantes expérimentales de l'état fondamental le rapport $\frac{[A,B,C]_{ab}^{v_b} \text{ initio}(Ci)}{[A,B,C]_{ab}^0 \text{ initio}(Ci)}$ obtenu par les calculs anharmoniques B3LYP/cc-PVTZ.	190
A.1	Vue schématique du montage jet-AILES (crédit : P. Asselin <i>et al.</i> [226]) . . .	228
A.2	(a) fente du jet moléculaire et (b) montage jet-AILES.	228
A.3	Mesures du spectre IRM du 3-MP en variant le débit du gaz porteur (Argon) en slm (litre standard par minute).	229
A.4	Comparaison du spectre mesuré à température ambiante dans l'étude IRL/IRM [215] (en noir) avec les spectres mesurés en jet-moléculaire avec l'Hélium (en rouge) ou l'Argon (en bleu) comme gaz porteur. Les figures (a), (b) et (c) sont les spectres mesurés dans l'IRL (200-600 cm^{-1}) pour les 2-MP, 3-MP et 4-MP, respectivement. Les figures (e), (f) et (g) sont les spectres mesurés dans l'IRM (900-1700 cm^{-1}) pour les 2-MP, 3-MP et 4-MP, respectivement.	230

A.5	Comparaison entre le spectre IRM du 3-MP mesuré en jet moléculaire et les calculs B3LYP/6311++g(3df,2pd) anharmoniques de chaque isomère : (180;0) en rouge, (180;180) en vert, (0;180) en bleu et (0;0) en rose. Les fréquences utilisées sont calculées au niveau anharmonique et les intensités au niveau harmonique	231
B.1	Spectres millimétriques des méthoxyphénols (3-MP, 2-MP et 4-MP) mesurés dans la gamme 201-202 GHz avec le spectromètre à dérive de fréquence du LPCA.	234
B.2	(a) géométrie du 2-MP stabilisée par la liaison hydrogène optimisée au niveau B3LYP/cc-pVTZ et représentée dans le plan d'inertie ab avec le vecteur de moment dipolaire permanent (flèche bleue). (b) Surface d'énergie potentielle décrivant le paysage conformationnel du 2-MP calculée avec un pas de 5° au niveau B3LYP/6-311++G(d,p).	235
B.3	(a) géométries des conformères stables (-cis et -trans) du 4-MP optimisées au niveau B3LYP/cc-pVTZ et représentées dans le plan d'inertie ab avec le vecteur de moment dipolaire permanent (flèche bleue). (b) Surface d'énergie potentielle décrivant le paysage conformationnel du 4-MP calculée avec un pas de 5° au niveau B3LYP/6-311++G(d,p).	235
B.4	(a) : Spectre millimétrique mesuré dans la gamme 260–275 GHz avec le spectromètre à multiplication de fréquence (en noir) comparé aux spectres calculés dans l'état fondamental de vibration (en bleu) et les états de vibration excités $v_{45} = 1$ (en rouge), $v_{45} = 2$ (en vert) et $v_{44} = 1$ (en orange). (b) : agrandissement de (a) dans la gamme 271850–272125 MHz avec le même code couleurs, les transitions attribuées sont indiquées par des flèches (crédit : A. Jabri <i>et al.</i> prochainement soumis dans <i>Phys. Chem. Phys. Chem.</i>).	236

Liste des tableaux

1.1	Différentes représentations pour associant les axes a, b et c aux axes x, y et z. Les indices r et l correspondent au trièdre dextrogyre ou lévogyre, respectivement.	20
1.2	Règles de sélection de la toupie asymétrique	24
1.3	Règles de sélection hyperfines et leur dépendance en intensité (référence [20]).	28
1.4	Description des profils de raie naturel, Gaussien, Lorentzien et Voigt[56, 28].	43
1.5	Caractérisation de certains ensembles de bases standards en termes de nombre et de types de fonctions de bases impliquées pour l'atome d'Hydrogène, la deuxième et la troisième ligne du tableau périodique.	50
1.6	Ensemble des valeurs de $dK_{c,up}$, $dK_{c,down}$, ΔK_a et ΔJ possibles et le type de transition a, b ou c associé dans le cas d'une toupie asymétrique proche prolate. $dK_c = 0$ correspond à $K_c = J - K_a$ et $dK_c = 1$ à $K_c = J - K_a + 1$. Chaque association peut-être utilisée pour générer un diagramme de Loomis-Wood pour une valeur de K_a donnée. Certaines associations mènent à la règle de sélection interdite ΔK_a et ΔK_c pairs ("interdite").	54
1.7	Ensemble des valeurs de $dK_{a,up}$, $dK_{a,down}$, ΔK_c et ΔJ possibles et le type de transition a, b ou c associé dans le cas d'une toupie asymétrique proche oblate. $dK_a = 0$ correspond à $K_a = J - K_c$ et $dK_a = 1$ à $K_a = J - K_c + 1$. Chaque association peut-être utilisée pour générer un diagramme de Loomis-Wood pour une valeur de K_c donnée. Certaines associations mènent à la règle de sélection interdite ΔK_a et ΔK_c pairs ("interdite").	55

1.8	Paramètres moléculaires implémentés dans BELGI-C _s -hyperfine pour traiter le couplage de torsion-rotation dans le système RAM d'une toupie asymétrique appartenant au groupe de permutation inversion G ₆ isomophe à C _{3v} [46]. La liste non exhaustive des paramètres est donnée jusqu'à l'ordre 4 : les paramètres en noir sont liés à la rotation de la molécule, ceux en rouge sont liés à l'interaction nucléaire quadrupolaire, ceux en bleu à l'étude de la rotation interne dans l'état fondamental et ceux en magenta sont à considérer dans l'étude de la rotation interne dans les états excités de torsion ($v_t \geq 1$).	60
1.9	Comparaison des programmes traitant de la rotation interne en terme d'applicabilité.	62
3.1	Abondances naturelles relative et absolues des isotopologues de [S, O, Cl, Cl].	100
3.2	Fréquences et intensités des modes fondamentaux de vibration de l'isotopologue principal [32, 16, 35, 35] calculés avec Gaussian 09 [89] au niveau harmonique et anharmonique MP2/6-311++G(3df,3pd) [152] et fréquences expérimentales issue de l'analyse des spectres. La distribution de Boltzmann $(N_i/N)_{anharmon}$ est calculée à 293K à partir des énergies anharmoniques $E_{anharmon}$. L'incertitude entre parenthèses correspond aux dernières décimales.	101
3.3	Paramètres libérés et leur intervalle de liberté pour l'étude du spectre synthétique.	104
3.4	Paramètres libérés et leur intervalle de liberté pour l'isotopologue [32, 16, 35, 35] de la bande ν_5	109
3.5	Paramètres libérés et leur intervalle de liberté pour l'isotopologue [32, 16, 35, 35] de la bande ν_2	110
3.6	Paramètres libérés et leur intervalle de liberté pour l'isotopologue [32, 16, 35, 37] de la bande ν_5	113
3.7	Paramètres libérés et leur intervalle de liberté pour l'isotopologue [32, 16, 35, 37] de la bande ν_2	114
3.8	Paramètres ajustés dans l'analyse IRL de la bande ν_5 pour les deux isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37]. Les incertitudes 1σ [163] sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le nombre N d'attributions expérimentales, les valeurs maximales de J''_{max} et de $K''_{a\ max}$ et les déviations standard IR sont indiquées. Tous les paramètres sont donnés en MHz à l'exception des centres de bande et des déviations standards.	115

- 3.9 Paramètres ajustés dans l'analyse IRL de la bande ν_2 pour les deux isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37]. Les incertitudes 1σ [163] sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le nombre N d'attributions expérimentales, les valeurs maximales de J''_{\max} et de $K''_{a\max}$ et les déviations standard IR sont indiquées. Tous les paramètres sont donnés en MHz à l'exception des centres de bande et des déviations standards. 116
- 3.10 Constantes d'interaction rotation-vibration *ab initio* α_i calculées au niveau CCSD(T)/cc-pV(Q+d)Z à l'aide du programme C_{FOUR}. Les constantes de rotation associées à chaque état $v_i = 1$ excité des isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37] ont été calculées en MHz en soustrayant les valeurs α des valeurs GS expérimentales : $A_i = A_0^{exp.} - \alpha_i$ 121
- 3.11 Modes de vibration harmonique et anharmonique des isotopologues [32, 16, 35, 35] et [32, 16, 35, 37] calculés avec le programme C_{FOUR} au niveau CCSD(T)/cc-pV(T+d)Z. 122
- 3.12 Résumé des paramètres ajustés à partir des données rotationnelles et rovibrationnelles de [32, 16, 35, 35]. Les incertitudes 1σ [163] sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le nombre N d'attributions expérimentales, les valeurs maximales de J''_{\max} et de $K''_{a\max}$ et les déviations standard IR sont indiquées. Tous les paramètres sont donnés en MHz à l'exception des centres de bande et des déviations standards. 123
- 3.13 Origine des données utilisées dans l'ajustement global. 125
- 3.14 Résumé des paramètres de l'ajustement global à partir de l'ensemble des données rotationnelles et rovibrationnelles de la table 3.13, les valeurs entre crochets ont été reliées aux valeurs de l'état fondamental dans l'ajustement. Les incertitudes 1σ [163] sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le nombre N d'attributions expérimentales, les valeurs maximales de J''_{\max} et de $K''_{a\max}$ et les différentes déviations standard sont indiquées. Tous les paramètres (sauf indication contraire) sont donnés en MHz. Pour ν_4 , le centre de bande de l'isotopologue [32, 16, 35, 35] a été fixé sur la valeur anharmonique MP2/6-311++G(3df,3pd). Enfin, il n'a pas été possible d'identifier l'isotopologue [32, 16, 35, 37] dans le spectre submillimétrique, c'est pourquoi aucun paramètre n'est indiqué. 126
- 4.1 Pression de vapeur en Pa des nitrotoluènes (NT) [178], dinitrotoluènes (DNT) [168] et trinitrotoluène (TNT) [168] à différentes températures (de 10 à 30 °C). 133

- 4.2 Calculs de chimie quantique du 3-NT au niveau de théorie MP2 et B98 dans l'ensemble de bases cc-pVXZ (X=D,T,Q) pour les constantes rotationnelles, les constantes de distorsion centrifuge, les constantes de couplage nucléaire quadrupolaire, les composantes de moment dipolaire électrique et les constantes de couplage avec la rotation interne. Les constantes rotationnelles et la hauteur de barrière de potentiel V_3 ont été calculées à la limite CBS, les constantes rotationnelles hybrides corrigées par les équations de Herschbach sont également indiquées. 148
- 4.3 Calculs de chimie quantique pour le 2-NT au niveau de théorie MP2 et B98 dans l'ensemble de bases cc-pVXZ (X=D,T,Q) pour les constantes rotationnelles, les constantes de distorsion centrifuge, les constantes de couplage nucléaire quadrupolaire, les composantes de moment dipolaire électrique et les constantes de couplage avec la rotation interne. Les constantes rotationnelles et la hauteur de barrière de potentiel V_3 ont été calculées à la limite CBS, les constantes rotationnelles hybrides corrigées par les équations de Herschbach sont également indiquées. 149
- 4.4 Calculs de chimie quantique pour le 4-NT au niveau de théorie MP2 et B98 dans l'ensemble de bases cc-pVXZ (X=D,T,Q) pour les constantes rotationnelles, les constantes de distorsion centrifuge, les constantes de couplage nucléaire quadrupolaire, les composantes de moment dipolaire électrique et les constantes de couplage avec la rotation interne. Les constantes rotationnelles et la hauteur de barrière de potentiel V_3 ont été calculées à la limite CBS, les constantes rotationnelles hybrides corrigées par les équations de Herschbach sont également indiquées. 150
- 4.5 Paramètres de rotation-torsion du 3-nitrotoluène ajustés le système d'axes RAM pour les espèces A et E avec le code BELGI-C_s-hyperfine avec les données micro-onde de $v_t = 0$, avec les données micro-onde et millimétriques de $v_t = 0$ et pour l'ajustement global des données micro-onde et millimétriques des états $v_t = 0, 1$. La déviation standard adimensionnée (σ_W) et le nombre de transitions ajustées N sont également indiqués. 154
- 4.6 Paramètres de rotation et de torsion-rotation du 3-NT ajustés avec le code BELGI-C_s-hyperfine, convertis dans le système PAM et comparés aux valeurs calculées (voir section 4.2.3). Toutes les constantes se réfèrent au système PAM et la précision sur les paramètres moléculaires est donnée entre parenthèses sur les dernières décimales, la déviation standard adimensionnée est également indiquée. 156

- 4.7 Nombre N de transitions différentes ajustées, valeurs maximales du nombre quantique J''_{max} , de $K''_{a, max}$ et déviation standard (σ) de chaque état ($v_t = 0, 1$) et chaque symétrie (espèces A et E). 156
- 4.8 Nombre d'ondes des états de torsion excités inférieurs à 100 cm^{-1} prédits par BELGI-C_s-hyperfines ($J = K = 0$) et calculs harmonique au niveau MP2/cc-pVQZ et B98/cc-pVQZ. Partie supérieure : positions des états de torsion excités par le méthyle $v_t = 1$ et $v_t = 2$. Partie inférieure : positions des états de torsion excités de torsion du groupe nitro $v_{t_{\text{NO}_2}} = 1$ et $v_{t_{\text{NO}_2}} = 2$ 157
- 4.9 Constantes de couplage nucléaire quadrupolaire ajustées et calculées $\chi_{i,j}$ dans le système d'axes principaux ($i, j = a, b, c$), leur déviation standard sur les dernières décimales, constantes $\chi_{i,j}$ diagonalisées dans le système d'axes principaux du noyau ^{14}N ($i, j = x, y, z$), paramètre d'asymétrie η et angle α entre les axes a et z calculés pour chaque ensemble de paramètres avec leur incertitude sur les dernières décimales calculée par la méthode de propagation des erreurs. 159
- 4.10 Paramètres de rotation pure de l'analyse préliminaire du spectre millimétrique du 2-NT ajustés avec SPFIT et comparés aux valeurs calculées avec les méthodes de chimie quantique (voir section 4.2.3). Toutes les constantes se réfèrent au système PAM et la déviation standard sur les paramètres moléculaires est donnée entre parenthèses sur les dernières décimales. 168
- 4.11 Paramètres de rotation pure de l'analyse préliminaire du spectre millimétrique du 4-NT ajustés avec SPFIT et comparés aux valeurs calculées avec les méthodes de chimie quantique (voir section 4.2.3). Toutes les constantes se réfèrent au système PAM et la déviation standard sur les paramètres moléculaires est donnée entre parenthèses sur les dernières décimales. 169
- 4.12 Constantes de barrière de rotation interne de dérivés du toluène monosubstitués dans leur forme ortho, méta et para. Le défaut d'inertie est obtenu par $\Delta I'' = I_c - I_a - I_b$ 172
- 5.1 Paramètres calculés et expérimentaux de l'état fondamental pour les quatre conformères du 3-MP : énergies relatives ΔE , populations calculées et semi-expérimentales à T=298.15K, défauts d'inertie $\Delta I'' = I_c - I_a - I_b$ et coordonnées polaires ($\mu; \theta$) du vecteur moment dipolaire permanent. 184

- 5.2 Résumé des paramètres ajustés de l'état fondamental, les incertitudes 1σ sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Dans la deuxième partie de la table sont indiqués : le nombre d'attributions N de l'ajustement, les valeurs maximales de J''_{\max} et $K''_{a\max}$, les déviations standards et les déviations standard adimensionnées. 186
- 5.3 Première partie : résumé des paramètres ajustés dans les états excités de pliage $v_b = 1$ et $v_b = 2$ comparés aux calculs B3LYP/cc-pVTZ anharmoniques. Les incertitudes 1σ sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le défaut d'inertie est obtenu par $\Delta I'' = I_c - I_a - I_b$. Deuxième partie : le nombre N d'attributions dans l'ajustement, les valeurs maximales du nombre quantique J''_{\max} et de $K''_{a\max}$, et les déviations standard avec et sans unité. 187
- B.1 Résumé des paramètres ajustés dans l'état fondamental des 2-MP et 4-MP comparés aux résultats de Ruiz-Santoyo *et al.* [227]. Les incertitudes 1σ sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le défaut d'inertie $\Delta I'' = I_c - I_a - I_b$, le nombre N d'attributions de type a et de type b dans l'ajustement, les valeurs de J''_{\max} et K''_{\max} , et les déviations standard avec et sans unité (voir équations 1.84 et 1.85) sont indiqués. 237
- B.2 Première partie : résumé des paramètres issus de l'analyse des états de vibration excités du 2-MP de torsion du CH_3 ($v_{44} = 1$) et de pliage hors plan du OCH_3 ($v_{45} = 1$ et $v_{45} = 2$) comparés aux valeurs calculées au niveau de théorie B3LYP/cc-pVTZ. Les incertitudes 1σ sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Deuxième partie : le défaut d'inertie $\Delta I'' = I_c - I_a - I_b$, le nombre N d'attributions de type a et de type b dans l'ajustement, les valeurs maximales du nombre quantique J''_{\max} et de $K''_{a\max}$, et les déviations standard avec et sans unité (voir équations 1.84 et 1.85) sont indiqués. 237

Annexes

Annexe A

Spectroscopie rovibrationnelle des méthoxyphénols à basse température avec le dispositif Jet-AILES : résultats préliminaires

Montage Jet-AILES

Au cours de ma thèse, j'ai eu l'opportunité de participer pendant deux semaines à un projet jet-AILES au synchrotron SOLEIL où il s'agissait d'étudier la possibilité de résoudre la structure rovibrationnelle des MP à basse température. Le montage jet-AILES a été développé en collaboration entre l'institut de Physique de Rennes, les laboratoires PhLAM, MONARIS et la ligne AILES du synchrotron SOLEIL. Le dispositif s'adapte au spectromètre de la ligne AILES (voir figure A.1) et s'utilise à la place de la cellule multipassage [226]. L'ensemble est composé d'un système de pompage permettant un grand débit connecté à une chambre d'expansion (figure A.2 (b)), d'une fente de 6 cm chauffée par laquelle le jet moléculaire s'écoule (figure A.2 (a)) et de plusieurs débitmètres qui permettent le contrôle du flux de gaz porteur et de produit. On note qu'à la différence des autres spectromètres utilisés, cette méthode entraîne une grande consommation de produit (plusieurs litres par jour).




FIGURE A.1 – Vue schématique du montage jet-AILES (crédit : P. Asselin *et al.* [226])




FIGURE A.2 – (a) fente du jet moléculaire et (b) montage jet-AILES.

Spectres IRL et IRM

Les spectres IRL et IRM des 2-MP, 3-MP et 4-MP ont été enregistrés en utilisant l'Argon et l'Hélium comme gaz porteur. Comme le montre la figure A.4, le refroidissement est sensiblement équivalent avec l'Hélium et l'Argon. La pression du gaz porteur a également été ajustée sur le 3-MP en variant la pression de 5 à 30 slm (litre standard par minute, unité de débit volumétrique d'un gaz corrigée dans les conditions standard de température et de pression). L'augmentation de la pression en Argon réduit la résolution des branches Q en raison de la formation de complexes d'Argon (voir figure A.3). Bien qu'il n'ait pas été possible de résoudre les structures rovibrationnelles, les branches Q des trois isomères ont pu être résolues (voir figure A.4). Néanmoins, les modes de vibrations de chaque isomère du méthoxyphénol pourront être attribués afin de compléter l'étude IRL/IRM à température ambiante moins résolue [215] et distinguer les conformères.




FIGURE A.3 – Mesures du spectre IRM du 3-MP en variant le débit du gaz porteur (Argon) en slm (litre standard par minute).




FIGURE A.4 – Comparaison du spectre mesuré à température ambiante dans l'étude IRL/IRM [215] (en noir) avec les spectres mesurés en jet-moléculaire avec l'Hélium (en rouge) ou l'Argon (en bleu) comme gaz porteur. Les figures (a), (b) et (c) sont les spectres mesurés dans l'IRL ($200\text{-}600\text{ cm}^{-1}$) pour les 2-MP, 3-MP et 4-MP, respectivement. Les figures (e), (f) et (g) sont les spectres mesurés dans l'IRM ($900\text{-}1700\text{ cm}^{-1}$) pour les 2-MP, 3-MP et 4-MP, respectivement.

Les calculs de chimie quantique ont été menés au niveau anharmoniques B3LYP/6311++g(3df,2pd) et le travail d'analyse est en cours. Une comparaison entre le spectre expérimental et les modes de vibrations calculées des conformères du 3-MP est donné en figure A.5.




FIGURE A.5 – Comparaison entre le spectre IRM du 3-MP mesuré en jet moléculaire et les calculs B3LYP/6311++g(3df,2pd) anharmoniques de chaque isomère : (180;0) en rouge, (180;180) en vert, (0;180) en bleu et (0;0) en rose. Les fréquences utilisées sont calculées au niveau anharmonique et les intensités au niveau harmonique

Annexe B

Spectroscopie rotationnelle du guaiacol (2-MP) et du méquinol (4-MP) : résultats préliminaires

Mesures expérimentales dans la région millimétrique

Tout comme pour le 3-MP, les isomères 2-MP et 4-MP conditionnés par AlphaAesar (Thermo Fischer Scientific) avec une pureté supérieure à 98% ont été purifiés de traces identifiées de méthanol par un pompage continu sur l'échantillon. Les spectres de rotation pure ont été mesurés à température ambiante au LPCA en utilisant le spectromètre d'absorption à chaîne de multiplication de fréquence en modulation de fréquence (70-330 GHz) et le spectromètre d'émission millimétrique à dérive de fréquence CP-FTmm (190-210 GHz).

Pour les mesures avec le spectromètre à chaîne de multiplication, la détection bolométrique (InSB) a été utilisée et un flux de $9\mu\text{bar}$ a été maintenu à travers la cellule en double passage. Des constantes de temps de 50 ms à 200 ms ont été utilisées avec un pas en fréquence de 100 kHz et une fréquence de modulation de 13 kHz. Comme pour les autres espèces étudiées dans cette thèse, de fortes variations de la ligne de base ont pu être éliminées à l'aide d'un filtre FFT passe bas. La précision expérimentale a été estimée à 70 kHz à partir de l'équation 2.37. Pour les mesures avec le spectromètre à dérive de fréquence, les conditions expérimentales sont les mêmes que celles décrites pour le 3-MP dans la section 5.2. Une comparaison des spectres obtenus pour les trois isomères avec le spectromètre à dérive de fréquence millimétrique est présentée en figure B.1.




FIGURE B.1 – Spectres millimétriques des méthoxyphénols (3-MP, 2-MP et 4-MP) mesurés dans la gamme 201-202 GHz avec le spectromètre à dérive de fréquence du LPCA.

Calculs de chimie quantique

Les structures à l'équilibre des conformères stables des 2-MP et 4-MP calculées au niveau de théorie B3LYP/cc-pVTZ sont présentées dans les figures B.2 et B.3. Les surfaces d'énergie potentielle (PES) sont également représentées dans l'état fondamental en fonction des angles diédraux des groupes $-OH$ et $-OCH_3$ par rapport au groupe benzène. Celles-ci ont été construites de la même façon que pour le 3-MP, avec un pas de 5° au niveau de théorie B3LYP/6-311++G(d,p).

Deux conformères stables ont été identifiés (-cis et -trans) pour le 4-MP (figure B.3). Néanmoins le moment dipolaire permanent très faible du conformère -trans ($\mu \simeq 0.5D$) est défavorable à son observation. Ce qui n'est pas le cas du conformère -cis ($\mu_b \simeq 2.4D$). Pour le 2-MP, un seul conformère a été identifié en raison de la stabilisation par la liaison hydrogène intramoléculaire entre les groupes $-OH$ et $-OCH_3$, les projections du moment dipolaire permanent selon a et b ont été calculées à $\mu_a \simeq -2.05D$ et $\mu_b \simeq -1.82D$, respectivement.




FIGURE B.2 – (a) géométrie du 2-MP stabilisée par la liaison hydrogène optimisée au niveau B3LYP/cc-pVTZ et représentée dans le plan d’inertie ab avec le vecteur de moment dipolaire permanent (flèche bleue). (b) Surface d’énergie potentielle décrivant le paysage conformationnel du 2-MP calculée avec un pas de 5° au niveau B3LYP/6-311++G(d,p).




FIGURE B.3 – (a) géométries des conformères stables (-cis et -trans) du 4-MP optimisées au niveau B3LYP/cc-pVTZ et représentées dans le plan d’inertie ab avec le vecteur de moment dipolaire permanent (flèche bleue). (b) Surface d’énergie potentielle décrivant le paysage conformationnel du 4-MP calculée avec un pas de 5° au niveau B3LYP/6-311++G(d,p).

Analyse préliminaire des spectres

Les spectres millimétriques des 2-MP et 4-MP ont été analysés dans leur état fondamental de vibration à partir des constantes rotationnelles obtenues en spectroscopie rovibronique par Ruiz-Santoyo *et al.* dans l'UV [227] (voir figure B.4). Notre étude a permis une amélioration de la précision sur les constantes rotationnelles ainsi que la détermination des constantes de distorsion centrifuge à l'ordre quartique (voir table B.1). Pour le 4-MP, seul le conformère -cis a été identifié dans l'état fondamental, le conformère -trans n'a pas été identifié à ce jour. Concernant le seul conformère stable du 2-MP, plusieurs structures rotationnelles dans les modes de vibration basse fréquence ont également été identifiées dans le spectre millimétrique mesuré à température ambiante, en particulier dans les états excités v_{44} de torsion $-\text{CH}_3$ et v_{45} de pliage hors plan du groupe $-\text{OCH}_3$. Bien que les valeurs des constantes rotationnelles dans les différents états vibrationnels soient très proches, le calcul des défauts d'inertie $\Delta I''$ a permis de discerner sans ambiguïté l'état fondamental, les états vibrationnels simplement excités et l'état vibrationnel doublement excité (voir table B.2).




FIGURE B.4 – (a) : Spectre millimétrique mesuré dans la gamme 260–275 GHz avec le spectromètre à multiplication de fréquence (en noir) comparé aux spectres calculés dans l'état fondamental de vibration (en bleu) et les états de vibration excités $v_{45} = 1$ (en rouge), $v_{45} = 2$ (en vert) et $v_{44} = 1$ (en orange). (b) : agrandissement de (a) dans la gamme 271850–272125 MHz avec le même code couleurs, les transitions attribuées sont indiquées par des flèches (crédit : A. Jabri *et al.* prochainement soumis dans *Phys. Chem. Phys. Chem.*).

TABLE B.1 – Résumé des paramètres ajustés dans l'état fondamental des 2-MP et 4-MP comparés aux résultats de Ruiz-Santoyo *et al.* [227]. Les incertitudes 1σ sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Le défaut d'inertie $\Delta I'' = I_c - I_a - I_b$, le nombre N d'attributions de type a et de type b dans l'ajustement, les valeurs de J''_{\max} et K''_{\max} , et les déviations standard avec et sans unité (voir équations 1.84 et 1.85) sont indiqués.

2-MP				cis 4-MP			
Paramètre	Unité	Ce travail	Réf. [227]	Paramètre	Unité	Ce travail	Réf. [227]
		spectre millimétrique	UV			spectre millimétrique	UV
A	MHz	2607.06232(161)	2607.1(1)	A	MHz	4879.847978(92)	4880.2(1)
B	MHz	1560.79647(55)	1560.8(1)	B	MHz	990.884976(42)	990.7(1)
C	MHz	982.871809(230)	982.9(1)	C	MHz	828.4395937(234)	828.5(1)
Δ_J	kHz	0.0547107(255)		D_J	kHz	0.02006192(137)	
Δ_K	kHz	0.19273(42)		D_K	kHz	0.987505(41)	
Δ_{JK}	kHz	0.063686(269)		D_{JK}	kHz	-0.0374674(79)	
δ_J	kHz	0.0198118(125)		d_J	kHz	-0.00419469(84)	
δ_K	kHz	0.111559(117)		d_K	kHz	-0.000341234(294)	
N_{typea}		6732		N_{typea}		0	
N_{typeb}		5249		N_{typeb}		5976	
J''_{\max}		167		J''_{\max}		196	
K''_{\max}		63		K''_{\max}		42	
Dév. stand.	MHz	0.0898		Dév. stand.	MHz	0.0842	
Dév. stand. adim.	sans unité	0.72		Dév. stand. adim.	sans unité	0.84	

TABLE B.2 – Première partie : résumé des paramètres issus de l'analyse des états de vibration excités du 2-MP de torsion du CH_3 ($v_{44} = 1$) et de pliage hors plan du OCH_3 ($v_{45} = 1$ et $v_{45} = 2$) comparés aux valeurs calculées au niveau de théorie B3LYP/cc-pVTZ. Les incertitudes 1σ sont données entre parenthèses sur les dernières décimales. Deuxième partie : le défaut d'inertie $\Delta I'' = I_c - I_a - I_b$, le nombre N d'attributions de type a et de type b dans l'ajustement, les valeurs maximales du nombre quantique J''_{\max} et de $K''_{a\max}$, et les déviations standard avec et sans unité (voir équations 1.84 et 1.85) sont indiqués.

Paramètre	Unité	$v_{45} = 1$	Calc.	$v_{45} = 2$	Calc.	$v_{44} = 1$	Calc.
		Exp.	B3LYP/cc-pVTZ	Exp.	B3LYP/cc-pVTZ	Exp.	B3LYP/cc-pVTZ
ν_{harm}	cm^{-1}		77.0		154.0		178.6
ν_{anharm}	cm^{-1}	63.5	76.2		152.0		105.8
A	MHz	2605.45299(152)	2604.72	2604.06871(292)	2603.43	2604.9995(53)	2603.46
B	MHz	1560.52470(81)	1541.35	1560.1783(32)	1540.90	1559.26907(306)	1540.27
C	MHz	984.254369(236)	976.45	985.68133(35)	977.77	983.12322(39)	975.34
Δ_I	$\text{amu} \cdot \text{Å}^2$	-4.35788(32)	-4.339	-5.2762(14)	-5.229	-4.0617(16)	-4.074
Δ_J	kHz	0.055924(55)		0.057190(108)		0.05511(34)	
Δ_K	kHz	0.19455(34)		0.19268(48)		0.18462(137)	
Δ_{JK}	kHz	0.066892(315)		0.07192(47)		0.06719(153)	
δ_J	kHz	0.0201189(273)		0.020391(55)		0.019914(170)	
δ_K	kHz	0.113813(151)		0.115373(270)		0.11172(72)	
N_{typea}		5386		2935		1976	
N_{typeb}		4221		3033		2072	
J''_{\max}		166		166		165	
$K''_{a,\max}$		74		66		60	
Dév. stand.	MHz	0.0969		0.0955		0.0860	
Dév. stand. adim.	sans unité	0.81		0.82		0.86	

Annexe C

Productions scientifiques

Articles dans des revues à comité de lecture

1. A. Roucou, D. Fontanari, G. Dhont, A. Jabri, C. Bray, G. Mouret, R. Bocquet, A. Cuisset*, “Full conformational landscape of 3-Methoxyphenol revealed by room temperature mm-wave rotational spectroscopy supported by quantum chemical calculations”, *ChemPhysChem communications*, 2018
2. A. Roucou, I. Kleiner, M. Goubet, S. Bteich, G. Mouret, R. Bocquet, F. Hindle, W. L. Meerts, A. Cuisset*, “Towards the detection of explosive taggants : microwave and millimetre-wave gas phase spectroscopies of 3-Nitrotoluene”, *ChemPhysChem* 18(9), 2018, 1056-1067
3. A. Roucou, G. Dhont, A. Cuisset*, M.-A. Martin-Drumel, S. Thorwirth, D. Fontanari, W. L. Meerts, “High resolution study of the ν_2 and ν_5 rovibrational fundamental bands of thionyl chloride : Interplay of an evolutionary algorithm and a line-by-line analysis”, *The Journal of Chemical Physics* 147(5), 2017, 054303.
4. M.-A. Martin-Drumel*, A. Roucou, G. G. Brown, S. Thorwirth, O. Pirali, G. Mouret, F. Hindle, M. C. McCarthy, A. Cuisset, “High resolution spectroscopy of six SOCl₂ isotopologues from the microwave to the far-infrared”, *The Journal of Chemical Physics* 144(8), 2016, 084305.

Présentations orales

1. “Towards the detection of explosive taggants : microwave and millimeter-wave gas phase spectroscopies of 3-Nitrotoluene.” A. Roucou, I. Kleiner, M. Goubet, S. Bteich, G. Mouret, R. Bocquet, F. Hindle, W. L. Meerts, A. Cuisset, **International Symposium on Molecular Spectroscopy - 73rd Meeting**, Urbana-Champaign, Illinois, USA, 18/06/18 - 22/06/18.
2. “High resolution study of the ν_2 and ν_5 rovibrational fundamental bands of thionyl chloride : interplay of an evolutionary algorithm and a line-by-line analysis.” A. Roucou, G. Dhont, A. Cuisset, M. A. Martin-Drumel, S. Thorwirth, D. Fontanari and L. Meerts, **International Symposium on Molecular Spectroscopy - 73rd Meeting**, Urbana-Champaign, Illinois, USA, 18/06/18 - 22/06/18.
3. “High resolution study of the ν_2 and ν_5 rovibrational fundamental bands of thionyl chloride : interplay of an evolutionary algorithm and a line-by-line analysis.” A. Roucou, G. Dhont, A. Cuisset, M. A. Martin-Drumel, S. Thorwirth, D. Fontanari and L. Meerts, **École doctorale thématique METAMORPHOSE (conférence invité)**, Université Catholique de Louvain, Belgique, 23/05/18.
4. “Analyses of rotationally dense high-resolution spectra of molecules in gas phase for environmental and defense applications.” A. Roucou, G. Mouret, A. Cuisset, **séminaire (conférence invité)**, Université de Kassel, Allemagne, 06/03/18.
5. “Internal rotation potential and pure rotational spectroscopy of 3-nitrotoluene”, A. Roucou, I. Kleiner, S. Bteich, M. Goubet, G. Mouret, F. Hindle, R. Bocquet, W. L. Meerts, and A. Cuisset. **GdR Nano Tera MIR, 9th THz Days**, Dunkerque, France, 12/06/17 - 15/06/17.
6. “Internal rotation potential and pure rotational spectroscopy of 3-nitrotoluene”, A. Roucou, I. Kleiner, S. Bteich, M. Goubet, G. Mouret, F. Hindle, R. Bocquet, W. L. Meerts, and A. Cuisset. **GdR SPECMO - 2017 Plenary Meeting - Forum Jeunes Chercheurs**, Université Lille 1, Villeneuve d’Ascq, France, 22/05/17 - 23/05/17.
7. “Internal rotation potential and pure rotational spectroscopy of 3-nitrotoluene”, A. Roucou, A. Cuisset, G. Mouret, F. Hindle, R. Bocquet, D. Sadovskii, I. Kleiner, M. Goubet. S. Bteich, W. L. Meerts. **International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy 2016**, Prague, République Tchèque, 30/08/16 - 3/09/16.
8. “Evolutionary algorithm-based analysis of the ν_5 and ν_2 bands of SOCl_2 ”, A. Roucou, W. L. Meerts, M.-A. Martin-Drumel, G. Dhont, A. Cuisset. **International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy 2016**, Prague, République Tchèque, 30/08/16 - 3/09/16.
9. “High resolution spectroscopy of SOCl_2 and its isotopologues : from the microwave to the far-infrared”, A. Roucou, M. A. Martin-Drumel, G. G. Brown, S. Thorwirth, O. Pirali, G. Mouret, F. Hindle, M. C. McCarthy, A. Cuisset. **11th SOLEIL USER’S MEETING**, École Polytechnique, Palaiseau, France, 21/01/16 - 22/01/16.

Présentations par affiche

1. “Introduction to the THz high resolution gas phase spectroscopy.” A. Roucou, G. Mouret, A. Cuisset, **École doctorale thématique METAMORPHOSE**, Université Catholique de Louvain, Belgium, 23/05/18.
2. “Towards the detection of explosive taggants : microwave and millimeter-wave gas phase spectroscopies of 3-Nitrotoluene”, A. Roucou, I. Kleiner, M. Goubet, S. Bteich, G. Mouret, R. Bocquet, F. Hindle, W. L. Meerts, A. Cuisset, 23 Mai 2018, **École doctorale thématique METAMORPHOSE**, Université Catholique de Louvain, Belgium, 23/05/18.
3. “Analysis of the 3-methoxyphenol conformers stability by mean of high-resolution THz spectroscopy” A. Roucou, A. Cuisset, G. Mouret, C. Bray, D. Fontanari, C. Coeur, F. Hindle, R. Bocquet, **The 25th International Colloquium of High Resolution Molecular Spectroscopy**, Helsinki, Finlande, 20/08/17 - 25/08/17.
4. “Pure rotational spectroscopy of 3-nitrotoluene : a case of very low-barrier for internal rotation” A. Roucou, A. Cuisset, G. Mouret, F. Hindle, R. Bocquet, I. Kleiner, M. Goubet, S. Bteich, L. Meerts, **The 25th International Colloquium of High Resolution Molecular Spectroscopy**, Helsinki, Finlande, 20/08/17 - 25/08/17.
5. “High resolution study of the ν_2 and ν_5 rovibrational fundamental bands of thionyl chloride : interplay of an evolutionary algorithm and a line by line analysis” A. Roucou, G. Dhont, A. Cuisset, M.-A. Martin-Drumel, S. Thorwirth, W. L. Meerts, **The 25th International Colloquium of High Resolution Molecular Spectroscopy**, Helsinki, Finlande, 20/08/17 - 25/08/17.
6. “Evolutionary algorithm-based analysis of the rovibrational SCl_2 stretching bands of thionyle chloride” A. Roucou, G. Dhont, A. Cuisset, M.-A. Martin-Drumel, S. Thorwirth, D. Fontanari and W. L. Meerts, **9th THz Days**, Dunkerque, France, 12/06/17 - 15/06/17.
7. “Analysis of the 3-methoxyphenol conformers stability by mean of high-resolution THz spectroscopy” A. Roucou, A. Cuisset, G. Mouret, D. Fontanari, C. Bray, F. Hindle, R. Bocquet **GdR SPECMO - 2017 Plenary Meeting - Forum Jeunes Chercheurs**, Université Lille 1, Villeneuve d’Ascq, France, 22/05/17 - 23/05/17.
8. “High resolution study of the ν_2 and ν_5 rovibrational fundamental bands of thionyl chloride : interplay of an evolutionary algorithm and a line by line analysis” A. Roucou, G. Dhont, A. Cuisset, M.-A. Martin-Drumel, S. Thorwirth, W. L. Meerts, **GdR SPECMO - 2017 Plenary Meeting - Forum Jeunes Chercheurs**, Université Lille 1, Villeneuve d’Ascq, France, 22/05/17 - 23/05/17.
9. “Analysis of the 3-methoxyphenol conformers stability by mean of high-resolution THz spectroscopy” A. Roucou, A. Cuisset, G. Mouret, D. Fontanari, C. Bray, F. Hindle, R. Bocquet. **International Conference on Aerosol Cycle 2017 - Labex CaPPA**, Villeneuve d’Ascq, France 21/03/17 - 23/03/17.
10. “Evolutionary algorithm-based analysis of the rovibrational SCl_2 stretching bands of thionyle chloride” A. Roucou, W. L. Meerts, M.-A. Martin-Drumel, O. Pirali, G. Dhont and A. Cuisset, **12th SOLEIL USER’S MEETING**, École Polytechnique, Palaiseau, France, 19/01/17 - 20/01/17.
11. “High resolution spectroscopy of SOCl_2 and its isotopologues : from the microwave to the far-infrared” A. Roucou, A. Cuisset, G. Mouret, F. Hindle, M. A. Martin-Drumel, M. C. Mccarthy, G. G. Brown, S. Thorwirth, O. Pirali, **The 24th International Colloquium of High Resolution Molecular Spectroscopy**, Dijon, France, 24/08/15 - 28/08/15.



High resolution spectroscopy of six SOCl₂ isotopologues from the microwave to the far-infrared

M. A. Martin-Drumel,^{1,a)} A. Roucou,² G. G. Brown,³ S. Thorwirth,⁴ O. Pirali,⁵ G. Mouret,² F. Hindle,² M. C. McCarthy,¹ and A. Cuisset²

¹Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, Massachusetts 02138, USA and School of Engineering and Applied Science, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138, USA

²Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère, Université du Littoral Côte d'Opale, Dunkerque, France

³Coker College, Hartsville, South Carolina 29550, USA

⁴I. Physikalisches Institut, Universität zu Köln, Köln, Germany

⁵AILES Beamline, Synchrotron SOLEIL, Saint Aubin, France

(Received 26 October 2015; accepted 28 January 2016; published online 24 February 2016)

Despite its potential role as an atmospheric pollutant, thionyl chloride, SOCl₂, remains poorly characterized in the gas phase. In this study, the pure rotational and ro-vibrational spectra of six isotopologues of this molecule, all detected in natural abundance, have been extensively studied from the cm-wave band to the far-infrared region by means of three complementary techniques: chirped-pulse Fourier transform microwave spectroscopy, sub-millimeter-wave spectroscopy using frequency multiplier chain, and synchrotron-based far-infrared spectroscopy. Owing to the complex line pattern which results from two nuclei with non-zero spins, new, high-level quantum-chemical calculations of the hyperfine structure played a crucial role in the spectroscopic analysis. From the combined experimental and theoretical work, an accurate semi-experimental equilibrium structure (r_e^{SE}) of SOCl₂ has been derived. With the present data, spectroscopy-based methods can now be applied with confidence to detect and monitor this species, either by remote sensing or *in situ*. © 2016 AIP Publishing LLC. [<http://dx.doi.org/10.1063/1.4942024>]

I. INTRODUCTION

Thionyl chloride, SOCl₂, is a versatile industrial compound with a global production measured in tens of thousands of tons per year. It is widely used as a chlorinating reagent in the industrial production of organochlorine compounds.¹⁻⁴ Thionyl chloride is also the cathode material in Li-SOCl₂ batteries which are characterized by remarkably high energy density and long lifetime.⁵ However, safety concerns raised by the handling of the highly toxic content of these non-rechargeable cells have limited their use to industrial and commercial applications.⁶ Improper disposal of SOCl₂ may have a significant pollution effect, particularly in the troposphere where the hydrolysis of this volatile molecule may release HCl and SO₂ within a few minutes.^{2,3,7} Furthermore, the US threshold of toxicity (irreversible effects) for SOCl₂ is several ppm for an exposure of 10 min to 1 h.⁸ While various types of toxic gas detectors are commercially available or have been described in the literature,⁹ only a few have demonstrated SOCl₂ detection capability. In 2008, Lee and Strano¹⁰ detected thionyl chloride at 0.7 ppb using a single walled carbon nanotube sensor functionalized with a polymer amine. However, the reproducibility of this detector is poor with detection limit varying significantly from one device to another (0.1–15 ppb). Furthermore, the molecule-specific selectivity has not been demonstrated, either with respect to competing substances such as chlorine and hydrochloric acid

or even to water vapor of the atmosphere. More generally, some portable detection devices are able to identify many different chemical species using, for instance, ion mobility spectrometry or flame photometry.^{11,12} Usually, these techniques are very sensitive but not selective; a pollutant can therefore easily be masked by another, unrelated compound. To address the issue of selectivity, next generation sensitive trace gas detectors will most likely exploit sensors in the sub-millimeter (submm) and terahertz (THz) domain, where observed transitions are molecule-specific.¹³ In case of SOCl₂, however, rotational transitions in this frequency region remain unknown.

Motivated by the industrial and environmental importance of SOCl₂, numerous studies of its electrochemistry,¹⁴ kinetics,¹⁵ hydrolysis,^{2,3} and photodissociation^{16,17} have been performed. With respect to gas phase spectroscopic investigation, structural parameters have been derived from electron and X-ray diffraction studies,^{18,19} the visible-ultraviolet spectrum has been recorded,²⁰ and the fundamental vibrational modes have been observed at low resolution by infrared (IR) and Raman spectroscopy.^{21,22} High resolution measurements, however, have been extremely limited. Long restricted to pure rotational spectroscopy in the microwave (MW) spectral region,²³ they were recently extended (by some of us) to the far-infrared (FIR), where two low-lying vibrational modes (ν_3 and ν_6) were characterized.⁴ SOCl₂ is a highly asymmetric top molecule ($\kappa = -0.448$ for the main isotopologue) belonging to the C_s point group owing to its plane of symmetry (Figure 1). Despite its relatively small size, its rotational and ro-vibrational spectra are extremely




FIG. 1. Molecular structure of SOCl₂. Best-fit bond lengths and angles from the semi-experimental structure determined in this study (errors are quoted in parentheses). τ is the dihedral angle $D(\text{ClS.O.Cl})$.

dense because (i) SOCl₂ is a relatively heavy molecule and consequently possesses small rotational constants and (ii) the symmetry plane corresponds to the bc inertial plane and the two components of the dipole moment along these two principal axes of inertia are similar in magnitude, yielding b - and c -type transitions of comparable intensity in the pure rotation spectrum. That spectrum is further complicated by the presence of several abundant isotopologues (Table I) and two Cl atoms which produce resolvable nuclear quadrupole structure in the MW region (Figure 2).

The pure rotational spectrum of SOCl₂ has previously been measured in the MW band for the three most abundant isotopologues, ³²S¹⁶O³⁵Cl³⁵Cl, ³²S¹⁶O³⁵Cl³⁷Cl, and ³²S¹⁶O³⁷Cl³⁷Cl (referred to hereafter as [32,16,35,35], [32,16,35,37], and [32,16,37,37] for the sake of simplicity) yielding accurate spectroscopic parameters for these species²³⁻³³ and allowing the determination of the r_0 structure.^{27,28} The determination of the nuclear quadrupole constants has proven more challenging since the S-Cl bond does not lie in any of the three planes defined by the principal axes of inertia, which results in non-zero off-diagonal coupling constants. Consequently, the six diagonal and off-diagonal constants have only been determined for the main isotopologue by means of Fourier-transform MW (FTMW) spectroscopy.²³

TABLE I. Absolute and relative abundance of SOCl₂ isotopologues.

Species	Abundance (%)	
	Absolute	Relative
[32,16,35,35]	54.42	100.00 ^a
[32,16,35,37]	34.80	63.96 ^a
[32,16,37,37]	5.57	10.23 ^a
[34,16,35,35]	2.41	4.43 ^a
[34,16,35,37]	1.54	2.83 ^a
[33,16,35,35]	0.43	0.79
[33,16,35,37]	0.27	0.50
[34,16,37,37]	0.25	0.45 ^a
[32,18,35,35]	0.11	0.21
[32,18,35,37]	0.07	0.13
[33,16,37,37]	0.04	0.08
[32,18,37,37]	0.01	0.02

^aSpecies studied in this work.




FIG. 2. Portion of the chirped-pulse spectrum showing the $1_{10}-0_{00}$ transition of different isotopologues of SOCl₂. The structure of each transition is dominated by the nuclear quadrupole hyperfine structure of the Cl nuclei.

In the present study, high resolution investigations of the pure rotational and ro-vibrational spectra of six isotopologues of SOCl₂ — [32,16,35,35], [32,16,35,37], [32,16,37,37], [34,16,35,35], [34,16,35,37], and [34,16,37,37], all detected in natural abundance — have been undertaken from the MW to the FIR, using three complementary experimental approaches: (i) chirped-pulse FTMW (CP-FTMW) spectroscopy; (ii) submm spectroscopy using a frequency multiplication chain; and (iii) synchrotron-based FT-FIR spectroscopy. The 7 to 19 GHz CP-FTMW spectrum of SOCl₂ reveals pure rotational transitions of all six isotopologues studied here, with resolved chlorine nuclear quadrupole structure. Additional pure rotational transitions in the ground vibrational state of [32,16,35,35], [32,16,35,37], and [32,16,37,37] have been recorded in the 70–660 GHz region. Finally, the rovibrational spectra of the symmetric ν_3 (344 cm⁻¹) and asymmetric ν_6 (284 cm⁻¹) fundamental bands of [32,16,35,37] and [32,16,37,37] have been resolved. Accurate spectroscopic parameters of each species (rotational, centrifugal distortion (CD), and nuclear quadrupole constants; vibrational band centers) have been determined from fits of all these data. From these highly accurate experimental rotational constants and quantum-chemical calculations, a highly accurate semi-experimental (SE) equilibrium structure (r_e^{SE}) has been derived for the molecule.

II. EXPERIMENTS AND THEORETICAL CALCULATIONS

A. Chirped-pulse FTMW spectroscopy

The broadband spectrum of SOCl₂ has been measured in the 7–19 GHz region using CP-FTMW spectroscopy.³⁴ A gaseous mixture of 0.5% of the molecule heavily diluted in neon, at a backing pressure of 3.3 bars, was supersonically expanded into the vacuum chamber via a pulsed nozzle operating at 5 Hz. Details on the design on the pulsed nozzle can be found in Ref. 35. The chirps from our arbitrary waveform generator (AWG) are 4 μ s in duration, span 0.5–11.5 GHz, and are repeated every 20 μ s. Because the gas pulse is long (~1 ms)

^{a)}Electronic mail: mmartin@cfa.harvard.edu

compared to the dephasing time ($\sim 10 \mu\text{s}$) of the free induction decay (FID), 10 chirps can be used to interrogate each gas pulse. The total recorded FID consists of 750,000 points, each separated by 2 ps. The first 5 μs of this FID contains the chirp, and the remaining 10 μs are Fourier-transformed, resulting in a resolution of 100 kHz in the frequency domain.

A total of 4×10^6 FIDs was recorded and averaged in about 20 h. The resulting rotational spectrum, obtained by Fourier transforming the FID, presents a very high signal-to-noise ratio (SNR), as evidenced in Figure 2. The time domain spectrum was post-zero-filled by a factor of 16 prior to Fourier transformation, yielding points spaced by about 7 kHz in the frequency domain. The central frequency of each transition has been determined from a search of local maxima in the spectrum; no attempt has been made to fit individual line profiles. Owing to the wide range of SNR, uncertainties have been derived for each transition using the empirical equation

$$\Delta\nu = \Delta\nu_{\text{shape}} + \Delta\nu_{\text{spacing}} = \frac{\text{FWHM}}{2\text{SNR}} + \frac{\delta}{2}, \quad (1)$$

where FWHM is the full-width half-maximum of the line, typically 300 kHz in this study, and δ the frequency step. The first term of the equation is a well-known expression used in conventional FT infrared spectroscopy,³⁶ while the second one arises from our peak finding algorithm, i.e., $\delta = 7$ kHz in this study. Using this equation, $\Delta\nu$ as low as 10 kHz have been calculated for some transitions. To simplify the uncertainties, the values obtained from Equation (1) have been rounded to steps of 5 kHz. The validity of Equation (1) was first verified on [32.16.35.35] by comparing the very accurate frequencies from Müller and Gerry²³ (to better than 1 kHz) to our experimental frequencies and their associated errors calculated using Equation (1). Additional details of this procedure are presented in supplementary material S1.³⁷

In addition to the main isotopologue, transitions of five isotopic species — [32.16.35.37], [32.16.37.37], [34.16.35.35], [34.16.35.37], and [34.16.37.37] — were observed and assigned. Transitions of the ³³S isotopic species have also been identified, but no attempt was made to assign them considering that the presence of a third nuclear quadrupole yields an even more complex hyperfine pattern. Finally, some transitions of [32.18.35.35] have been observed but these lines are quite weak and spectral congestion prevented any definite assignment (Fig. 2).

B. Sub-millimeter spectroscopy

The absorption spectrum of SOCl₂ has been recorded at room temperature in the submm domain. A continuous flow of 15 μbar of the sample, maintained by a roughing pumping, was passed through a 120 cm-long and 56 mm-diameter single-path absorption cell and probed by the radiation generated from a frequency multiplier chain (Virginia Diodes, Inc). Two off-axis parabolic mirrors are used to collimate the radiation into the cell and then refocused it onto a liquid helium cooled InSb bolometer.^{38–40} The spectrum has been recorded in the 70–110 and 140–660 GHz regions using a frequency modulation of 60 kHz, 11 kHz modulation depth of the frequencies delivered by the synthesizer, a time constant

of 10 ms, and 100 kHz frequency steps. Pure rotational transitions of the three most abundant isotopologues of SOCl₂ — [32.16.35.35], [32.16.35.37], and [32.16.37.37] — in their ground vibrational state have been assigned in the spectrum (Figure 3).

C. Fourier-transform far-infrared spectroscopy

In a recent study by several of us,⁴ the high resolution (0.001 cm^{-1}) FT-FIR spectrum of SOCl₂ was recorded at the SOLEIL synchrotron facility and the ν_3 and ν_6 ro-vibrational bands of [32.16.35.35] were analyzed. We report here further study of this spectrum which has enabled the assignment of transitions in these two bands for [32.16.35.37] and [32.16.37.37], both detected in natural abundance (Figure 4). All experimental details (beamsplitter, detector, absorption length, etc.) have been reported previously.⁴

III. QUANTUM-CHEMICAL CALCULATIONS

The high-resolution spectroscopic study of SOCl₂ presented here was complemented with quantum-chemical calculations performed at the coupled-cluster singles and doubles (CCSD) level augmented by a perturbative treatment of triple excitations, CCSD(T).⁴¹ All calculations were performed using the program suite CFOUR⁴² in combination with basis sets from Dunning's hierarchies of correlation consistent polarized valence and polarized core-valence sets [cc-pVX Z, cc-pV(X+d)Z, and cc-pwCVX Z with X = T and Q].⁴³ Equilibrium molecular structures were calculated using analytic gradient techniques.⁴⁴ The theoretical best-estimate structure was calculated at the CCSD(T)/cc-pwCVQZ level of theory (considering all electrons in the correlation treatment) which has been shown earlier to provide equilibrium structural parameters of very high quality.^{45–47} The chlorine equilibrium nuclear quadrupole coupling and spin-rotation constants were derived at the same level of theory (the latter employing perturbation-dependent basis functions⁴⁸) to support the analysis of the complex hyperfine structure observed in the pure rotational spectra of SOCl₂. Harmonic and anharmonic




FIG. 3. Portion of the sub-millimeter spectrum of SOCl₂ (upper traces) and comparison with simulation (stick spectrum) of the pure rotational spectrum of [32.16.35.35], [32.16.35.37], and [32.16.37.37] (lower traces). Transitions in the experimental spectrum show a typical second derivative shape.




FIG. 4. Experimental FT-FIR spectrum of the ν_6 band of SOCl₂ compared with simulated spectra for the [32.16.35.37] and [32.16.37.37] isotopologues. The strongest Q-branch feature on the experimental spectrum, which is not reproduced by the simulations, arises from [32.16.35.35] (its analysis has been published previously⁴). The contribution of [32.16.35.37] to slightly lower energy is clearly visible, as well as hot-band Q-branches to high wavenumber from the one for the fundamental of [32.16.35.35]. Strong individual lines in the experimental spectrum arise from residual water in the absorption cell.

force fields were calculated in the frozen-core approximation at the CCSD(T)/cc-pV(T+d)Z level of theory using analytic second-derivative techniques^{49,50} followed by additional numerical differentiation to calculate the third and fourth derivatives needed for the anharmonic force fields.^{50,51} The calculated zero-point vibrational corrections (ΔA_0 , ΔB_0 , and ΔC_0) and the experimental ground state rotational constants were then used to determine semi-experimental equilibrium rotational constants from the relation $B_{\text{SE}}^e = B_0 + \Delta B_0$ (with similar relations for A_{SE}^e and C_{SE}^e , respectively) which themselves were directly converted into semi-experimental moments of inertia for the molecular structure determination. A review of the methods and strategies employed here has been given recently elsewhere.⁵² See supplementary material S2 for detailed results of the quantum-chemical calculations.³⁷

IV. RESULTS AND DISCUSSION

For [32.16.35.35], [32.16.35.37], and [32.16.37.37], pure rotational transitions have been assigned up to 660 GHz on

the MW and submm spectra. Additionally, for [32.16.35.37] and [32.16.37.37], ro-vibration transitions in the ν_3 and ν_6 bands have been assigned in the FT-FIR spectrum. Finally, pure rotational transitions of [34.16.35.35], [34.16.35.37], and [34.16.37.37] have been assigned up to about 18 GHz in the MW spectrum. Complete lists of assigned transitions are provided in supplementary material S3.³⁷

A. Determination of the molecular constants

Effective fits have been performed for each isotopologue using the SPFIT/SPCAT suite of programs⁵³ in which the present new measurements and all available transitions from the literature, i.e., from Refs. 4, 23, 24, and 29 for [32.16.35.35] and Refs. 29, 31, and 32 for [32.16.35.37], have been included. MW transitions have been weighted according to Equation (1), while for the submm and FIR transitions, a single uncertainty — 100 kHz and 0.0003 cm^{-1} , respectively — has been used in the fits. Individual unitless standard deviations are close to unity for all fits, as illustrated by Table II, a likely indication of the robustness of the fit. The complete list of molecular parameters for all isotopologues, including nuclear quadrupole coupling constants and rotational constants in vibrationally excited states, is presented in supplementary material S4.³⁷

Table III presents the extensive list of ground state rotational and centrifugal distortion (CD) constants, as well as the ν_3 and ν_6 band centers, derived for [32.16.35.35], [32.16.35.37], and [32.16.37.37] (nuclear quadrupole coupling parameters are omitted from this table but can be found in supplementary material S4³⁷). In particular, all quartic and sextic CD terms, as well as one octic term (L_K), are determined for these three species. The use of three broadband rotationally resolved techniques has enabled the determination of an extensive list of precise spectroscopic parameters and allows the most intense rotational transitions of SOCl₂ to be predicted to very high accuracy from the MW to the FIR. For trace gas detection, accurate frequency lists in the terahertz domain should be particularly valuable for [32.16.35.35].

It is also worth emphasizing that reproducing the nuclear quadrupole structure which is well resolved in the MW

TABLE II. Summary of the number of fitted frequencies (N^a) highest quantum numbers and standard deviation for the six fits performed in this study.

	Transitions				Standard deviation		
	N	N^b	J''_{max}	K''_{max}	MW ^c /MHz	IR ^d / cm^{-1}	Unitless
[32.16.35.35]	18209	8706	127	71	0.095	0.00012	1.05
[32.16.35.37]	15341	15260	117	65	0.090	0.00030	1.07
[32.16.37.37]	8274	8274	100	64	0.100	0.00033	1.07
[34.16.35.35]	137	137	4	2	0.060		0.85
[34.16.35.37]	67	67	2	1	0.073		1.25
[34.16.37.37]	23	23	1	1	0.054		1.10

^a N represents the number of different frequencies in the fit, including resolved nuclear quadrupole structure. For instance, in case of [34.16.37.37], 3 rotational transitions were observed, each of which was split into several hyperfine components yielding 23 frequencies assigned. At high frequency, many asymmetric splittings are unresolved in the submm and FIR spectra, and thus appear as a single frequency in this summary.

^bThis work.

^cMW and submm data.

^dFIR data.

- ¹⁸I. Hargittai, *Acta Chim. Acad. Sci. Hung.* **60**, 231 (1969).
- ¹⁹D. Mootz and A. Merschenz-Quack, *Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun.* **44**, 926 (1988).
- ²⁰A. P. Ulhman, P. J. Demlein, T. D. Allston, M. C. Withiam, M. J. McClements, and G. A. Takacs, *J. Phys. Chem.* **82**, 2252 (1978).
- ²¹R. Vogel-Hogler, *Acta Phys. Austriaca* **1**, 323 (1948).
- ²²D. E. Martz and R. T. Lagemann, *J. Chem. Phys.* **22**, 1193 (1954).
- ²³H. S. P. Müller and M. C. L. Gerry, *J. Chem. Soc., Faraday Trans.* **90**, 3473 (1994).
- ²⁴J. Burie, J. L. Destombes, A. Dubrulle, and G. Journel, *C. R. Hebd Seances Acad. Sci., Sér. B* **267**, 48 (1968).
- ²⁵G. Journel, A. Dubrulle, J. L. Destombe, and C. Marliere, *C. R. Hebd Seances Acad. Sci., Sér. B* **271**, 331 (1970).
- ²⁶H. U. Wenger, A. Bauder, and H. H. Gunthard, *Chem. Phys.* **1**, 441 (1973).
- ²⁷S. Suzuki, M. Yamaguchi, M. Onda, T. Sakaizumi, O. Ohashi, and I. Yamaguchi, *J. Mol. Struct.* **73**, 41 (1981).
- ²⁸F. Mata and N. Carballo, *J. Mol. Struct.* **101**, 233 (1983).
- ²⁹G. Journel, Ph.D. thesis, University of Lille, France, 1969.
- ³⁰J. L. Destombes, Ph.D. thesis, University of Lille, France, 1970.
- ³¹A. Dubrulle and D. Boucher, *C. R. Hebd Seances Acad. Sci. Sér. B* **274**, 1426 (1972).
- ³²L. Merke and H. Dreizler, *Z. Naturforsch.* **A 47**, 1141 (1992).
- ³³A. Dubrulle, Ph.D. thesis, University of Lille, France, 1972.
- ³⁴G. G. Brown, B. C. Dian, K. O. Douglass, S. M. Geyer, S. T. Shipman, and B. H. Pate, *Rev. Sci. Instrum.* **79**, 053103 (2008).
- ³⁵W. Chen, S. E. Novick, M. C. McCarthy, C. A. Gottlieb, and P. Thaddeus, *J. Chem. Phys.* **103**, 7828 (1995).
- ³⁶S. P. Davis, M. C. Abrams, and J. W. Brault, *Fourier Transform Spectrometry* (Academic Press, 2001).
- ³⁷See supplementary material at <http://dx.doi.org/10.1063/1.4942024> for the determination of the accuracy on line frequency using CP-FTMW spectroscopy, the results of quantum-chemical calculations, the spectroscopic parameters, and all experimental frequencies and fit files.
- ³⁸G. Mouret, M. Guinet, A. Cuisset, L. Croize, S. Eliet, R. Bocquet, and F. Hindle, *IEEE Sens. J.* **13**, 133 (2013).
- ³⁹A. Cuisset, M.-A. Martin-Drumel, F. Hindle, G. Mouret, and D. A. Sadovskii, *Chem. Phys. Lett.* **586**, 10 (2013).
- ⁴⁰O. Pirali, Z. Kisiel, M. Goubet, S. Gruet, M. A. Martin-Drumel, A. Cuisset, F. Hindle, and G. Mouret, *J. Chem. Phys.* **142**, 104310 (2015).
- ⁴¹K. Raghavachari, G. W. Trucks, J. A. Pople, and M. Head-Gordon, *Chem. Phys. Lett.* **157**, 479 (1989).
- ⁴²cfour, a quantum chemical program package written by J. F. Stanton, J. Gauss, M. E. Harding, and P. G. Szalay, with contributions from A. A. Auer, R. J. Bartlett, U. Benedikt, C. Berger, D. E. Bernholdt, Y. J. Bomble, L. Cheng, O. Christiansen, M. Heckert, O. Heun, C. Huber, T.-C. Jagau, D. Jonsson, J. Jusélius, K. Klein, W. J. Lauderdale, D. A. Matthews, T. Metzroth, L. A. Mück, D. P. O'Neill, D. R. Price, E. Prochnow, C. Pazzarini, K. Ruud, F. Schiffmann, W. Schwalbach, S. Stopkowitz, A. Tajti, J. Vázquez, F. Wang, and J. D. Watts and the integral packages MOLECULE (J. Almlöf and P. R. Taylor), PROPS (P. R. Taylor), ABACUS (T. Helgaker, H. J. Aa. Jensen, P. Jørgensen, and J. Olsen), and ECP routines by A. V. Mitin and C. van Wüllen. For the current version, see <http://www.cfour.de>; M. E. Harding, T. Metzroth, J. Gauss, and A. A. Auer, *J. Chem. Theory Comput.* **4**, 64 (2008).
- ⁴³T. H. Dunning, *J. Chem. Phys.* **90**, 1007 (1989); T. H. Dunning, K. A. Peterson, and A. K. Wilson, *ibid.* **114**, 9244 (2001); D. E. Woon and T. H. Dunning, *ibid.* **103**, 4572 (1995).
- ⁴⁴J. D. Watts, J. Gauss, and R. J. Bartlett, *Chem. Phys. Lett.* **200**, 1 (1992).
- ⁴⁵S. Coriani, D. Marcheson, J. Gauss, C. Hättig, T. Helgaker, and P. Jørgensen, *J. Chem. Phys.* **123**, 184107 (2005).
- ⁴⁶D. T. Halfen, D. J. Clouthier, L. M. Ziurys, V. Lattanzi, M. C. McCarthy, P. Thaddeus, and S. Thorwirth, *J. Chem. Phys.* **134**, 134302 (2011).
- ⁴⁷S. Thorwirth, R. I. Kaiser, K. N. Crabtree, and M. C. McCarthy, *Chem. Commun.* **51**, 11305 (2015).
- ⁴⁸J. Gauss, K. Ruud, and T. Helgaker, *J. Chem. Phys.* **105**, 2804 (1996).
- ⁴⁹J. Gauss and J. F. Stanton, *Chem. Phys. Lett.* **276**, 70 (1997).
- ⁵⁰J. F. Stanton and J. Gauss, *Int. Rev. Phys. Chem.* **19**, 61 (2000).
- ⁵¹J. F. Stanton, C. L. Lopreore, and J. Gauss, *J. Chem. Phys.* **108**, 7190 (1998).
- ⁵²C. Pazzarini, J. F. Stanton, and J. Gauss, *Int. Rev. Phys. Chem.* **29**, 273 (2010).
- ⁵³H. M. Pickett, *J. Mol. Spectrosc.* **148**, 371 (1991).
- ⁵⁴Z. Kisiel, *J. Mol. Spectrosc.* **218**, 58 (2003).
- ⁵⁵Y. Morino, M. Tanimoto, and S. Saito, *Acta Chem. Scand., Ser. A* **42**, 346 (1988).
- ⁵⁶L. Bizzocchi, L. Cludi, C. Degli Esposti, and A. Giorgi, *J. Mol. Spectrosc.* **204**, 275 (2000).
- ⁵⁷A. Omar, S. Eliet, A. Cuisset, G. Dhont, C. Coeur-Tourneur, R. Bocquet, G. Mouret, and F. Hindle, *IEEE Sens. J.* **15**, 6141 (2015).



High resolution study of the ν_2 and ν_5 rovibrational fundamental bands of thionyl chloride: Interplay of an evolutionary algorithm and a line-by-line analysis

Anthony Roucou,¹ Guillaume Dhont,¹ Arnaud Cuisset,^{1,a)} Marie-Aline Martin-Drumel,² Sven Thorwirth,³ Daniele Fontanari,¹ and W. Leo Meerts⁴

¹Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère, CNRS EA-4493, Université du Littoral Côte d'Opale, 59140 Dunkerque, France

²Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay, CNRS, Bâtiment 210, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay Cedex, France

³Physikalisches Institut, Universität zu Köln, Köln, Germany

⁴Institute for Molecules and Materials, Molecular and Biophysics Group, Felix Laboratory, Radboud University, Toernooiveld 7c, 6525 ED Nijmegen, The Netherlands

(Received 9 April 2017; accepted 18 July 2017; published online 3 August 2017)

The ν_2 and ν_5 fundamental bands of thionyl chloride (SOCl_2) were measured in the 420 cm^{-1} –550 cm^{-1} region using the FT-far-IR spectrometer exploiting synchrotron radiation on the AILES beamline at SOLEIL. A straightforward line-by-line analysis is complicated by the high congestion of the spectrum due to both the high density of SOCl_2 rovibrational bands and the presence of the ν_2 fundamental band of sulfur dioxide produced by hydrolysis of SOCl_2 with residual water. To overcome this difficulty, our assignment procedure for the main isotopologues $^{32}\text{S}^{16}\text{O}^{35}\text{Cl}_2$ and $^{32}\text{S}^{16}\text{O}^{35}\text{Cl}^{37}\text{Cl}$ alternates between a direct fit of the spectrum, via a global optimization technique, and a traditional line-by-line analysis. The global optimization, based on an evolutionary algorithm, produces rotational constants and band centers that serve as useful starting values for the subsequent spectroscopic analysis. This work helped to identify the pure rotational submillimeter spectrum of $^{32}\text{S}^{16}\text{O}^{35}\text{Cl}_2$ in the $\nu_2 = 1$ and $\nu_5 = 1$ vibrational states of Martin-Drumel *et al.* [J. Chem. Phys. 144, 084305 (2016)]. As a by-product, the rotational transitions of the $\nu_4 = 1$ far-IR inactive state were identified in the submillimeter spectrum. A global fit gathering all the microwave, submillimeter, and far-IR data of thionyl chloride has been performed, showing that no major perturbation of rovibrational energy levels occurs for the main isotopologue of the molecule. Published by AIP Publishing. [<http://dx.doi.org/10.1063/1.4996655>]

I. INTRODUCTION

Thionyl chloride, SOCl_2 , is an important reaction intermediate used by industries for manufacturing agrochemicals, dyestuffs, fine chemicals, and pharmaceuticals. It is an extremely powerful oxidant, and one of its primary uses is in the conversion of alcohols and carboxylic acids into their corresponding chlorides.¹ SOCl_2 has gained importance in the last quarter century due to its cathode role in lithium batteries and its global production exceeds 45 kt/year.² SOCl_2 is toxic and is listed as a Schedule 3 compound in the US Controlled Substances Act as it may be used for the production of chemical weapons. The atmospheric fate of SOCl_2 has been investigated by Johnson *et al.*¹ in a mixing chamber for various temperatures and relative humidity using Fourier transform (FT) infrared (IR) spectroscopy at low resolution. It was determined that humidity plays an important role, as water reacts rapidly with the parent compound, forming HCl and SO_2 in a nearly stoichiometric ratio of 2:1. Kinetic measurements demonstrated that the tropospheric lifetime due to

hydrolysis is on the order of few minutes only. Taking into account several characteristics of SOCl_2 in terms of strong toxicity, violent reactivity, and rather large volatility, it is now established that improper disposal of SOCl_2 may have a significant pollution effect indoors and outdoors and the development of rapid, sensitive, and selective instrumentation is required to monitor SOCl_2 exhausted emissions. Over the last years, different types of toxic gas detectors have been developed with very good sensitivity (<1 ppb), even though they still suffer from selectivity.³ To address this issue of selectivity, the next generation of toxic gas sensors will most likely probe molecule-specific rotational or rovibrational transitions.⁴ A deep knowledge of thionyl chloride THz spectrum is thus mandatory to define ideal spectral windows and sensitivity thresholds for the development of such sensors.

From a spectroscopic point of view, SOCl_2 is a relatively heavy molecule, isotopically rich in natural abundance, and characterized as a highly asymmetric rotor involving two dipole moment components along the two principal axes b and c which define the symmetry plane of the molecule. These combined factors explain the huge density of rotational and rovibrational energy levels populated at room temperature.

With respect to prior gas phase spectroscopic investigation studies of SOCl_2 , the VUV spectrum has been recorded⁵ and the fundamental vibrations have been measured by IR and Raman spectroscopies⁶ without any resolution of the rotational structure.

Our group recently initiated an intensive high-resolution spectroscopic study of SOCl_2 and its isotopologues from the microwave to the far-IR regions.^{4,7} Chirped-pulse FT microwave spectroscopy in supersonic expansion combined with high-level *ab initio* quantum-chemical calculations allowed the determination of accurate spectroscopic parameters for the six most abundant isotopologues and the determination of a highly accurate semi-experimental equilibrium geometry of SOCl_2 .⁴ At room temperature, very congested submillimeter and far-IR spectra have been rotationally resolved using a frequency multiplier chain and a high-resolution synchrotron-based FT-IR interferometer, respectively. Pure rotational transitions of the three most abundant isotopologues ($\text{SO}^{35}\text{Cl}_2$, $\text{SO}^{35}\text{Cl}^{37}\text{Cl}$, $\text{SO}^{37}\text{Cl}_2$) in their ground vibrational state have been assigned in the submillimeter spectrum in Ref. 4. Reference 7 describes the rovibrational analysis of the two low-energy IR active SCl_2 wagging ν_3 mode (symmetric, or A') and rocking ν_6 mode (asymmetric, or A'') in the far-IR domain. Unlike the ν_3 and ν_6 bands, the lowest energy band ν_4 predicted at 193.816 cm^{-1} and associated with the SCl_2 deformation⁷ is too weak to be observed in the far-IR region, and the determination of its rotational constants and centrifugal parameters requires one to probe pure rotational transitions in vibrationally excited states. The ν_2 symmetric (A') and ν_5 asymmetric (A'') SCl_2 stretching bands, which lie higher in frequency in the far-IR region, respectively, around 495 cm^{-1} and 446 cm^{-1} , remain unobserved at high resolution to date.⁷ Preliminary synchrotron-based FT-far-IR experiments failed to provide exploitable results due to strong interference with the intense ν_2 bending rovibrational band of sulfur dioxide SO_2 produced by reaction of SOCl_2 with residual water in the multipass cell.

The standard line-by-line assignment of high-resolution spectra is mostly based on pattern recognition. This procedure is time consuming and limited to well-resolved spectra with limited overlap between the transitions. A recently developed alternative consists in directly maximizing the overlap

between the experimental and theoretical spectra.^{8,9} A fitness function is defined as a normalized scalar product between the two spectra; the global maximum of this function corresponds to the best agreement between the two spectra.¹⁰ The assignment problem is thus set up as a global optimization procedure where the spectroscopic parameters are tuned to maximize the fitness function. The main advantage of this approach is that it can automatically find the global maximum without assignment of rotational quantum numbers to individual transitions. In these last years, global optimization procedures based on evolutionary algorithms (EAs) have been used by some research groups to simplify the analyses of rotationally resolved electronic spectra on a large variety of molecular compounds such as floppy biomolecules¹¹ or atmospheric radicals.¹² It has recently been successfully applied to the analysis of a rovibrational spectrum of trimethylene sulfide collected with the FTIR instrument coupled to the far-IR beamline of the Canadian Light Source.¹³

Figure 1 shows the spectrum of SOCl_2 between 420 cm^{-1} and 550 cm^{-1} measured in this work at $P = 900 \mu\text{bars}$ using the AILES beamline at SOLEIL.¹⁴ It consists of the ν_2 and ν_5 bands of SOCl_2 and the ν_2 band of SO_2 . The two bands have been analyzed for the two most abundant isotopologues $^{32}\text{S}^{16}\text{O}^{35}\text{Cl}_2$ and $^{32}\text{S}^{16}\text{O}^{35}\text{Cl}^{37}\text{Cl}$, referred to as [35, 35] and [35, 37] in the following, despite the strong overlap with the ν_2 band of SO_2 . Each spectroscopic analysis requires an interplay between a global optimization, where the rotational constants and band center of the excited states for the two considered isotopologues are fitted, and a refinement of all the spectroscopic parameters via a line-by-line analysis using Loomis-Wood diagrams.¹⁵

In the following, Sec. II discusses the experimental setup that was used to record the far-IR spectrum. Section III presents the analyses that were performed on the ν_2 and ν_5 bands of the [35, 35] and [35, 37] isotopologues. This work also allowed a deeper investigation of the submillimeter/THz spectrum of Ref. 4. The pure rotational spectra of SOCl_2 in the $\nu_2 = 1$, $\nu_4 = 1$, and $\nu_5 = 1$ vibrational states are described in Sec. IV. Section V deals with a global fit of thionyl chloride, where both previous data^{4,7,16–20} and the new assignments introduced in the present paper have been included. Section VI compares




FIG. 1. Black: Experimental spectrum of SOCl_2 . Red: Simulated spectrum of the ν_2 band of the SO_2 molecule. Calculated spectra of the ν_2 and ν_5 bands of the [35, 35] isotopologue (blue) and [35, 37] isotopologue (pink).

^{a)}Electronic mail: arnaud.cuisset@univ-littoral.fr

the results obtained from the procedure based on evolutionary algorithms with CCSD(T) *ab initio* calculations.

II. EXPERIMENT

The far-IR FT spectrum of thionyl chloride was collected on the AILES beamline of the SOLEIL synchrotron facility.¹⁴ We chose an experimental configuration used previously for the high-resolution study of the ν_6 and ν_3 bands.^{4,7} The synchrotron radiation was extracted and focused onto the entrance aperture of the Bruker IFS 125 FT interferometer equipped with a 6 μm mylar-silicon composite beamsplitter suitable for the THz/far-IR spectral range. The total absorption path length is greatly increased by using a White-type multipass cell adjusted to a 150 m optical path length and isolated from the interferometer by 50 μm -thick polypropylene windows. A helium-cooled silicon bolometer equipped with an optical band-pass filter in the range 10–700 cm^{-1} has been used to record the absorption spectrum. In the 420 cm^{-1} –550 cm^{-1} region, the synchrotron source provides a gain in the signal-to-noise ratio of 3 to 3.5 in comparison with a classical IR source (Hg lamp).¹⁴ The acquisition time is therefore reduced by one order of magnitude. The present spectrum was recorded in 8 hours at 293 K by co-adding 100 interferograms recorded at the maximum resolution of the instrument ($R = 0.00102 \text{ cm}^{-1}$). The far-IR vibrational linewidths are mainly limited by the apparatus function of the interferometer measured by Jacquemart *et al.*²¹ to be approximately 100 MHz (FWHM). At 293 K, the far-IR Doppler linewidth never exceeds 20 MHz (FWHM).

The interferometer was continuously evacuated to 10^{-3} Pa limiting the absorption of atmospheric water. SOCl_2 , of stated purity higher than 97% from Sigma-Aldrich,²² was used without further purification. Its equilibrium vapor pressure at room temperature was injected directly into the absorption cell. The very efficient hydrolysis of SOCl_2 with gas traces of water produced a strong SO_2 band in the spectral region recorded. This band corresponds to the ν_2 bending mode centered at 513.539 cm^{-1} of the SO_2 molecule.²³ Its P branch is largely mixed with the ν_2 band of the SOCl_2 molecule centered at 500.094 cm^{-1} (SCl symmetric stretching mode) and with the R branch of the ν_5 band centered at 459.821 cm^{-1} (CISCl asymmetric stretching mode). To reduce the gas traces of water and thus to reduce the presence of the SO_2 band, the cell was carefully pumped out before the experiment. The spectrum in Fig. 1 was calibrated using residual water absorption lines whose wavenumbers were taken from Refs. 24 and 25. The experimental error was estimated at 0.000 15 cm^{-1} taking into account the average $\bar{\nu}_{\text{obs}} - \bar{\nu}_{\text{ref}}$ from the calibration with water lines.

III. ANALYSIS OF THE ν_2 AND ν_5 ROVIBRATIONAL BANDS OF SOCl_2

A. Evolutionary algorithms

The painful study of high-resolution congested spectra has recently been alleviated with the use of EAs in spectroscopy.¹⁰ The traditional assignment problem, which requires a time-consuming line-by-line analysis, is replaced by an algorithm

maximizing the overlap between the simulated and experimental spectra. The frequency and intensity information of each spectrum is encoded in an n -dimensional vector (with n the number of experimental points). A fitness function F is introduced,⁸ which is the normalized scalar product between the vectors \mathbf{f} and \mathbf{g} , representing, respectively, the experimental and calculated spectra. The scalar product is weighted by a symmetric matrix W , see Eq. (1). The matrix W permits more flexibility in the comparison between the calculated and experimental spectra. Additional details can be found in the Ref. 8,

$$F(\mathbf{f}, \mathbf{g}) = \frac{\mathbf{f}^T W \mathbf{g}}{\sqrt{\mathbf{f}^T W \mathbf{f}} \sqrt{\mathbf{g}^T W \mathbf{g}}}. \quad (1)$$

Section II.C. of Ref. 10 discussed the choice of the fitness function and concluded that Eq. (1) was more suitable than a sum of square differences because spectra with nearly identical sets of parameters could be more easily distinguished with the former function. Maximizing the agreement between the experimental and calculated spectra translates to maximizing the fitness function. The best set of parameters is given by the global maximum of the fitness function. Among the techniques of global optimization, we chose EAs which are global optimizers based on concepts copied from the theory of evolution. Each spectroscopic parameter is represented as a gene, and a set of spectroscopic parameters (i.e., the rotational constants, the band centers, and the centrifugal distortion parameters) constitutes a chromosome. From each chromosome, one can compute a theoretical spectrum \mathbf{g} . In a first step, the parameters are randomly generated in a range of chosen values. Second, the parameters are adjusted in the evolution phase using concepts derived from genetics such as inheritance, mutation, and crossover. For a given generation, the fitness function is computed for all the chromosomes and only the chromosomes giving the best results are kept in the next generation (selection). New chromosomes are built from the previous ones by mutating and crossing the values of their genes (spectroscopic parameters).

The global optimization is performed via the covariance matrix adaptation evolutionary strategy (CMA-ES),^{26,27} which is an improved sibling of the genetic algorithms. The basic genetic algorithms are inefficient because they sample the parameter space randomly. The efficiency of the CMA-ES method is that it uses the information given by the evaluation of the fitness function for the chromosomes to move faster in the directions where the fitness function increases. The main advantage of the EA procedure over a more traditional fitting by, for example, the Levenberg-Marquardt (LM) algorithm is the fact that the EA performs a global search over the parameter space. Even until convergence is reached the EA will still consider the full parameter space. The needed computing time is fully determined by the number of calls to the model to calculate the spectrum, and this is comparable for the EA and the LM algorithms.

The two ν_5 and ν_2 bands of the spectrum in Fig. 1 were analyzed by means of the EA program^{9,10,28} by considering the two most abundant isotopologues, [35, 35] (natural abundance: 54.45%) and [35, 37] (34.82%).

B. Analysis of the ν_5 band

1. Band center and rotational constants of the [35, 35] isotopologue

Initially, the spectra were prepared for application of the EA program by removing portions of the spectrum around frequency ranges containing H_2O lines^{24,25} and the very congested Q branches. To better see the local features of the spectrum, a smoothed background was computed from the experimental spectrum by locally averaging over the neighbouring frequencies, and this background was subtracted to both experimental and simulated spectra. The experimental transitions of the ν_5 band were fitted using an effective Hamiltonian of Watson (type A, representation I') suited for an asymmetric rotor. The band center and the rotational constants of the $\nu_5 = 1$ excited state of both isotopologues were then optimized by using the EA program up to $J = 75$. The experimental ground state parameters were taken from previous microwave/far-IR analysis⁴ and kept fixed. The distortion parameters of the $\nu_5 = 1$ state were kept fixed at the values of the ground vibrational state.

Each of the parameters to be fitted via an evolutionary algorithm must be given a range within which the experimental value is supposed to be found. In particular, a rather good estimation of the rotational constants for the excited vibrational states of [35, 35] is obtained by scaling the ground state experimental constants $[A, B, C]_{\text{exp}}^{G.S.}$ of [35, 35] with the $\mathcal{F}_{\text{scaling}}^{ab \text{ initio}}$ factor, ratio of the *ab initio* rotational constants of the ground and excited states,⁷ see Eq. (2). The *ab initio* calculated values were computed at the MP2 level with a 6-311++G(3df,3pd) basis.⁷ The Møller-Plesset (MP) second-order perturbed method with such a basis set provides a good compromise between accuracy and computation costs for the theoretical determination of rotational constants, and harmonic and anharmonic frequencies for medium size molecules,

$$[A, B, C]_{\text{est.}}^{(v)} = [A, B, C]_{\text{exp.}}^{G.S.} \times \mathcal{F}_{\text{scaling}}^{ab \text{ initio}} \quad \text{with} \quad \mathcal{F}_{\text{scaling}}^{ab \text{ initio}} = \frac{[A, B, C]_{\text{ab initio}}^{(v)}([35, 35])}{[A, B, C]_{\text{ab initio}}^{G.S.}([35, 35])}. \quad (2)$$

Since the spectra of [35, 37] are only 64% of the strength of the [35, 35] spectra, it was necessary to include the [35, 37] spectrum in the EA and to release the corresponding parameters along with those of the [35, 35]. A first guess of the rotational constants for the excited vibrational states of [35, 37] was obtained by scaling the ground state experimental constants $[A, B, C]_{\text{exp.}}^{G.S.}$ of [35, 37] with the same $\mathcal{F}_{\text{scaling}}^{ab \text{ initio}}$ factor as used for [35, 35], see Eq. (2).

At the first generation, the EA procedure randomly selects the parameters in the range given as input. These ranges were centered on the estimated values $[A, B, C]_{\text{est.}}^{(v)}$ of [35, 35] and [35, 37], and the full widths were empirically found (60 MHz for A, 30 MHz for B and C). As it was more difficult to find a good range for the band center, we have cut a large frequency interval around the Q branch (3 cm^{-1}) into smaller chunks (0.3 cm^{-1}) and performed a global optimization on each chunk. A good determination of the rotational constants and band center was obtained for [35, 35] after 5 h of calculation.²⁹ The correctness of the parameters in the

chromosome associated with the best fitness function was established by an eye comparison between the calculated spectrum derived from these parameters and the experimental spectrum.

Some trials to fit directly via a global optimization the complete effective Hamiltonian, i.e., with optimizing the distortion terms too, have been attempted but did not converge towards a satisfactory set of parameters. This can be explained by several factors: a congested spectrum due to the two isotopologues, and the complicated landscape of the fitness function due to the multidimensional space and the large number of local maxima.

2. Subsequent standard spectroscopic analysis of the [35, 35] isotopologue

The parameters associated with the excited $\nu_5 = 1$ state of the [35, 35] isotopologue were released (i.e., the band center and rotational constants as in the EA procedure but quartic and sextic centrifugal distortion terms as well) and the transitions were fitted by a traditional line by line analysis using the SPFIT/SPCAT suite of programs³⁰ with the help of Loomis-Wood diagrams.¹⁵ These diagrams facilitate the visual identification of individual spectral branches in complicated spectra with overlapping bands and/or high density of lines. In a given branch, only the J quantum number changes by 1 along the series. The K_a and K_c values of the lower and upper states are fixed as determined by the selection rules. A Loomis-Wood diagram is obtained by cutting the spectrum in the neighborhood of the calculated transitions and pasting them one above the others for each J'' value of the branch. Consequently, the differences between the experimental transition frequencies with the calculated transition frequencies are represented horizontally for each J'' value of the branch. Ideally, a good assignment of the lines leads to symbols representing the experimental lines aligned vertically in the center of the Loomis-Wood diagram.

Examples of Loomis-Wood diagrams generated with the LWWa software^{15,31} are given in Fig. 2, representing the evolution at each step of the analysis. Figures 2(a) and 2(b) show the Loomis-Wood diagrams for, respectively, the $^4P(3)$ and $^4R(3)$ branches with the estimated rotational constants from Eq. (2). Many series are distinguishable, but the good assignment, identified by the magenta and orange colours, respectively, is not obvious. Figures 2(c) and 2(d) give the diagram after the global optimization step using the EA program. The agreement is visible between the calculated and experimental transitions, but for high values of J'' , the deviation of the peaks with respect to the centered vertical line calls for an improvement in the centrifugal distortion constants. Figures 2(e) and 2(f) are the diagrams with the final spectroscopic constants and demonstrate the importance of the refinement of the centrifugal distortion terms in the line by line analysis.

The standard spectroscopic analysis gives a definite set of experimental spectroscopic parameters for the main isotopologue, see Table I. We determined the centrifugal distortion constants up to the sextic order in power of J . The IR unitless standard deviation of 0.645 indicates that the experimental error of 0.000 15 cm^{-1} is slightly overestimated. The fitted molecular parameters reproduce nicely the ν_5 band of [35, 35].




FIG. 2. Loomis-Wood diagrams of ${}^qP(3)$ (left column) and ${}^qR(3)$ (right column) branches for each step of the analysis of the main isotopologue [35, 35] of the ν_5 band. Black triangles correspond to the assigned transitions of [35, 35] and the empty triangles correspond to unassigned transitions. (a) and (b) show the Loomis-Wood diagrams with the initial estimated rotational constants [from Eq. (2)] for, respectively, the ${}^qP(3)$ (magenta triangles) and ${}^qR(3)$ (orange triangles) branches. (c) and (d) give the diagrams after the global optimization step. (e) and (f) are the diagrams with the experimental spectroscopic constants after the refinement of the centrifugal distortion terms in the line by line analysis.

The resulting calculated spectrum for [35, 35] compared with the experimental ν_5 band is given in Fig. 3. In particular, the patterns in each branch (P , Q , R) are reproduced.

The relative accuracy of the predicted band centers and rotational constants has been quantified using a δ parameter defined by

$$\delta = \frac{|\text{experimental} - \text{calculated}|}{\text{experimental}}$$

The relative accuracy values follow each step of the analysis: estimated value from Eq. (2), refined value from Eq. (3), observed (from the maximal intensity of the Q branch in the experimental spectrum), and EA.

The relative accuracy of the predictions for the band centers and rotational constants has been estimated at each step of the analysis, and their evolutions are shown in Figs. 4(a) and 4(c), respectively. For the rotational constants, the EAs achieved a relative accuracy better than 10^{-4} while initial ab *initio* values at the MP2/6-311++G(3df,3pd) level of theory were close to 1%. The efficiency of EAs is also remarkable for the estimation of the rovibrational band centers with a reduction by 3 orders of magnitude compared to the initial *ab initio*

TABLE I. Summary of the fitted parameters in the far-IR analysis of the ν_5 band for the two isotopologues [35, 35] and [35, 37]. 1σ uncertainties³² are quoted in parentheses in the unit of the last digit. Below are given the number N of different experimental lines in the fit, maximum values of quantum number J''_{\max} and associated K''_{\max} value, and the standard deviation. The unitless standard deviation of a set of N calculated frequency transitions f''_{calc} , compared to a set of experimental frequency transitions f''_{obs} , measured with

experimental errors Δ_i is defined as $\sqrt{\frac{1}{N} \sum_i \left(\frac{f''_{\text{obs}} - f''_{\text{calc}}}{\Delta_i} \right)^2}$. All parameters (except band centers and standard deviation) are given in MHz.

	ν_5	
	[35, 35]	[35, 37]
ν	13 785 076.733(166)	13 732 558.918(193)
ν (cm^{-1})	459.820 664 8(55)	458.068 859 0(64)
A	5 072.604 85(149)	5 030.389 9(107)
B	2 809.808 63(48)	2 736.642 41(225)
C	1 952.108 147(177)	1 910.689 111(106)
$D_J \times 10^3$	1.107 866(125)	1.113 10(116)
$D_{JK} \times 10^3$	-2.274 28(99)	-4.503(41)
$D_K \times 10^3$	7.049 2(32)	13.481(116)
$\delta_J \times 10^3$	0.392 099(67)	0.399 37(58)
$\delta_K \times 10^3$	1.376 09(52)	0.454 9(162)
$\Phi_J \times 10^9$	0.329 8(188)	
$\Phi_{JK} \times 10^6$	0.007 092(153)	
$\Phi_{JKK} \times 10^6$	-0.044 37(74)	
$\Phi_K \times 10^6$	0.054 22(189)	
$\phi_J \times 10^9$	0.203 8(96)	
$\phi_{JK} \times 10^9$	2.927(94)	
$\phi_K \times 10^6$	0.023 14(45)	
N	292 5	153 2
J''_{\max}	114	125
K''_{\max}	37	17
Standard deviation IR (cm^{-1})	0.000 10	0.000 14
Unitless standard deviation IR	0.645	0.938

values: relative accuracy of 3×10^{-6} is reached for the ν_5 band center.

3. Band center and rotational constants of the [35, 37] isotopologue

A second global optimization procedure of the band center and rotational constants was performed for the [35, 37] isotopologue. Here, all the parameters associated with the excited state of the main [35, 35] isotopologue are now frozen to the values obtained at the end of the standard spectroscopic analysis of that species. The guessed rotational constants for [35, 37] are refined by scaling the ground state experimental constants $[A, B, C]_{\text{exp}}^{G.S.}$ of [35, 37] with the $\mathcal{F}_{\text{scaling}}^{\nu_p}$ factor, ratio of the experimental rotational constants of the ground and excited states of [35, 35], see Eq. (3):

$$[A, B, C]_{\text{refined}}^{(v)} [35, 37] = [A, B, C]_{\text{exp}}^{G.S.} [35, 37] \times \mathcal{F}_{\text{scaling}}^{\nu_p} \quad (3)$$

$$\text{with } \mathcal{F}_{\text{scaling}}^{\nu_p} = \frac{[A, B, C]_{\text{exp}}^{(v)}([35, 35])}{[A, B, C]_{\text{exp}}^{G.S.}([35, 35])}$$

The range of the band center for [35, 37] was again found by dividing the range of permitted values around the Q branch (0.8 cm^{-1}) in smaller chunks (0.04 cm^{-1}). We selected the chromosome giving the best fitness among all the chunks and




FIG. 3. (a) Experimental (black) and calculated spectra of ν_5 band for the two most abundant isotopologues [35, 35] (blue) and [35, 37] (pink). The red spectrum is the global synthetic simulated spectrum for the two isotopologues. (b) Part of the P branch. (c) Part of the Q branch for [35, 37]. (d) Part of the Q branch for [35, 35]. (e) Part of the R branch.

checked by visual comparison between the calculated and experimental spectra. A good determination of the rotational constants and band center was obtained for [35, 37] after 10 h of calculation.²⁹ For the same reason as the [35, 35] isotopologue, the distortion parameters of [35, 37] in the vibrational excited state have been kept frozen to the values of the corresponding ground state.

4. Subsequent standard spectroscopic analysis of the [35, 37] isotopologue

The band center and the rotational constants for the $\nu_5 = 1$ state of the [35, 37] isotopologue obtained at the end of the global optimization procedure were once more fitted against the experimental data, and the centrifugal distortion terms are now released as well. The definitive set of experimental spectroscopic parameters are given in Table I. Although we determined the centrifugal distortion constants up to sextic order in power of J for the [35, 35] isotopologue, we determined the centrifugal distortion terms up to the quartic order for the [35, 37] isotopologue because it was not possible to detect rovibrational transitions involving energy levels with sufficiently high K_a values ($K''_{\max} = 17$). The far-IR standard deviation is very close to the experimental error which implies that the spectrum is fitted at the experimental precision, as implied by the unitless RMS of 0.938 very close to 1. The resulting calculated spectrum for [35, 37] compared with the experimental ν_5 band is given in Fig. 3. We note that all the

patterns are reproduced in the simulated spectrum. Almost all the lines of the experimental spectrum are reproduced.

The evolution of the relative accuracy δ of the rovibrational band center and rotational constants can be found in Figs. 4(c) and 4(e). As for the [35, 35] isotopologue, the correspondence between the numerical values obtained after the EAs and the final experimental ones highlights the effectiveness of the EAs.

C. Analysis of the ν_2 band

The procedure to analyze the ν_2 band follows very closely the footsteps of the ν_5 analysis. The experimental spectrum was cleaned by removing the strongest SO_2 lines (simulated from molecular constants fitted in Ref. 23) and several H_2O lines^{24,25} but the weaker transitions of SO_2 were still present and mixed with the SOCl_2 lines. In addition, the congestion and the weak intensity of the rovibrational lines of ν_2 resulted in a more difficult analysis compared to the ν_5 band. As more lines are blended and many lines are close to the noise amplitude, more local maxima in the fitness function hypersurface make the localization of the global maximum tricky. Moreover, by removing parts of the spectrum containing strong SO_2 lines, many overlapped SOCl_2 lines have also been removed. For these reasons, the initial ranges of the rotational constants were chosen narrower than for the ν_5 band (18 MHz for A , B and C), and the experimental transitions were fitted to the asymmetric rotor Hamiltonian up to $J = 80$. For [35, 35] and [35, 37], the Q




FIG. 4. Evolution in the log scale of the relative accuracy $\delta = |\text{experimental} - \text{calculated}| / \text{experimental}$ at each step of the analysis: *ab initio* calculation [at the MP2/6-311++G(3df,3pd) level of theory], estimated value from Eq. (2), refined value from Eq. (3), observed (from the maximal intensity of the Q branch in the experimental spectrum), and EA. δ is calculated for each EA optimized parameter: A, B, C rotational constants and rovibrational band centers. (a) The rotational constants of [35, 35] of $v_2 = 1$, (b) the rotational constants of [35, 35] of $v_2 = 1$, (c) the rotational constants of [35, 37] of $v_2 = 1$, (d) the rotational constants of [35, 37] of $v_2 = 1$, (e) the band center of the two isotopologues of $v_2 = 1$, and (f) the band center of the two isotopologues of $v_2 = 1$.

branches were narrow and the initial range of permitted values for the band center (0.2 cm^{-1}) was not divided in chunks. The calculation time was only 148 and 142 min,²⁹ respectively, for the [35, 35] and [35, 37] isotopologues.

Figure 4 shows the evolution along the spectroscopic analysis of the relative accuracy δ for the rotational constants and rovibrational band centers of the v_2 fundamental band of [35, 35] and [35, 37]. For the rotational constants of [35, 35], the convergence towards the experimental value is nearly monotonic [Fig. 4(b)]. For [35, 37], the rotational constants [see Fig. 4(d)] obtained from the EA were not employed; instead we used the refined parameters $[A, B, C]_{\text{refined}}^{(v_2=1)}$ from Eq. (3). We noticed that the evaluation of the fitness function with the final experimental parameters of [35, 37] is slightly lower than the best value of the fitness function given by the global optimization (search of a global maximum) of the

EA procedure. This problem can be explained by our use of two complementary methods: the line by line spectroscopic analysis of [35, 37] only uses clearly defined lines of this isotopologue while the global optimization uses the experimental spectrum with the possible existence of perturbed lines of the SOCl_2 isotopologues and the SO_2 molecule. In Fig. 4(f), the values of the band centers obtained after the EA step are very close to the experimental ones with relative δ values better than 10^{-4} whereas the relative accuracy of *ab initio* calculations are limited to 1%. It shows that to a very good determination of all the band centers, crucial for good assignments with the Loomis-Wood diagrams. The final set of experimental spectroscopic parameters of [35, 35] and [35, 37] of the v_2 band are summed up in Table II. The far-IR standard deviations are very close to the estimated experimental error. The centrifugal distortion constants were determined up to

TABLE II. Summary of the fitted parameters in the far-IR analysis of the v_2 band. 1σ uncertainties³² are quoted in parentheses in the unit of the last digit. Below are given the number N of different experimental lines in the fit, maximum values of quantum number J''_{max} and associated $K''_{a \text{ max}}$ value, and the standard deviation. See the caption of Table I for the definition of the unitless standard deviation. All parameters (except band centers and standard deviation) are given in MHz.

	v_2	
	[35, 35]	[35, 37]
ν	14 992 447.162(208)	14 940 637.482(298)
ν (cm^{-1})	500.094 207 2(69)	498.366 022 3(100)
A	5 083.311 7(90)	5 042.574 9(238)
B	2 823.404 04(212)	2 749.443 0(58)
C	1 959.369 498(167)	1 917.742 688(230)
$D_J \times 10^3$	1.038 85(79)	0.805 9(38)
$D_{JK} \times 10^3$	1.166 6(144)	2.417(75)
$D_K \times 10^3$	-0.724(52)	2.053(279)
$\delta_j \times 10^3$	0.344 77(40)	0.234 12(192)
$\delta_k \times 10^3$	2.399 6(65)	2.162(35)
N	142 9	854
J''_{max}	87	87
$K''_{a \text{ max}}$	15	12
Standard deviation IR (cm^{-1})	0.000 13	0.000 14
Standard deviation IR unitless	0.856	0.940

quartic order for the two [35, 35] and [35, 37] isotopologues. It was not possible to reach the sextic order constants with an

acceptable uncertainty in the parameters. Compared with the v_5 band, the v_2 band was more congested with less intense lines, and it was not possible to assign transitions with $J > 87$ and $K_a > 15$ (see Tables I and II). The simulated spectra of [35, 35] and [35, 37] are represented in Fig. 5 and compared with the experimental spectrum. The spectra present a good agreement, each pattern can be easily recognized, especially in the Q branches. The experimental v_2 spectrum presents more remaining non-predicted weak lines than for the v_5 band due to SO_2 .

IV. SUBMILLIMETER SPECTRUM ANALYSIS

The new data gathered for the v_2 and v_5 bands allow the prediction of the pure rotational transitions in the $v_2 = 1$ and $v_5 = 1$ vibrational states. The experimental spectrum published in Ref. 4 is a room temperature absorption spectrum of SOCl_2 that has been probed in the submillimeter domain by the radiation generated from a frequency multiplier chain (Virginia Diodes, Inc.). All experimental details concerning the spectrometer and the experimental conditions have been reported previously in Refs. 33 and 4, respectively. The pure rotational transitions have been already assigned for the vibrational ground state of the three most abundant isotopologues [35, 35], [35, 37], and [37, 37] and for the vibrational excited states $v_3 = 1$ and $v_6 = 1$ of [35, 35].^{4,7,16–20} Our paper completes the analysis by proposing an assignment for the pure rotational transitions of




FIG. 5. (a) Experimental (black) and calculated spectra of the v_2 band for the two most abundant isotopologues [35, 35] (blue) and [35, 37] (pink). The red spectrum is the global synthetic simulated spectrum for the two isotopologues. (b) Part of the P branch. (c) Part of the Q branch for [35, 37]. (d) Part of the Q branch for [35, 35]. (e) Part of the R branch. Some parts of the spectrum have been removed for the EA procedure because they contained strong SO_2 and H_2O lines.

TABLE III. Summary of the final fitted parameters in the rotational and rovibrational analyses of [35, 35]. 1σ uncertainties³² are quoted in parentheses in the unit of the last digit. Below are given the number N of different experimental lines in the fit, maximum values of quantum number J_{max}^v , and associated K_a^v max value, and the standard deviation. See the caption of Table I for the definition of the unitless standard deviation. All parameters (except indicated otherwise) are given in MHz.

	ν_4	ν_5	ν_2
ν	[5 810 457.503]	13 785 076.908(114)	14 992 446.403(214)
ν (cm ⁻¹)	[193.816]	459.820 670 6(38)	500.094 181 9(71)
A	5 108.588 988(154)	5 072.603 864(181)	5 083.209 84(39)
B	2 814.471 870(78)	2 809.806 675(142)	2 823.426 43(32)
C	1 952.767 488(93)	1 952.107 746(127)	1 959.372 070(226)
$D_J \times 10^3$	1.117 762 7(148)	1.107 538 0(296)	1.060 820(66)
$D_{JK} \times 10^3$	-2.218 849(64)	-2.278 275(118)	0.928 374(224)
$D_K \times 10^3$	7.152 212(149)	7.059 216(126)	-0.843 020(307)
$\delta_J \times 10^3$	0.394 297 8(66)	0.391 992 2(143)	0.355 380(33)
$\delta_K \times 10^3$	1.314 005(64)	1.376 396(130)	2.361 660(301)
$\Phi_J \times 10^9$	0.400 72(99)	0.285 76(234)	8.088 6(59)
$\Phi_{JK} \times 10^6$	0.006 384 2(104)	0.007 452 1(271)	-0.100 477(65)
$\Phi_{JKK} \times 10^6$	-0.044 976 8(287)	-0.048 894(79)	-0.045 991(191)
$\Phi_K \times 10^6$	0.064 268(61)	0.064 684(57)	0.016 573(138)
$\phi_J \times 10^9$	0.221 27(50)	0.185 48(123)	4.019 00(312)
$\phi_{JK} \times 10^9$	1.404 6(79)	3.257 1(195)	-18.391(50)
$\phi_K \times 10^6$	0.019 180 3(304)	0.023 082(92)	-0.044 366(220)
$L_K \times 10^{12}$	-0.239 9(70)		
N	5 172	5 442	2 091
J_{max}^v	106	114	90
K_a^v max	64	60	60
Standard deviation MW (MHz)	0.091 316	0.136 071	0.168 047
Standard deviation IR (cm ⁻¹)		0.000 10	0.000 13
Unitless standard deviation	0.913 16	0.954 80	1.089 82

the $\nu_2 = 1$, $\nu_5 = 1$ and $\nu_4 = 1$ vibrational excited states of the [35, 35] isotopologue. The ν_4 vibrational band is not IR-active; the $\nu_4 = 1$ state could only be analyzed in the submillimeter domain from pure rotational transitions induced by the permanent dipole moment and involving thermally populated levels in $\nu_4 = 1$. The analysis was performed with the AABS package from Kisiel^{34,35} in parallel with SPFIT/SPCAT.³⁰ The rotational spectroscopic parameters together with a summary of the study for the $\nu_5 = 1$, $\nu_2 = 1$, and $\nu_4 = 1$ are given in Table III. Each contribution in the experimental spectrum is shown in Fig. 6(a). The comparison between experimental and calculated spectra is shown in Fig. 6(b) for two frequency ranges: 255-295 GHz (left) and 273.5-274.5 GHz (right). The $\nu_5 = 1$ and $\nu_2 = 1$ states are significantly higher in energy compared to $\nu_4 = 1$ and thus present weaker lines in the submillimeter domain. New rotational transitions have been assigned: 5172, 2517, and 662 lines for $\nu_4 = 1$, $\nu_5 = 1$, and $\nu_2 = 1$, respectively. Some of them are marked with triangles in the stick spectrum [Fig. 6(b)]. This analysis has permitted us to probe transitions with higher J and K_a values, thus improving the parameters obtained from the rovibrational analysis of $\nu_5 = 1$ and $\nu_2 = 1$ of [35, 35] (see Tables I and II). The far-IR standard deviations obtained in the rovibrational study were not deteriorated for the $\nu_5 = 1$ and $\nu_2 = 1$ states: for each of the states $\nu_5 = 1$, $\nu_2 = 1$, and $\nu_4 = 1$, the standard deviation from pure rotational lines ("standard deviation MW," see Table III) is in the range of the experimental error of 100 kHz, which is

reflected by the dimensionless standard deviation very close to 1.

Because the Cl-S-Cl scissoring mode is barely far-IR active, no band center has been experimentally determined for $\nu_4 = 1$. Nevertheless, the submillimeter analysis of the pure rotation in the ν_4 excited state gave access to the rotational constants with a degree of precision similar to the other bands. Indeed, the ν_4 state is the lowest-energy vibrational mode of SOCl₂ with an estimated anharmonic frequency of 193.816 cm⁻¹ at the MP2/6-311++G(3df,3pd) level of theory, and the intensity of the rotational lines is comparable to the ground state lines of the intensity of the [37, 37] isotopologue (see Fig. 6). Unlike the submillimeter assignments of vibrational satellites from the $\nu_6 = 1$ and $\nu_3 = 1$ states where the distortion constants were limited to sextic order, the octic order L_K term has been fitted for $\nu_4 = 1$. Finally, due to the weakness of the line intensities, it was not possible to assign rotational transitions in the vibrationally excited states for the less abundant isotopologues.

V. GLOBAL FIT FOR THE THIONYL CHLORIDE

A global fit for each isotopologue was performed that include the assignments of the previous analyses^{4,7,16-20} and the new data measured in the present study. Table IV sums up the origin of the different data. The global fits include 38 910 and 15 258 experimental lines, with 104 and 54 fitted




FIG. 6. (a) Experimental submillimeter spectrum of thionyl chloride (in black) and all the experimental individual contributions considered in the analysis. Note that the experimental output power varies with the multiplication stages [140-220 GHz ($\times 18$), 220-330 GHz ($\times 27$), 330-440 GHz ($\times 36$), 440-660 GHz ($\times 54$)]. (b) Comparison between the experimental spectrum (in black), the global synthetic simulation (in red), and the stick spectrum of the individual contributions [the colour of each contribution agrees with panel (a)]. The triangles on the 273.5-274.5 GHz stick spectrum mark the rotational lines newly assigned in this study.

parameters, respectively, for [35, 35] and [35, 37]. The parameters obtained from this fit can be found in Table V.

The combination of the different assignments in the global fit does not deteriorate the standard deviation of the fit and the accuracies of the fitted parameters compared to individual band analyses. In Fig. 7, the rovibrational energy levels from [35, 35] have been calculated up to $J = 80$ from the parameters of the five lowest energy fundamental vibrational bands (see Table V). The vibrational centers of two combination bands $\nu_4 + \nu_6$ and $2\nu_4$ calculated at the anharmonic MP2/6-311++G(3df,3pd) level of theory are indicated. For the fundamental bands, the solid lines represent the energy of the

relative equilibria, i.e., the energy of the classical stationary axes of rotation.³⁶⁻³⁸ Figure 7 shows that an overlap between the different bands starts to appear for $J > 20$. Nevertheless, all the experimental transitions could be fitted without consideration of any effective Coriolis or Fermi interactions between fundamental and combination bands. Indeed, the Loomis-Wood analysis used in the vibrationally excited rotational transition assignments never shows any signature of possible interaction. However, in Table V, we can immediately notice that the quartic and sextic distortion constants for all excited vibrational modes are very close to the ground state values except for the $\nu_2 = 1$ level where several distortion constants are quite different in value. It suggests that the SCl symmetric stretching vibration is more strongly coupled to the rotation compared to the other vibrational modes. The possibility of an interaction with another state could not be totally excluded ($\nu_4 + \nu_6$ is the closest level to ν_2) but we did not find any evidence of this perturbation.

TABLE IV. Origin of the data used in the global fit.

Reference	[35, 35]	[35, 37]
19	G.S. ← G.S.	
20	G.S. ← G.S.	G.S. ← G.S.
17		G.S. ← G.S.
16		G.S. ← G.S.
18	G.S. ← G.S.	
7	$\nu_3 \leftarrow$ G.S., $\nu_6 \leftarrow$ G.S.	
4	G.S. ← G.S., $\nu_3 \leftarrow \nu_3$, $\nu_6 \leftarrow \nu_6$, $\nu_3 \leftarrow$ G.S., $\nu_6 \leftarrow$ G.S.	G.S. ← G.S., $\nu_3 \leftarrow$ G.S., $\nu_6 \leftarrow$ G.S.
This work	$\nu_2 \leftarrow \nu_2$, $\nu_5 \leftarrow \nu_5$, $\nu_4 \leftarrow \nu_4$, $\nu_2 \leftarrow$ G.S., $\nu_5 \leftarrow$ G.S.	$\nu_2 \leftarrow$ G.S., $\nu_5 \leftarrow$ G.S.

VI. PREDICTIVE POWER OF COUPLED-CLUSTER CALCULATIONS

All the *ab initio* calculations presented in this study have been performed at the MP2/6-311++G(3df,3pd) level of theory.

Proposal No. 20141064; we thank Pascale Roy, Olivier Pirali, and the AILES team. The submillimeter work is supported by the French Délégation Générale pour l'Armement (Projet de Recherche Exploratoire et Innovation No. 06.34.037). S.T. acknowledges support by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) through Grant No. SCHL 341/15-1 and the Regional Computing Center of the Universität zu Köln for computing time on the DFG-funded High Performance Computing system CHEOPS.

- ¹T. J. Johnson, R. S. Disselkamp, Y.-F. Su, R. J. Fellows, M. L. Alexander, and C. J. Driver, *J. Phys. Chem. A* **107**, 6183 (2003).
- ²L. A. Corio, T. S. Zioolkowski, J. K. Walker, W. B. Jones, B. William, and T. Belisle, in *Proceedings of the Air and Waste Management Association's Annual Meeting & Exhibition* (A&WMA, 1996), p. 16.
- ³Y. L. Chang and M. S. Strano, *J. Am. Chem. Soc.* **130**, 1766 (2008).
- ⁴M.-A. Martin-Drumel, A. Roucou, G. G. Brown, S. Thorwirth, O. Pirali, G. Mouret, F. Hindle, M. C. McCarthy, and A. Cuisset, *J. Chem. Phys.* **144**, 084305 (2016).
- ⁵A. P. Uthman, P. J. Demlein, T. D. Allston, M. C. Withiam, M. J. McClements, and G. A. Takacs, *J. Phys. Chem.* **82**, 2252 (1978).
- ⁶D. E. Martz and R. T. Lagemann, *J. Chem. Phys.* **22**, 1193 (1954).
- ⁷M.-A. Martin-Drumel, G. Mouret, O. Pirali, and A. Cuisset, *J. Mol. Spectrosc.* **315**, 30 (2015).
- ⁸W. L. Meerts, M. Schmitt, and G. C. Groenenboom, *Can. J. Chem.* **82**, 804 (2004).
- ⁹W. L. Meerts and M. Schmitt, *Int. Rev. Phys. Chem.* **25**, 353 (2006).
- ¹⁰J. A. Hageman, R. Wehrens, R. de Gelder, W. L. Meerts, and L. M. C. Buydens, *J. Chem. Phys.* **113**, 7955 (2000).
- ¹¹J. Wilke, M. Wilke, W. L. Meerts, and M. Schmitt, *J. Chem. Phys.* **144**, 044201 (2016).
- ¹²G. M. P. Just, P. Rupper, T. A. Miller, and W. L. Meerts, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **12**, 4773 (2010).
- ¹³J. van Wijngaarden, D. Desmond, and W. L. Meerts, *J. Mol. Spectrosc.* **315**, 107 (2015).
- ¹⁴J.-B. Brubach, L. Manceron, M. Rouziers, O. Pirali, D. Balcon, F. K. Tchana, V. Boudon, M. Tudorie, T. Huet, A. Cuisset *et al.*, *AIP Conf. Proc.* **1214**, 81–84 (2010).
- ¹⁵F. W. Loomis and R. W. Wood, *Phys. Rev.* **32**, 223 (1928).
- ¹⁶L. Merke and H. Dreizler, *Z. Naturforsch. A* **47**, 1150 (1992).
- ¹⁷A. Dubrulle, D. Boucher, and C. R. Hebd, *Séances Acad. Sci. Sér. B* **274**, 1426 (1972).
- ¹⁸H. S. P. Müller and M. C. L. Gerry, *J. Chem. Soc., Faraday Trans.* **90**, 3473 (1994).
- ¹⁹J. Burie, J.-L. Destombes, A. Dubrulle, G. Journal, and C. R. Hebd, *Séances Acad. Sci. Sér. B* **267**, 48 (1968).
- ²⁰G. Journal, Ph.D. thesis, University of Lille, 1969.
- ²¹D. Jacquemart, L. Gomez, N. Lacombe, J.-Y. Mandin, O. Pirali, and P. Roy, *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer* **111**, 1223 (2010).
- ²²Sigma-Aldrich, Thionyl chloride, reagent grade, 97%, reference 320536, 2016.
- ²³W. J. Lafferty, J.-M. Flaud, R. L. Sams, and E. H. Abib Ngom, *J. Mol. Spectrosc.* **252**, 72 (2008).
- ²⁴V.-M. Horneman, R. Anttila, S. Alanko, and J. Pietilä, *J. Mol. Spectrosc.* **234**, 238 (2005).
- ²⁵F. Matsushima, H. Odashima, T. Iwasaki, S. Tsunekawa, and K. Takagi, *J. Mol. Struct.* **352**, 371 (1995).
- ²⁶N. Hansen and A. Ostermeier, *Evol. Comput.* **9**, 159 (2001).
- ²⁷N. Hansen and S. Kern, "Evaluating the CMA evolution strategy on multimodal test functions," in *Proceedings of Parallel Problem Solving from Nature-PPSN VIII: 8th International Conference, Birmingham, UK, September 18-22, 2004*, Lecture Notes in Computer Science, edited by X. Yao, E. K. Burke, J. A. Lozano, J. Smith, J. J. Merelo-Guervós, J. A. Bullinaria, J. E. Rowe, P. Tiño, A. Kabán, and H.-P. Schwefel (Springer, Berlin, Heidelberg, 2004), Vol. 3242, pp. 282–291.
- ²⁸M. Schmitt and W. L. Meerts, "Rotationally resolved electronic spectroscopy and automatic assignment techniques using evolutionary algorithms," in *Handbook of High-Resolution Spectroscopy* (John Wiley & Sons, Chichester, United Kingdom, 2011), pp. 1345–1371.
- ²⁹We ran the EA program parallel on 20 cores of Intel Xeon E5-2430L processors at 2.4 GHz. The time mentioned is the wall-clock time.
- ³⁰H. M. Pickett, *J. Mol. Spectrosc.* **148**, 371 (1991).
- ³¹W. Lodyga, M. Kreglewski, P. Pracna, and S. Urban, *J. Mol. Spectrosc.* **243**, 182 (2007).
- ³²Documentation for SPFIT and SPCAT, <https://spec.jpl.nasa.gov/ftp/pub/calpgm/spinv.pdf>, section Format of the .par file and .var files, FRAC keyword. See also <http://www.ifpan.edu.pl/~kisiel/asym/pickett/crib.htm#frac>.
- ³³G. Mouret, M. Guinet, A. Cuisset, L. Croizé, S. Eliet, R. Bocquet, and F. Hindle, *IEEE Sens. J.* **13**, 133 (2013).
- ³⁴Z. Kisiel, E. Białkowska-Jaworska, and L. Pszczółkowski, *J. Chem. Phys.* **109**, 10263 (1998).
- ³⁵Z. Kisiel, E. Białkowska-Jaworska, and L. Pszczółkowski, *J. Mol. Spectrosc.* **199**, 5 (2000).
- ³⁶W. G. Harter, *Comput. Phys. Rep.* **8**, 319 (1988).
- ³⁷D. A. Sadovskii and B. I. Zhilinskii, *Mol. Phys.* **65**, 109 (1988).
- ³⁸G. Dhont, D. Sadovskii, B. Zhilinskii, and V. Boudon, *J. Mol. Spectrosc.* **201**, 95 (2000).
- ³⁹K. Raghavachari, G. W. Trucks, J. A. Pople, and M. Head-Gordon, *Chem. Phys. Lett.* **157**, 479 (1989).
- ⁴⁰CFOUR, Coupled-Cluster techniques for Computational Chemistry, a quantum-chemical program package by J. F. Stanton, J. Gauss, M. E. Harding, and P. G. Szalay with contributions from A. A. Auer, R. J. Bartlett, U. Benedikt, C. Berger, D. E. Bernholdt, Y. J. Bomble, L. Cheng, O. Christiansen, F. Engel, R. Faber, M. Heckert, O. Heun, C. Huber, T.-C. Jagau, D. Jonsson, J. Juselius, K. Klein, W. J. Lauderdale, F. Lipparini, D. A. Matthews, T. Metzroth, L. A. Mck, D. P. O'Neill, D. R. Price, E. Prochnow, C. Puzzarini, K. Ruud, F. Schiffmann, W. Schwalbach, C. Simmons, S. Stopkowitz, A. Tajti, J. Vázquez, F. Wang, and J. D. Watts and the integral packages MOLECULE (J. Almlöf and P. R. Taylor), PROPS (P. R. Taylor), ABACUS (T. Helgaker, H. J. A. Jensen, P. Jørgensen, and J. Olsen), and ECP routines by A. V. Mitin and C. van Wllén. For the current version, see <http://www.cfour.de>.
- ⁴¹C. Puzzarini, J. F. Stanton, and J. Gauss, *Int. Rev. Phys. Chem.* **29**, 273 (2010).

Towards the Detection of Explosive Taggants: Microwave and Millimetre-Wave Gas-Phase Spectroscopies of 3-Nitrotoluene

Anthony Roucou,^{*[a]} Isabelle Kleiner,^[b] Manuel Goubet,^[c] Sabath Bteich,^[c] Gael Mouret,^[a] Robin Bocquet,^[a] Francis Hindle,^[a] W. Leo Meerts,^[d] and Arnaud Cuisset^{*[a]}

The monitoring of gas-phase mononitrotoluenes is crucial for defence, civil security and environmental interests because they are used as taggant for TNT detection and in the manufacturing of industrial compounds such as dyestuffs. In this study, we have succeeded to measure and analyse at high-resolution a room temperature rotationally resolved millimetre-wave spectrum of *meta*-nitrotoluene (3-NT). Experimental and theoretical difficulties have been overcome, in particular, those related to the low vapour pressure of 3-NT and to the presence of a CH₃ internal rotation in an almost free rotation regime ($\nu_3 = 6.7659(24) \text{ cm}^{-1}$). Rotational spectra have been recorded

in the microwave and millimetre-wave ranges using a supersonic jet Fourier Transform microwave spectrometer ($T_{\text{rot}} < 10 \text{ K}$) and a millimetre-wave frequency multiplication chain ($T = 293 \text{ K}$), respectively. Spectral analysis of pure rotation lines in the vibrational ground state and in the first torsional excited state supported by quantum chemistry calculations permits the rotational energy of the molecule, the hyperfine structure due to the ¹⁴N nucleus, and the internal rotation of the methyl group to be characterised. A line list is provided for future *in situ* detection.

1. Introduction

In recent years, intensive research has failed to develop a compact and low-cost explosive vapour sensor with a part per billion limit of detection capable of replacing the trained canine. Although high-resolution rovibrational spectroscopy has proven to be a powerful tool for the detection, identification and quantification of gas-phase molecular species of atmospheric and astrophysical interest, the optical methods employed have encountered the problem of room temperature detection of weakly volatile explosive vapours due to a lack of

sensitivity. Indeed, energetic compounds have very low vapour pressures at room temperature. For example, TNT is one of the most volatile energetic materials, with a vapour pressure of 1.3 mPa at 300 K.^[1] Vapour pressures of most of the other energetic materials such as cyclo-1,3,5-trimethylene-2,4,6-trinitramine (RDX) and pentaerythritol tetranitrate (PETN) are significantly lower by several orders of magnitude. On the basis of this observation, the gas-phase spectroscopic measurement of explosives requires a shift towards the most sensitive methods of detection

In 2004, D. S. Moore published a review dealing with instrumentation for trace detection of explosives.^[2] Several spectroscopic techniques were considered, but each of them presents some specific disadvantages for the unambiguous detection of the explosive vapour: ultrasensitive photothermal deflection,^[3] cavity-ringdown^[4] and photoacoustic^[5] IR methods, probing intense vibrational transitions, could be used to measure the gas-phase signatures of TNT and RDX classical explosives at a sub-ppm level but do not allow the unambiguous discrimination of compounds of the same family and isomers; Raman spectroscopy has been used to detect residual explosives in fingerprint samples^[6] but its ability to detect very small solid samples failed in the gas phase because of a lack of sensitivity; finally, promising results on TNT detection have been obtained in the UV/Visible domain by laser photofragmentation^[7] or single photon ionisation^[8] but these methods did not exclude the possibility of the parent molecule fragmentation.

To somewhat alleviate the low-vapour-pressure problem for the detection of explosives, various taggants are used in many commercially manufactured explosives.^[9] Isomers of mononi-

trotoluene are used as taggant for TNT detection (3-nitrotoluene (3-NT), 0.5%; or 2-nitrotoluene (2-NT), 0.5%). In addition to the defence and civil security interests, monitoring of nitrotoluene compounds is also relevant in industrial environmental topics because they are widely used in the manufacturing of dyestuffs, rubbers, pesticides and drugs,^[10] and they are persistent in natural conditions. With a room temperature vapour pressure of about 10 Pa,^[11] 10⁴ times higher than that of TNT, the gas-phase detection of mononitrotoluenes at trace levels with usual spectroscopic techniques is possible and some new spectral windows at larger wavelengths may be used. For these reasons, studies of new spectroscopic rotational and vibrational signatures of nitro-derivative vapours in the THz domain have been undertaken.

At room temperature, far-infrared (FIR) vibrational gas-phase cross-sections of the three isomeric forms of NT have been measured and assigned at low resolution ($\Delta\nu = 0.5 \text{ cm}^{-1}$).^[12] The results highlight the selectivity of gas-phase THz/FIR spectroscopy allowing an unambiguous identification of nitroaromatic compounds. In this study, rotational patterns have been observed and simulated but it was not possible to resolve the rotational structure of the rovibrational FIR bands. Despite the highest available resolution of the FTIR instrument (10^{-3} cm^{-1}), the density of rovibrational lines is so great that it prevented their individual observation at room temperature. This is probably due to the low value of the rotational constants, hot bands and splitting due to large amplitude motions. Considering that the resolution of the rovibrational structure of FIR fundamental bands at very low temperature is out of reach,^[13] the opportunity to probe pure rotational transitions of explosive taggants in the microwave (MW) and millimetre (mm) wavelength ranges using electronic sources with exceptional spectral purities has been considered. By targeting mononitrotoluene isomers, experimental and theoretical difficulties should be overcome. From an experimental point of view, high-performance instrumentation is required to ensure the sensitivity and selectivity for these molecules. Indeed, high sensitivity is needed to measure weak signals with sufficient signal-to-noise ratio (S/N) at room temperature and high-resolution measurements are essential to resolve the heavily congested spectra.

Concerning the spectroscopic analysis, a specific effective Hamiltonian taking into account large amplitude motion and hyperfine structure was required. Especially, the internal rotation of the methyl group, depending on the barrier height and therefore on the isomeric form, has to be specifically treated. According to this, although rotational spectra of nitrobenzene compounds have been measured and analysed in the early 70s,^[14] no high-resolution rotational studies have been carried out on nitrotoluenes. To date, a limited number of systems containing both almost free internal rotors and a nitrogen atom (quadrupolar nucleus) have been studied by rotational spectroscopy.^[15,16]

To our knowledge, the only attempt to resolve rotationally the gas-phase spectra of an explosive taggant was performed in 2006, by Foltynowicz et al.,^[17] using medium-resolution THz-Time Domain Spectroscopy. This study emphasises the difficulty to measure the gas-phase rotational spectrum of an explo-

sive derivative such as 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT). Indeed, the best results were obtained with a static pressure lower than 0.005 Pa at 150 °C for 4 hours. Only the pure rotation pattern of the 2,4-DNT vapour was observed below 0.5 THz with a relatively poor S/N (< 3). No assignment of individual rotational transitions was performed because of the insufficient resolution and sensitivity. In this study, we present the first high-resolution gas-phase analysis of an explosive taggant of TNT: 3-NT. The geometry of the molecule, in the Principal axis orientation (PAM), optimised at the MP2/cc-pVQZ level of theory is presented in Figure 1. 3-NT is a prolate asymmetric top ($\kappa = -0.75$) belonging to the G₆ Permutation Inversion group (a C_{3v} frame and a C_{3v} top for the methyl group)^[18] with a strong permanent dipole moment ($\mu \approx 5.4 \text{ D}$) in the (a,b) plane (cf. Figure 1).




Figure 1. Geometry of the 3-nitrotoluene in the principal axis orientation optimised at the MP2/cc-pVQZ level of theory.

With the support of high level electronic structure calculations, the jet-cooled MW spectrum was first measured and fitted using the BELGI-C_v-hyperfine code, providing a set of ground-state molecular constants allowing the lowest energy levels (up to $J = 11$) to be determined, taking into account both the coupling between global rotation of 3-NT and the internal rotation of the methyl group as well as the nuclear quadrupole coupling (NQC) due to the ¹⁴N atom. The obtained constants have then been used as initial parameters for analysis of the room-temperature mm-wave spectrum. A global fit has been performed allowing the MW and mm-wave transition frequencies in the vibrational ground state and in the first torsional excited state ($\nu_{\text{tors}} = 0$ and 1, respectively) to be reproduced at the experimental accuracies. NQC constants, internal rotation potential and limitations of the model are specifically discussed.

2. Results and Discussion

2.1. Jet-Cooled MW Spectrum Analysis

The jet-cooled pure rotation spectrum of 3-NT was measured in the 4–20 GHz frequency range using the supersonic jet Fabry–Pérot Fourier-transform microwave (FP-FTMW) spectrometers of the PhLAM Laboratory in Lille (see Section 4.1).^[19,20] Two sets of $J_{K_a, K_c} \rightarrow J'_{K'_a, K'_c}$ rotational transitions (a-

[a] A. Roucou, Prof. G. Mouret, Prof. R. Bocquet, Dr. F. Hindle, Dr. A. Cuisset
Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère (LPCA)
EA 4493, Université du Littoral Côte d'Opale
Maison de la Recherche en Environnement Industriel 2 (MREI2)
189A, Avenue Maurice Schumann
59140 Dunkerque (France)
E-mail: anthony.roucou@univ-littoral.fr
arnaud.cuisset@univ-littoral.fr

[b] Prof. I. Kleiner
Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA)
CNRS UMR 7583, Universités Paris-Est Créteil & Paris Diderot
61 avenue du Général de Gaulle
F-94010 Créteil cedex (France)

[c] Dr. M. Goubet, S. Bteich
Université Lille 1, CNRS
UMR8523-PhLAM-Physique des Lasers Atomes et Molécules
F-59000 Lille (France)

[d] Prof. W. L. Meerts
Radboud University, Institute for Molecules and Materials
Felix Laboratory, Toernooiveld 7c
6525 ED Nijmegen (The Netherlands)

Supporting Information and the ORCID identification number(s) for the author(s) of this article can be found under:
<https://doi.org/10.1002/cphc.201701266>.




Figure 2. Experimental spectrum of ³N-type ($7_{07}-6_{06}$, 50 co-added scans for A and E species) and ²R-type ($8_{08}-7_{17}$, 300 and 1000 co-added scans for A and E species, respectively) MW transitions. The hyperfine structures due to the ¹⁴N quadrupolar nucleus are clearly observed (assignments the format $F \rightarrow F'$).

type and b-type) observed around 11 GHz are displayed in Figure 2. Each multiplet is composed of six signals (the Doppler doublet of the three most intense NQC components). The methyl group of 3-NT undergoes internal rotation and causes all rotational lines to split into A and E components.^[21,22] The height of the internal rotation barrier (V_3) has been estimated as 6.6 cm^{-1} at the MP2/CBS (ZPE corrected) level of theory (see Section 4.3 for details). The internal rotation constant F has been estimated from MP2/cc-pVQZ calculations as 5.4 cm^{-1} , leading to a reduced barrier height $s = \frac{4V_3}{9F} = 0.36$. With such a very low value, huge A-E splittings (from hundreds of MHz up to several GHz) were expected in the FP-FTMW spectrum and the A-E doublets cannot be straightforwardly identified even in the ground torsional state $v_{\text{CH}_3} = 0$. It should be noted that in such a molecule with E levels above the barrier height, the free rotor quantum number m should be used instead of v_{CH_3} as described by Ilyushin et al.^[23,24] with the following connections: $v_{\text{CH}_3} = 0 \text{ A} \rightarrow m=0$, $v_{\text{CH}_3} = 0 \text{ E} \rightarrow m = \pm 1$, $v_{\text{CH}_3} = 1 \text{ A} \rightarrow m = +3$, $v_{\text{CH}_3} = 1 \text{ E} \rightarrow m = \pm 2$. However, v_{CH_3} is used by the model presently implemented in BELGI-C₂-hyperfin, so we decided to keep the use of this quantum number.

In an initial step, using the SPFIT/SPCAT Pickett's programs (Watson-type semi-rigid rotor model in the I' representation of

A reduction Hamiltonian),^[25] the A components were assigned without taking into account the CH₃ internal rotation by performing an effective fit including, however, the ¹⁴N NQC term. Concerning the rotational constants, the fitting process was started using "hybrid" values from quantum chemistry calculations and taking into account the internal rotation correction for the A components using D. R. Herschbach formalism [see Eqs. (6) and (7) in Section 4.3]. Electric dipole moment components and NQC constants calculated at the MP2/cc-pVQZ level of theory have also been used as starting values (see Table S1 with all the calculated parameters used as starting values for the fit).

The BELGI-C₂-hyperfine code was then used, which is a slightly modified version of the BELGI-C₁-hyperfine code allowing for treatment of internal rotation effects with hyperfine structure for molecules with a planar frame.^[16,26] The code uses the "Rho-Axis-method" (RAM) to minimise the torsion-rotation coupling in an effective Hamiltonian.^[27] Like in BELGI-C₁-hyperfine, the present code deals with the effect of the weak NQC using a perturbation approach similar to that used for acetamide,^[15] a Cs molecule with one methyl internal rotor.^[16]

As starting values for the fit using the BELGI-C₂-hyperfine code, we used the calculated "hybrid" rotational constants corrected for A and E species according D. R. Herschbach (see Table 1 and Equation (6) and (7) in Section 4.3) and the calculated dipole moment components in the RAM axis system obtained by a rotation of a and b axes of an angle $\theta_{\text{RAM}} = -19.318^\circ$ calculated from Eq. (9) (see Section 4.3). The NQC hyperfine parameters were taken from the SPFIT simulation and

Table 1. Rotational and torsion-rotation parameters for 3-NT from the BELGI-C₂-hyperfine code converted into the PAM system. The fitted parameters are compared to calculated values (see Section 4.3). All constants refer to the PAM system and statistical uncertainties are given in parentheses as one standard deviation in the last digits.

	Unit	BELGI-C ₂ -hyperfine	Calculated
A	MHz	2662.853(33)	2661.861 ^[a]
B	MHz	982.0909(41)	991.031 ^[a]
C	MHz	721.63029(35)	725.568 ^[a]
V_3	cm^{-1}	6.7659(24)	6.63 ^[b]
V_6	cm^{-1}	0.02333(22)	
ρ	unitless	0.01273920(48)	0.001267 ^[c]
F	cm^{-1}	5.386202(82)	5.4584 ^[c]
θ_{RAM}	deg	-19.18639(74) ^[d]	-19.318 ^[e]
$\Delta(l,a)$	deg	-43.3346(17) ^[f]	-43.248 ^[e]
unitless standard deviation MW:0.942 ^[g] /mm-wave: 0.983 ^[h]			

[a] Calculated rotational constants are $A_{\text{rot}}^{\text{calc}}$, $B_{\text{rot}}^{\text{calc}}$ and $C_{\text{rot}}^{\text{calc}}$, see Section 4.3 for details. [b] Calculated internal rotation barrier V_3 at the MP2/CBS level ZPE corrected. [c] ρ [see Eq. (5)], F [see Eq. (5)], θ_{RAM} [see Eq. (9)] and $\Delta(l,a)$ [see Eq. (10)]. l_a , l_b and l_c are estimated from $A_{\text{rot}}^{\text{calc}}$, $B_{\text{rot}}^{\text{calc}}$ and $C_{\text{rot}}^{\text{calc}}$ constants, and the direction cosines λ_a and λ_b are estimated from the MP2/cc-pVQZ equilibrium structure. [d] The BELGI-C₂-hyperfine value of θ_{RAM} is defined as: $\tan(2\theta_{\text{RAM}}) = \frac{2^*D_{ab}}{B_{\text{rot}} - A_{\text{rot}}}$ with D_{ab} the "Coriolis-like" operator coefficient corresponding to the off-diagonal element of the inertial tensor in RAM system.^[28] [e] The BELGI-C₂-hyperfine value of the angle $\Delta(l,a)$ is obtained from Equation (10) using the fitted constants. [f] Unitless standard deviation of the fit defined as: $\sqrt{\frac{\sum (\frac{\text{residual}}{\Delta})^2}{N}}$ with N the numbers of fitted lines and Δ , the experimental accuracy.

also transformed into the RAM system. Internal rotation parameters V_3 , F and ρ were estimated from the calculated molecular structure at equilibrium (see Section 4.2 and Table S1 with all the calculated parameters used as starting values for the fit). As an intermediate fit including only the microwave data, we used the three rotational constants A, B, C and the five quartic centrifugal distortion constants, the D_{ab} "Coriolis like" operator coefficient, the torsional parameters ρ , V_3 , F and three higher order terms (F_{rot} , d_{abr} , c_2 as defined in Table S2). 105 A and 88 E multiplets corresponding to 300 and 260 hyperfine transitions (mainly the most intense $\Delta F = \Delta J$ transitions) have been fitted, providing a set of determined constants, which allowed the measured MW line frequencies up to $J=11$ and $K_a=6$ to be reproduced within the experimental accuracy: RMS (root-mean-square) deviation of 2.1 kHz.

2.2. Room-Temperature mm-Wave Spectrum Assignment

The room-temperature absorption spectrum of 3-NT has been measured in the mm-wave domain (70–220 GHz) using the mm-wave spectrometer of the LPCA Laboratory in Dunkerque (see Section 4.2). Figure 3 shows a 40 GHz wide part of the spectrum and three 40 MHz wide expansions in the 70–110 GHz frequency region. Compared with the MW spectrum simplified by jet-cooled conditions, the room temperature mm-wave spectrum exhibits a quasi-continuum of lines with a complex mixture of A–E components of pure rotational transi-

tions in ground and vibrationally excited states.^[28,29] The 40 GHz wide part of the mm-wave spectrum shows this quasi-continuum of lines polluted by saturated lines due to FP effects (see Section 4.2). The observed lines are Doppler limited ($\Delta\nu_{\text{Doppler}} \approx 80 \text{ kHz}$ (FWHM)) and artificially broadened by the frequency modulation^[30] that limit the spectral resolution to 100 kHz. In these conditions, most of the measured lines are blended and the ¹⁴N NQC hyperfine structure could not be resolved at high J values.^[31] In the spectral assignment process, molecular parameters extracted from the fit of MW data have been used as initial values to extrapolate, in the 70–220 GHz frequency region, the rotational transitions involving energy levels with $J > 38$. No measurement was performed in the 20–70 GHz range and no transition involving $10 < J < 39$ energy levels were probed.

For the purpose of the present study, two modifications have been made in the BELGI-C₂-hyperfine code: firstly, the code is now able to calculate rotational energy levels up to $J_{\text{max}}=79$ instead of $J_{\text{max}}=30$, allowing 3-NT transitions up to 110 GHz to be assigned; secondly, a treatment of the blended lines as described by Ilyushin et al.^[32] was implemented in the program, allowing the measured transitions to be weighted by taking into account their relative intensities.

Line by line assignments were then performed by comparing the experimental and calculated spectra using the SVIEW and ASCP graphical interfaces from the AABS package.^[33,34] A routine was developed to convert automatically the input and




Figure 3. Experimental mm-wave spectrum is compared to the simulated spectrum obtained from the fit. (a) is the 70–110 GHz experimental spectrum (black). (b) is the global simulated spectrum from $v_{\text{CH}_3} = 0$ and $v_{\text{CH}_3} = 1$ states (orange). Some characteristic patterns of 3-NT are presented in (c), (d) and (e): individual contributions of A and E species of $v_{\text{CH}_3} = 0$ (red and blue, respectively) and $v_{\text{CH}_3} = 1$ (pink and green, respectively). All intense saturated spurious patterns in (a) are artefacts due to FP effect (see Section 4.2).

output files of BELGI into Pickett's SPICAT/SPFIT format used in AABS and will be made available to BELGI users.

Despite the complexity of the room temperature mm-wave spectrum, we managed to assign several characteristic features from $v_{\text{CH}_3} = 0$ and $v_{\text{CH}_3} = 1$ even if the A–E splitting are 2 to 5 times larger than those observed in the MW region. The rotational spectrum of the ground state $v_{\text{CH}_3} = 0$ has been analysed up to $J=74$ and $K_a=23$. A total of 1222 transitions (705 A and 517 E species) corresponding to 431 blended lines (258 A and 173 E species) are fitted with a RMS deviation of 95.3 kHz corresponding to the experimental accuracy calculated for measured lines with a S/N ratio < 13 .^[33] The RMS deviation of MW data is slightly improved to 1.9 kHz. In addition, the BELGI-C₂-hyperfine code allowed a global fit of the A and E species corresponding to all the torsional levels (ground and torsionally excited states). Therefore, we also assigned rotational lines from the $v_{\text{CH}_3} = 1$ torsional state up to $J=74$ and $K_a=9$. A total of 300 transitions in the $v_{\text{CH}_3} = 1$ state (181 A and 119 E species) corresponding to 100 blended lines (50 A and 50 E species) were fitted, resulting in a global fit with a RMS deviation of 98.3 kHz.

The main parameters of the global fit allowing to reproduce the $v_{\text{CH}_3} = 0$ and $v_{\text{CH}_3} = 1$ mm-wave spectrum, presented in Table 1 in the PAM system. The fitted dataset contains all the transitions of $v_{\text{CH}_3} = 0$ state measured in the MW and mm-wave regions as well as the $v_{\text{CH}_3} = 1$ state rotational transitions in the mm-wave region. The complete set of parameters in the RAM system, allowing a room-temperature line list for 3-NT to be built, is presented in Supporting Information (see Table S2).

One should note that BELGI-C₂-hyperfine uses only one set of rotational parameters to describe the two torsional states. The result of the global fit including all the assigned transitions is also included in the Supporting Information (see Table S3 and S4 for MW and mm-wave transitions, respectively). In Table 1 the fitted parameters are also compared with the calculated parameters (see Section 4.3). The sixfold V_6 barrier parameter can be determined experimentally because of inclusion of the mm-wave lines in $v_{\text{CH}_3} = 1$. For all the parameters derived from the global fit, the agreement with MP2 calculations is excellent. The quality of the global fit is attested by the unitless standard deviations very close to 1 for both MW and mm-wave data. Numbers of transitions, maximum values of quantum number $J_{\text{max}}^{\text{rot}}$ and associated $K_{\text{v,max}}^{\text{rot}}$ and individual standard deviations (RMS) of $v_{\text{CH}_3} = 0$ and $v_{\text{CH}_3} = 1$ states for A and E species are presented in Table 2; all of the RMS are very close to the experimental accuracy of the MW and mm-wave spectra (2 kHz and 100 kHz, respectively, see Sections 4.1 and 4.2).

As shown in Figure 3c–e, the most intense lines from $v_{\text{CH}_3} = 0$ and $v_{\text{CH}_3} = 1$ states are efficiently reproduced but numerous weaker lines are not reproduced. These remaining lines correspond to rotational transitions involving low-energy levels populated at room temperature of CH₃ and NO₂ torsional states or other low-energy modes measured and computed by Cuisset et al. in Ref. [12]. Table 3 summarises the vibrational wavenumbers of the torsional states for the fundamental and the first overtone calculated with the BELGI-C₂-hyperfine code (for CH₃ torsion) and with quantum chemistry harmonic frequency calculations at the MP2/cc-pVQZ and B98/cc-pVQZ

levels of theory. For such low-frequency, large-amplitude modes, calculations using the VPT2 method usually fail to provide reliable anharmonic frequencies.^[36] Nevertheless, by using the BELGI-C₂-hyperfine torsional wavenumbers for $v_{\text{CH}_3} = 1$ and $v_{\text{CH}_3} = 2$, it has been possible to estimate an empirical anharmonic correction (diagonal anharmonicity constant) applied to the calculated harmonic wavenumbers. Harmonic MP2/cc-pVQZ and anharmonic B98/cc-pVQZ are in rather good agreement with the BELGI-C₂-hyperfine vibrational wavenumbers, ensuring the location of excited CH₃ torsional states $v_{\text{CH}_3} = 1$ and $v_{\text{CH}_3} = 2$ around 30 cm⁻¹ and 70 cm⁻¹, respectively. Quantum chemistry calculations also estimate the harmonic wavenumbers of the NO₂ torsional mode calculated by B98 and MP2 methods with the cc-pVQZ basis set (see Table 3). Both $v_{\text{NO}_2} = 1$ and $v_{\text{NO}_2} = 2$ are expected below 100 cm⁻¹ (45 cm⁻¹ for $v_{\text{NO}_2} = 1$ and 90 cm⁻¹ for $v_{\text{NO}_2} = 2$). Most of the remaining unassigned rotational lines in the mm-wave spectrum probably originate from $v_{\text{CH}_3} = 2$ methyl torsion and $v_{\text{NO}_2} = 1, 2$ nitro torsion states. Note that for the NO₂ torsion, no splitting of the line are expected because of a high energy barrier to internal rotation ($V_2 \approx 1700$ cm⁻¹).^[37]

2.3. Nuclear Quadrupole Coupling Constants

The hyperfine structure due to ¹⁴N NQC is clearly observed in the MW spectrum. The two largest diagonal NQC constants χ_{aa} and χ_{cc} were used in the fit to optimise statistical uncertainties, the third diagonal constant χ_{bb} being retrieved from the well-known formula $\chi_{aa} + \chi_{bb} + \chi_{cc} = 0$. NQC constants resulting from the BELGI-C₂-hyperfine global fit were converted from RAM into PAM by rotating the NQC matrix around the z-axis with the angle θ_{RAM} [see Eq. (8) and Eq. (9)]. These BELGI-C₂-hyperfine NQC values are compared to the NQC constants obtained from the initial fit of the A species by using SPFIT in Table 4. The agreement between the two sets of NQC parameters demonstrates that NQC constants are not perturbed by the internal rotation. The off-diagonal χ_{ab} was kept fixed in SPFIT because

only the most intense $\Delta F = \Delta J$ transitions were fitted whereas it was released in BELGI-C₂-hyperfine because of the use of the RAM system rotating the NQC tensor. In Table 4, different sets of calculated NQC constants are also presented. Surprisingly, MP2 and MP2(full) failed in predicting correctly NQC constants, independently from the size of the basis set. However, density functional theory (DFT) methods B2PLYP (recently developed double-hybrid method), B98 (used in this work for calculations of the other molecular parameters) and B3PW91 (suggested by W.C. Bailey, see <http://nqcc.wcbaily.net/> and [38]) provide reliable results with relative uncertainties of a few percent. The NQC tensor χ_{ij} after conversion from RAM into PAM ($ij = a, b, c$), has been diagonalised in the principal axis system of the ¹⁴N nucleus ($ij = x, y, z$) to link the NQC constants to the molecular geometry and to the electronic structure ($\chi_{ij} = eQq_{ij}$ with e the electric charge of the proton, Q the quadrupole moment, and q_{ij} the molecular electric field gradient). This diagonalisation implies the calculation of the α angle between the principal axis α of the molecule and the principal axis z of the nucleus oriented, in a first approximation, along the internuclear axis C–N.^[39,40] The α values, determined both from experimental and calculated NQC parameters, are in good agreement. Finally, the electric field gradient orientation can be evaluated with the asymmetry parameter $\eta = \frac{\chi_{yy} - \chi_{zz}}{\chi_{xx}}$. In Table 4, the experimental and calculated values of η indicate a strong deviation of the electric field gradient from the usually admitted cylindrical symmetry around the z-axis almost coincident with the C–N bond. Indeed, the two experimental η values are very close to 0.45 and the calculated η values are always > 0.5 . This specificity is probably due to the NO₂ functional group characterised with a partial double-bond contribution (unlocalised electron); from the point of view of NQC, the nitrogen in NO₂ behaves as if it is quadruply bonded to a dummy atom (the two oxygen) of lower electronegativity.^[41,42] This should strongly perturb the electronic distribution around the quadrupolar nucleus, which may explain the failure of “localised electrons” methods such as MP2 to predict NQC constants.

Table 2. Number N of different transitions included in the global fit, maximum values of quantum number $J_{\text{max}}^{\text{rot}}$ and associated $K_{\text{v,max}}^{\text{rot}}$ value and standard deviation (RMS) of each state ($v_{\text{CH}_3} = 0, 1$) and symmetry (A and E species).

state	sym	MW				mm-wave			
		$J_{\text{max}}^{\text{rot}}$	$K_{\text{v,max}}^{\text{rot}}$	N^{fit}	RMS [kHz]	$J_{\text{max}}^{\text{rot}}$	$K_{\text{v,max}}^{\text{rot}}$	N^{fit}	RMS [kHz]
$v_{\text{CH}_3} = 0$	A	11	6	300	1.8	74	23	705	93.2
$v_{\text{CH}_3} = 0$	E	11	6	260	2.0	73	20	517	96.5
$v_{\text{CH}_3} = 1$	A					74	8	181	116.1
$v_{\text{CH}_3} = 1$	E					74	9	119	109.7

[a] Number of assigned transitions in the fit.

Table 3. Vibrational wavenumbers of the excited torsional states below 100 cm⁻¹ predicted from BELGI-C₂-hyperfine ($U=K=0$) and from harmonic frequency quantum chemistry calculations at the MP2/cc-pVQZ and B98/cc-pVQZ levels of theory. Upper part: positions of the methyl excited torsional states $v_{\text{CH}_3} = 1$ and $v_{\text{CH}_3} = 2$. Lower part: positions of the nitro excited torsional states $v_{\text{NO}_2} = 1$ and $v_{\text{NO}_2} = 2$.

Unit	BELGI-C ₂ -hyperfine ^[a]		MP2/cc-pVQZ harmonic		B98/cc-pVQZ harmonic		anharmonic ^[b]	
CH ₃ torsion								
$v_{\text{CH}_3} = 1$	cm ⁻¹	27.207	38.380	46.296	16.695	24.611		
$v_{\text{CH}_3} = 2$	cm ⁻¹	70.244	76.761	100.508	33.389	57.138		
NO ₂ torsion								
$v_{\text{NO}_2} = 1$	cm ⁻¹		42.422		48.885			
$v_{\text{NO}_2} = 2$	cm ⁻¹		84.844		97.771			

[a] The tabulated values are calculated from a weighted average between A and E species energies ($E_{v_{\text{CH}_3}} = \frac{1}{2}(E_{v_{\text{CH}_3,A}} + 2E_{v_{\text{CH}_3,E}})$) according to their degeneracy. [b] Anharmonic positions are determined by correcting the calculated harmonic values with empirical anharmonicity constant $\chi_{\text{BELGI}} = \left(\frac{v_{\text{CH}_3}^{\text{obs}} - v_{\text{CH}_3}^{\text{calc}}}{v_{\text{CH}_3}^{\text{calc}}}\right) - (v_{\text{CH}_3} = 1) = 7.916$ cm⁻¹ obtained from BELGI-C₂-hyperfine $v_{\text{CH}_3} = 1$ and $v_{\text{CH}_3} = 2$ positions.

Table 4. Fitted and calculated nuclear quadrupole coupling constants χ_{ij} in the principal axis system ($ij = a, b, c$) with their standard deviations in the last digits, diagonalized χ_{ij} in the principal axis system of the ¹⁴N nucleus ($ij = x, y, z$), asymmetry parameter η and angle α between a and z axes calculated for each set of parameters with their differential uncertainties on the last digit.

Unit		BELGI-C ₂ -hyperfine	SPFIT	B98	B2PLYP(full)	B3PW91	MP2	MP2(full)
		(PAM)	(PAM)	cc-pVQZ	cc-pVTZ	6-311+G(df,pd)	cc-pVQZ	cc-pVTZ
χ_{aa}	MHz	-1.0494(16)	-1.0460(21)	-1.244	-0.9898	-1.1151	-0.664	-0.6287
χ_{bb}	MHz	0.1986(91) ^[a]	0.1947(47) ^[a]	-0.082	0.1360	0.0627	0.6028	0.5419
χ_{cc}	MHz	0.8507(20)	0.8513(26)	1.326	0.8539	1.0523	0.0637	0.0867
χ_{ab}	MHz	(-30.4106(31)) ^[b]	[-0.4247] ^[c]	-0.388	-0.4296	-0.3937	-0.4247	-0.3913
χ_{xx}	MHz	0.3244(102)	0.3261(45)	0.036	0.281	0.182	0.064	0.087
χ_{yy}	MHz	0.8507(20)	0.8513(26)	1.326	0.854	1.052	0.732	0.661
χ_{zz}	MHz	-1.17507(50)	-1.1775(24)	-1.362	-1.135	-1.235	-0.793	-0.747
η^{fit}	unitless	0.4479(106)	0.4461(69)	0.947	0.505	0.704	0.842	0.768
α^{fit}	deg	16.831(263)	17.198(108)	16.868	18.675	16.882	16.921	16.882

[a] Calculated according to $\chi_{aa} + \chi_{bb} + \chi_{cc} = 0$, standard deviation has been indirectly obtained from standard deviation of χ_{aa} and χ_{cc} . [b] Fixed to calculated value in SPFIT but released in BELGI-C₂-hyperfine, see text for details. [c] Asymmetry parameter $\eta = \frac{\chi_{yy} - \chi_{zz}}{\chi_{xx}}$. [d] Angle between the principal axis α of the molecule and the principal axis z of the quadrupolar nucleus from diagonalisation of the χ matrix.

2.4. Internal Rotation Potential

The determination of the internal rotation parameters permits the threefold internal rotation potential of the methyl group to be characterised. The energy levels of the A and E species in the ground state are presented in Figure 4 as a function of J (top x-axis). In the same Figure, the internal rotation potential is also represented as a function of the torsional angle (bottom x-axis). The potential barrier V_3 is very low and the methyl group is in an almost free rotation regime, this extreme limit has allowed the BELGI-C₃-hyperfine model to be tested with success. All the E species rotational energy levels lie above the barrier. For A species, only the $J < 6$ levels have an energy below the barrier. Such a small energy barrier characterised the internal rotation potential of methyl groups for *meta* and *para* isomeric forms of toluene derivatives. Indeed, the barrier to methyl internal rotation is very sensitive to the steric and electronic surroundings of




Figure 4. Threefold internal rotation potential of the methyl group calculated with experimental V_3 and V_6 values, showing three equivalent positions along the torsional angle (bottom x-axis). Energy levels of the A and E species in the ground state are presented in black and red, respectively, up to $J = 10$ (top x-axis).

the top. A more symmetric electron density around the carbon to which the $-\text{CH}_3$ group is attached generally leads to lower barriers to internal rotation.^[43] Therefore, for *ortho* toluene derivatives, the V_3 barrier is significantly bigger, typically several hundreds of wavenumber units (e.g. $\approx 200 \text{ cm}^{-1}$ for 2-toluidine; $\approx 700 \text{ cm}^{-1}$ for 2-tolunitrile).^[44] In Table 5, $V_{3,6}$ barrier parameters determined in *meta* isomeric forms of mono-substituted toluene derivatives are compared to our experimental results on 3-NT. Depending on the molecule, the values of V_3 and V_6 have been fitted from MW rotational measurements^[45–47] or fitted and/or calculated from fluorescence excitation spectra.^[43,44,48] The value of the V_3 barrier of 3-NT is interleaved between that of 3-xylene and 3-toluidine where the quasi free internal rotation is hindered by a methyl and an amino group, respectively. Nevertheless, for such low barriers, the V_3 values are rather close and their level of accuracy and are therefore very important if we want to probe the CH_3

Table 5. Barrier parameters of the internal methyl rotation in <i>meta</i> isomeric form of mono-substituted toluene derivatives.				
Molecule	Substituent	V_3 [cm^{-1}]	V_6 [cm^{-1}]	Experimental Method
toluene	–	–	4.8783617(94)	MW spectroscopy ^[23,45]
<i>m</i> -xylene	$-\text{CH}_3$	4.49(13)	–	FTMW spectroscopy ^[49]
<i>m</i> -nitrotoluene	$-\text{NO}_2$	6.7659(24)	0.02333(22)	this work
<i>m</i> -toluidine	$-\text{NH}_2$	9	–10	fluorescence spectroscopy ^[48]
<i>m</i> -tolunitrile	$-\text{CN}$	13.58(23)	–13.68(560)	rovibronic spectroscopy ^[44]
<i>m</i> -cresol-OD(<i>trans</i>)	$-\text{OD}$	3.188(180)	–	rovibronic spectroscopy ^[45]
<i>m</i> -cresol-OD(<i>cis</i>)	$-\text{OD}$	21.341(52)	–	rovibronic spectroscopy ^[45]
<i>m</i> -fluorotoluene	$-\text{F}$	15.8(1)	7.97(17)	MW spectroscopy ^[47]

group molecular surrounding from the barrier height. With relative accuracies better than 1%, the fitted barrier parameters of 3-NT reach a level of accuracy significantly better than the others. In particular, the small V_6 correction is well determined providing a V_6/V_3 ratio of $(3.45 \pm 0.03) \times 10^{-3}$. This ratio is low and suggests that the electronic distribution around the methyl group is weakly affected by the NO_2 group.

The evolution of the A–E splittings with J and K_a quantum numbers are plotted in Figure 5 for $v_{\text{CH}_3} = 0$ a-type and b-type transitions involving rotational energy levels with $0 < J < 60$ and $0 < K_a < 14$. Quantum number label problems appear for high J and K_a quantum numbers with the BELGI-C₃-hyperfine code when the eigenfunctions are strongly mixed. For each K_a series, the J dependence of the A–E splitting shows some characteristic features with minima and maxima observed in different molecules with CH_3 internal rotation.^[50] These extrema show a linear dependence in J and the A–E splitting varies from hundreds of MHz (a-type transitions) to more than 10 GHz (b-type transitions). We note that the largest splittings are observed for transitions involving low energy levels with $J \approx 4K_a$ both for a-type and b-type transitions.

2.5. Limitations of the Model

In this study, the first limitation was computational: the fit of $v_{\text{CH}_3} = 0$ and $v_{\text{CH}_3} = 1$ was performed for rotational transitions up to $J = 79$ only due to the high computational memory cost required by the BELGI-C₃-hyperfine two-step diagonalisation. Whereas the first diagonalisation of the Hamiltonian is performed on a size-limited matrix (21×21) without any dependence on J , the second diagonalisation (yielding the rotation, centrifugal distortion, and rotation-torsion coupling terms) is performed on a $9(2J+1) \times 9(2J+1)$ dimensional matrix (see Ref. [26] and references therein).

The second limitation of the model occurs for energy levels involving high J and K_a quantum numbers when the wave functions begin to mix with each other, which leads to label




Figure 5. Splittings of the A and E species rotational transitions in the ground state up to $J = 79$ and $K_a = 13$. Different series are presented for R branches: (a) a-type transitions for $K_c = J - K_a + 1$ and $K_c' = J' - K_a' + 1$, (b) a-type transitions for $K_c = J - K_a$ and $K_c' = J' - K_a'$, (c) b-type transitions for $K_c = J - K_a + 1$ and $K_c' = J' - K_a'$, and (d) b-type transitions for $K_c = J - K_a$ and $K_c' = J' - K_a' + 1$. The minimal and maximal splittings show a linearity indicated by red and black slopes, respectively.




Figure 6. Calculated rotational energies in $v_{\text{CH}_3} = 0$ (red linked dots) and $v_{\text{CH}_3} = 1$ (blue linked dots) up to $J = 63$. The reduced energies $E - B^0/J(J+1)$ have been used instead of E for clarity. Black dots belong to the reduced energy levels involved in assigned experimental transitions and labels correspond to K_a values. Three part are presented: (a) MW analysis, (b) mm-wave analysis of $v_{\text{CH}_3} = 0$ and (c) mm-wave analysis of $v_{\text{CH}_3} = 0$ and $v_{\text{CH}_3} = 1$. The A species (bottom graphs) and E species (top graphs) are presented separately.

problems and gives the possibility to local interactions (e.g. avoided crossing) between energy levels.^[51] The Figure 6 illustrates this last point. The calculated reduced rotational energy levels are presented as a function of $J(J+1)$. A and E species have different symmetry and therefore cannot interact with each other, so they are presented separately for clarity. The K_a series have been identified to discuss the limits of assignments and the possible interactions. The labelling is performed according to positive and negative K_a values considered by the BELGI-C_s-hyperfine code. Although J , K_a and K_c are good quantum numbers to describe the A species, it was shown that the meaning of K_c labels of the E species must be based on something other than symmetry properties.^[26] For this reason, a specific label of the rotational energy levels for A and E species has been proposed by I. Kleiner in Ref. [26].

In Figure 6 (bottom part), energy levels of A species are labelled with $J, K_a \pm$ with \pm the "parity" quantum number. If K_a is even, K_a+ and K_a- values correspond to $K_c=J-K_a$ and $K_c=J-K_a+1$, respectively, and vice versa if K_a is odd. In Figure 6 (upper part), the $\pm K_a$ labels of E species are associated with $K_c=J-K_a$ and $K_c=J-K_a+1$ levels with $E_{J-K_a+1} > E_{J-K_a}$.^[18] Three regions of the reduced energy levels have been selected: the first region (a) corresponds to low K_a and J energy levels probed by MW spectroscopy, the second region (b) corresponds to $v_{\text{rot}} = 0$ energy levels probed by mm-wave spectroscopy, and the third region (c) corresponds to higher energy $v_{\text{rot}} = 0$ and $v_{\text{rot}} = 1$ levels mixed with each other. In region (a), low J and low K_a levels are assigned both for A and E species. Most of the levels become doubly degenerated for $J(J+1) > 200$, with a different degeneracy observed for low and high K_a values (lowest energy levels are degenerated with the same K_a values but the highest energy levels are degenerated with the same K_a values for A species). In region (b), the most of represented energy levels are involved in experimental transitions. The presence of unassigned levels is simply due to experimental artefacts (overlapping with intense FP effects; see Section 4.2). All series are doubly degenerated, both for A and E species. For A species, the degenerated levels are levels with the same K_c and different K_a . Finally, in region (c) crossed series are observed between the two states $v_{\text{rot}} = 0$ and $v_{\text{rot}} = 1$ and consequently numerous levels cannot be assigned, highlighting some limitations of the model. For $v_{\text{rot}} = 1$, label problems occur and it was not possible to assign transitions involving energy levels with $K_a > 8$. As pointed out by Ilyushin et al.,^[24] a harmonic oscillator vibrational quantum number v_{rot} is not well defined for levels above the barrier and a free-rotor quantum number m is not well defined for levels below the barrier. Given that, in the present case, we deal with a very low threefold barrier, the free-rotor quantum number m should be more appropriate than v_{rot} in high torsional states.

We can also mention the possible interaction between $v_{\text{rot}} = 1$ and $v_{\text{rot}} = 2$ for A species because their band origins are expected to be very close in energy (0.11 cm⁻¹ predicted from BELGI-C_s-hyperfine by taking into account the characteristics of the barrier). It may be assumed that the unassigned lines can be associated with $v_{\text{rot}} \geq 2$ states or to other low-fre-

quency vibrationally excited modes, such as the NO₂ torsion (v_{rot} mode), which are not studied here (see Section 4.2, Table 3).

3. Conclusions

The challenging high-resolution measurements and analysis of 3-NT, one of the TNT explosive taggants, have been performed for the first time under jet-cooled conditions in the MW region and at room temperature in the mm-wave region, providing a rotational line list that can be used for future gas-phase in situ detection. Both experimental and theoretical difficulties have been overcome: a weak and congested rotational spectrum at room temperature has been measured and energy levels perturbed by a very low internal rotation barrier have been calculated. An internal rotation potential function of the methyl group has been determined from the spectroscopic analysis. A very low barrier has been derived from the $v_{\text{rot}} = 0, 1$ global fit with an excellent accuracy ($V_3 = 6.7659(24)$ cm⁻¹ and $V_6 = 0.00345(3)$). The computational and physical limitations of the model have been discussed. Structural properties of 3-NT have been derived from the spectroscopic analysis of the C-CH₃ and C-NO₂ bond, with both being in the (*a,b*) plane. The resolved hyperfine structure in the MW region allowed the angle between the C-NO₂ bond and the *a*-axis to be determined ($\alpha = 16.66(32)^\circ$). On the other hand, the $\theta = -19.18639(74)^\circ$ angle determined from the RAM into PAM conversion of the rotational parameters permits the angle between the C-CH₃ bond and the *a*-axis to be determined ($\angle(i,a) = -43.3346(17)^\circ$). For 3-NT, a complete rotational line list up to 110 GHz with transition frequency accuracies better than 100 kHz is now available (see Tables S3 and S4 in the Supporting Information) and constitutes a crucial tool for future in situ detection in the gas phase. A similar study for 2-NT and 4-NT is in progress to examine the influence of the isomeric form on the internal rotation potential and to give the opportunity to identify a specific taggant in a mixture of the different isomers as was demonstrated in the far-infrared with vibrational fingerprints.^[28]

4. Experimental and Theoretical Methods

4.1. FP-FTMW Spectroscopy Experiments

In this work, the FP-FTMW technique coupled to a pulsed supersonic jet was used.^[42,46,52] A heated nozzle^[53] allowed the 3-NT vapour to be mixed with the carrier gas (neon) at a backing pressure of about 0.2 MPa. Temperatures ranging from 373 K to 393 K were found to optimise the signal-to-noise ratio (S/N) depending on the amplitude of recorded lines. The mixture was introduced into a FP cavity through a series 9 General Valve pin hole nozzle (0.8 mm) at a repetition rate of 1.5 Hz. Jet-cooled molecules (T_{rot} of a few K) were polarised within the supersonic expansion by a 2 μ s pulse. The free-induction decay (FID) signal was recorded using heterodyne detection at 30 MHz, and was digitised at a repetition rate of 120 MHz on a 14 bit resolution electronic card. FID signals were accumulated between 50 and 1000 times, depending on the line intensity, to obtain the best S/N ratio. After transformation of the average time domain signals, lines of the amplitude spectrum

were observed as Doppler doublets due to the coaxial arrangement of the jet and the Fabry-Pérot cavity. Each resonance frequency was measured as the average frequency of the two Doppler components. The spectral resolution depended on the number of recorded points. The frequency grid was set to 1.8 kHz, which was found to be sufficient because the Doppler linewidths should be of several kHz. According to this value, the experimental accuracy of the MW measured lines was fixed to 2 kHz for the fit.

4.2. Millimeter-Wave Spectroscopy Experiment

The room-temperature absorption spectrum of 3-NT has been measured in the mm-wave domain (70–220 GHz). A continuous flow of 0.8 Pa of the sample, maintained by a roughing pumping, was passed through a 125 cm-long and 56 mm-diameter single path stainless steel absorption cell equipped with Teflon windows and probed by the radiation generated by a frequency multiplier chain (Virginia Diodes, Inc). Two off-axis parabolic mirrors are used to collimate the radiation into the cell and then to refocus it into a liquid-helium-cooled InSb bolometer.^[30] The spectrum has been recorded in 2F frequency modulation by using a frequency modulation of 10 kHz, 40 kHz modulation depth of the frequencies delivered by the synthesiser, a time constant of 200 ms and 100 kHz frequency steps. The very dense and weak spectrum was complicated by the presence of many excited states lines at room temperature and by the congestion of the lines, which are mostly blended.

Moreover, compared with the weak intensity of 3-NT lines, strong peaks are observed in the mm-wave spectrum due to Fabry-Pérot (FP) effects. Two FP effects are observed with two different free spectral ranges (FSR) of 118 MHz and 624 MHz due to stationary waves between the two windows of the cell and between the source and the cell, respectively. The first one has an amplitude and a width around 50 times larger than the molecular intensities and linewidths, respectively. This FP effect is easily removed by using a low pass FFT filter subtracted from the spectrum (see Figure 7). The second FP effect has a width of 1 MHz very close to the molecular linewidth. In this case, it was not possible to remove it with the FFT filter without affecting the shape of the very weak molecular transitions. This FP effect can be seen in the spectrum shown in Figure 3a. The experimental error of measured line frequencies was estimated to about 100 kHz using Equation (2) of

Ref. [35] taking into account the S/N ratio, the frequency step and the molecular linewidth.

Given that the spectrum was very dense and weak, the 99% purity of the Sigma-Aldrich product was verified by using a gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS): negligible traces of 2-NT (0.2%) and 4-NT (0.7%) were identified. After several days of room-light exposition, the liquid-phase 3-NT became browner because of a dimerisation and trimerisation of the product, as revealed by GC-MS and nuclear magnetic resonance (NMR) measurements. The polymerization of the molecule presents no contribution in the rotational spectrum.

4.3. Theoretical Methods

All the calculations were performed using Gaussian 09 (Revision D.01) software^[54] on the computing cluster of PhLAM laboratory. The frozen-core approximation was used throughout. Dunning and co-workers correlation consistent basis set cc-pVXZ (X = D, T, Q) were used.^[55] All geometries were fully optimised at the MP2 and B98 levels using the tight convergence criterion. Extrapolations to complete basis set (CBS) for energies (including ZPE corrections) and rotational constants were performed using Dunning's formula.^[56] Frequencies and ground state ($v=0$) rotational constants were calculated at the anharmonic level (VPT2 calculations as implemented in the Gaussian software)^[57] with a tight SCF convergence criterion and the ultrafine integral grid option. Anharmonic corrections have been extrapolated from DFT (B98) to the MP2 level by following a method suggested by Barone et al.^[58] and recently successful in the case of various systems^[58,59] (denoted "hybrid" hereafter). Briefly, given that anharmonic calculations at the MP2 level are hardly affordable for such a relatively large molecule, rotational constants of a given vibrational state v (called "hybrid") are estimated by adding DFT anharmonicity (B98/CBS) to the MP2 constants at equilibrium (MP2/CBS) [Eqs. (1), (2), and (3)]:

$$A_v^{\text{hybrid}} = A_{\text{eq}}^{\text{MP2}} - (A_{\text{eq}}^{\text{B98}} - A_v^{\text{B98}}) \quad (1)$$

$$B_v^{\text{hybrid}} = B_{\text{eq}}^{\text{MP2}} - (B_{\text{eq}}^{\text{B98}} - B_v^{\text{B98}}) \quad (2)$$

$$C_v^{\text{hybrid}} = C_{\text{eq}}^{\text{MP2}} - (C_{\text{eq}}^{\text{B98}} - C_v^{\text{B98}}) \quad (3)$$





Figure 7. (a) Part of the observed mm-wave spectrum in the 87.3 GHz frequency region (black) with the low-pass FFT filter which reproduce the strong FP effect (red), the curves have been shifted in intensity for better readability, (b) Zoom on a 20 MHz wide region and (c) the difference between the experimental spectrum and the FFT filter (black) is compared to the calculated spectrum (blue).

ARTICLES

Is there any TNT taggant here? High-resolution measurements and analysis of 3-NT, one of the TNT explosive taggants, are performed at room temperature in the mm-wave region, providing a rotational line list crucial for future gas-phase detection.



A. Roucou,* I. Kleiner, M. Goubet,
S. Bteich, G. Mouret, R. Bocquet, F. Hindle,
W. L. Meerts, A. Cuisset*

■ ■ - ■ ■

**Towards the Detection of Explosive
Taggants: Microwave and Millimetre-
Wave Gas-Phase Spectroscopies of
3-Nitrotoluene**



Full Conformational Landscape of 3-Methoxyphenol Revealed by Room Temperature mm-wave Rotational Spectroscopy Supported by Quantum Chemical Calculations

Anthony Roucou,^[a] Daniele Fontanari,^[a] Guillaume Dhont,^[a] Atef Jabri,^[a] Cédric Bray,^[a] Francis Hindle,^[a] Gaël Mouret,^[a] Robin Bocquet,^[a] and Arnaud Cuisset^{*,[a]}

Room temperature millimeter-wave rotational spectroscopy supported by high level of theory calculations have been employed to fully characterise the conformational landscape of 3-Methoxyphenol, a semi-volatile polar oxygenated aromatic compound precursor of secondary organic aerosols in the atmosphere arising from biomass combustion. While previous rotationally-resolved spectroscopic studies in the microwave and in the UV domains failed to observe the complete conformational landscape, the 70–330 GHz rotational spectrum measured in this study reveals the ground state rotational signatures of the four stable conformations theoretically predicted. Moreover, rotational transitions in the lowest energy vibrationally excited states were assigned for two conformers. While the inertial defect of methoxyphenol does not significantly change between conformers and isomers, the excitation of the methoxy out-of-plane bending is the main contribution to the non-planarity of the molecule.

Methoxyphenols are emitted in quantities during biomass fires. They result from the pyrolysis of lignin and their oxidation in the atmosphere participates in the production of secondary organic aerosols whose impact to the climate seems to be decisive.^[1,2] The gas phase monitoring of these biomass burning tracers in the atmosphere requires rovibrational cross-sections^[3] which can be accurately simulated if the conformational landscape is determined both in the ground states (GS) and in the low-energy vibrationally excited states (ES) using rotational spectroscopy. The group of Schmitt *et al.* investigated the conformational landscape of the three isomers of methoxyphenol by combining rotationally resolved electronic spectroscopy in molecular beam and *ab initio* calculations. The experimental and theoretical results demonstrated a strong dependence of the conformational flexibility with the isomeric form: In Ref. [4], for 2-Methoxyphenol (commonly called guaicol), they observed a single conformation which is stabilized by an intramolecular hydrogen bond formation between the adjacent

phenol and methoxy functional groups. The para isomer 4-Methoxyphenol (commonly called mequinol) was also investigated in the same study and two possible conformers of the molecule, *trans* and *cis*, have been identified. Very recently, the conformational space of 3-Methoxyphenol (3-MP) has been specifically studied by the same group.^[5] For the meta isomer, four stable conformations are expected corresponding to the relative positions of the –OH and –OCH₃ groups in the benzene ring plane. Nevertheless, only three of the four possible conformers were characterized in their electronic GS and lowest excited single states on the basis of molecular parameters such as rotational constants, inertial defects and transition dipole moment orientation. Their results agree with previous hole-burning measurements in REMPI spectra performed by Ullrich *et al.*, which did not observe the fourth conformer with the –OH and –OCH₃ groups in “up” position.^[6] The absence of one conformer was explained by the non-planar structure of 3-MP in the electronic singlet state by weakening the electronic transition with an unfavorable Franck-Condon factor.

This difficulty may be overcome by probing pure rotational transitions in the GS but the spectroscopic analysis is complicated by the congestion of the rotational spectra due to rather small rotational constants, low-frequency vibrational modes and the overlapping between conformational fingerprints. To date, no high resolution pure rotational spectroscopy has been performed on methoxyphenols except for 3-MP where the 28–40 GHz microwave (MW) frequency range have been investigated by Caminati *et al.*^[7] They measured the rotational spectrum of 3-MP with a conventional Stark modulated spectrometer and the analysis revealed the presence of a single conformer while four plausible conformers were expected. In the present work, a frequency multiplication chain^[8] was used to measure, at the Doppler limit and at room temperature, pure rotational transitions of 3-MP in the 70–330 GHz frequency range. In addition, high level of theory DFT and MP2 calculations have been performed to analyse the conformational flexibility of 3-MP. Unlike previous works,^[5,6,7] our experimental results highlight the rotational signatures of the four stable conformations predicted theoretically. In addition to the GS assignment, rotational transitions in the vibrationally ES have been assigned for two conformers.

In order to identify the stable conformers of 3-MP and to predict their GS rotational and dipolar constants as accurately as possible, high level of theory quantum chemical calculations

were performed using Gaussian 16.^[9] Our strategy consisted in the use of larger basis sets compared to previous *ab initio* studies.^[6,5] Dunning *et al.* correlation consistent basis set were used from cc-pVDZ to cc-pV5Z.^[10] Extrapolations to complete basis set (CBS) for energies (including ZPE corrections), rotational and dipolar constants were performed using Dunning's equations^[11] with the B3LYP method. MP2 calculations were also performed but were limited to the cc-pVQZ method due to the higher computing cost. Figure 1(top) shows a scan of the potential energy surface (PES) in the GS as a function of the dihedral angles of the phenol and methoxy groups with the benzene ring plane. This PES was built with a step of 5° at the B3LYP/6-311++G(d,p) level of theory. Four conformations are identified and labelled as C1(180;180), C2(0;0), C3(180;0)

and C4(0;180) according to the values of the dihedral angles L(C2, C1, O11, H12) and L(C4, C3, O13, C14), respectively and are classified according to their increasing relative stabilities. On this PES, the accurate energies of the four minima and the four saddle points were calculated at the B3LYP/CBS and the MP2/cc-pVQZ levels of theory. All stable geometries were fully optimised at the MP2 and B3LYP levels using the tight convergence criterion. The heights of the barriers between conformers are in the range 1070 cm⁻¹–1230 cm⁻¹. Moreover, the V_3 barrier characterising the CH₃ internal rotation potential has been also calculated around 900 cm⁻¹ for the different conformers. With so high barriers, the splitting of the rotational lines due to tunnelling effects cannot be resolved in the mm-wave spectra. The geometries optimized at the MP2/cc-pVQZ level of theory are shown in Figure 1(bottom). Relative stabilities and populations of the four conformers of 3-MP according to MP2/cc-pVQZ and B3LYP/CBS calculations are reported in Table 1 with different molecular properties such as GS rotational constants, inertial defects and polar components of the permanent electric dipole vector in the *ab* plane. Our calculations may be compared with the previous study of Ref. [5] at the CC2/cc-pVTZ level of theory and the experimental data in the UV range,^[5] in the MW range^[7] and in the mm-wave range (this work). The calculations are in good agreement except for the dipole components. This can be easily explained by the fact that our mm-wave measurements consider the permanent dipole moment of 3-MP in the GS while the electronic transitions probed in UV by Wilke *et al.* involve the transition dipole moment between the ground and the lowest electronically ES.^[5]

The analysis of the 3-MP mm-wave spectra has been performed using SPFIT/SPCAT Pickett's programs^[12] and the AABS package from Kisiel.^[13,14] For the Hamiltonian, a Watson-type semi-rigid rotor model (reduction *A* and representation *I*) developed up to quartic centrifugal distortion constants was used to reproduce the measured transitions at the 100 kHz experimental accuracy. The GS of the C2(0;0) conformer has been firstly assigned using the experimental rotational constants and dipole moment of Ref. [7]. The fit was extended from $J''_{\max} = 22$ to 175 including 6570 transitions. The C1(180;180) and C3(180;0) conformers were easily identified in the mm-wave spectra starting from the GS rotational constants (*A'*, *B'*, *C'*) determined from UV molecular analysis (see Table 1 and Ref. [5]). In the 70–330 GHz frequency range, 1176 and 4623 rotational transitions were assigned for C1(180;180) and C4(180;0), respectively. Sections of 15 GHz, 1.5 GHz and 0.3 GHz of the mm-wave 3-MP spectrum in the 200 GHz frequency region are shown in Figure 2 (black spectrum) highlighting the huge density of lines. Even after the successful analysis of the GS of the three most stable conformers, numerous rotational lines remained non-assigned (see Figure 2 (blue spectrum)). Therefore our strategy was to identify the spectroscopic signatures of the fourth C4(0;180) conformer and to look for pure rotational transitions in the lowest energy vibrationally ES. Because the C4(0;180) conformer was never observed, we started the analysis using *ab initio* constants calculated at the B3LYP/CBS level of theory (see Table 1) scaled with a factor





Figure 1. Top: PES describing the conformational space of 3-MP built with a step of 5° at the B3LYP/6-311++G(d,p) level of theory. Local minima and saddle points are respectively marked with a red dot and a green cross. Bottom: geometries of the four stable conformers of 3-MP optimized at the MP2/cc-pVQZ level of theory shown in the *ab* inertial plane with the permanent dipolar vector (blue arrow).

[a] A. Roucou, Dr. D. Fontanari, G. Dhont, Dr. A. Jabri, Dr. C. Bray, F. Hindle, Prof. G. Mouret, Prof. R. Bocquet, Prof. A. Cuisset
Laboratoire de Physico-Chimie de l'Atmosphère, CNRS EA-4493, Université du Littoral, Côte d'Opale, 59140 Dunkerque, France
E-mail: arnaud.cuisset@univ-littoral.fr

Supporting information for this article is available on the WWW under <https://doi.org/10.1002/cphc.201800148>

Table 1. Calculated and experimental GS parameters of the four conformers of 3-MP: Relative energies ΔE , calculated and semi-experimental populations at $T = 298.15$ K, inertial Defects $\Delta I'' = I_a - I_b - I_c$ and polar coordinates (μ ; θ) of the permanent dipole vector.

Unit	Calculation Ref. [5]: CC2/cc-pVTZ	This work: MP2/cc-pVQZ	This work: B3LYP/CBS	Experiment Ref. [7]: MW	Ref. [5]: UV	This work: mm-wave
C1(180;180)						
ΔE	cm^{-1}	0	0	0		
Population	%	36.2	35.3	35.2		45.6
A''	MHz	2830.76	2849.26	2860.46	2841.06 (11)	2840.8815 (55)
B''	MHz	1313.51	1319.46	1301.83	1303.46 (2)	1303.52742 (143)
C''	MHz	902.32	906.99	899.76	899.02 (2)	898.982164 (103)
$\Delta I''$	$\text{amu} \cdot \text{\AA}^2$	-3.20	-3.19	-3.20	-3.46	-3.42823 (83)
μ	D		0.77	0.72		
θ^*	$^\circ$	16	± 35.6	± 41.3		$\pm 19.9(1)$
C2(0;0)						
ΔE	cm^{-1}	50	36	45		
Population	%	28.3	29.6	28.2		25.3
A''	MHz	3641.40	3663.76	3654.95	3628.68 (5)	3628.47 (74)
B''	MHz	1132.48	1138.26	1129.45	1129.682 (3)	1129.75 (3)
C''	MHz	868.58	873.24	867.56	866.625 (3)	866.68 (3)
$\Delta I''$	$\text{amu} \cdot \text{\AA}^2$	-3.2	-3.20	-3.20	-3.479	-3.46823 (10)
μ	D		1.74	1.78	1.72(3)	
θ^*	$^\circ$	7	± 5.3	± 7.1	$\pm 15.5(13)$	$\pm 9.9 (3)$
C3(180;0)						
ΔE	cm^{-1}	98	81	77		
Population	%	22.4	23.7	24.1		21.5
A''	MHz	3634.53	3656.55	3654.63	3624.13 (62)	3625.235359 (91)
B''	MHz	1135.29	1141.07	1131.30	1131.59 (2)	1131.967582 (42)
C''	MHz	869.84	874.48	868.63	867.48 (2)	867.7652716 (288)
$\Delta I''$	$\text{amu} \cdot \text{\AA}^2$	-3.2	-3.19	-3.20	-3.47	-3.475145 (40)
μ	D		2.01	1.92		
θ^*	$^\circ$	3	± 80.3	± 78.6		$\pm 8.8 (2)$
C4(0;180)						
ΔE	cm^{-1}	206	229	211		
Population	%	13.1	11.4	12.5		7.6
A''	MHz	2839.75	2858.40	2864.91		2847.05497 (54)
B''	MHz	1307.00	1312.90	1297.13		1298.127597 (128)
C''	MHz	900.16	904.82	897.95		897.065116 (38)
$\Delta I''$	$\text{amu} \cdot \text{\AA}^2$	-3.21	-3.19	-3.20		-3.453841 (96)
μ	D		2.41	2.45		
θ^*	$^\circ$	19	± 54.1	± 53.2		

* θ is the angle of the permanent dipole moment with the main inertial axis a .**Figure 2.** Experimental mm-wave spectrum of 3-MP (in black) is compared to two simulated spectra: the first one (in blue) includes the GS of C1(180;180), C2(0;0) and C3(180;0); the second one (in red) includes the previous contributions and the GS of C4(0;180) plus the vibrationally ES for C2(0;0) and C3(180;0). A large section of 15 GHz (a) is zoomed in a 1.5 GHz section (b), itself zoomed in a 0.3 GHz section (c), showing the density of lines.

determined by the ratio between experimental and calculated rotational constants of the C2(0;0) conformer. This method^[15] allowed to predict GS rotational constants of C4(0;180) with a relative accuracy better than 10^{-3} and to provide the first experimental evidence of the fourth stable conformer of 3-MP with the observation and the assignment of 4623 GS a-type and b-type transitions in the mm-wave spectra. In a final step,

rotational transitions in the lowest energy vibrational ES of the two conformers C2(0;0) and C3(180;0) were observed and assigned. B3LYP/cc-pVTZ calculations at the anharmonic level with a tight SCF convergence criterion and the ultra-fine integral grid option were performed to characterize the vibrational modes and to calculate as accurately as possible the variations of the rotational constants in the vibrationally ES. The

Table 2. First part: summary of the fitted parameters of 3-MP in the GS, 1σ uncertainties are quoted in parentheses in the unit of the last digit. Second part: the number N of assignments in the fit, maximum values of quantum number J_{max}^m and K_{max}^m and standard and unitless standard deviations.

Parameter	Unit	C1(180;180) Exp.	C2(0;0) Exp.	C3(180;0) Exp.	C4(0;180) Exp.
A	MHz	2840.8815 (55)	3628.74476 (136)	3625.235359 (91)	2847.05497 (54)
B	MHz	1303.52742 (143)	1129.694225 (50)	1131.967582 (42)	1298.127597 (128)
C	MHz	898.982164 (103)	866.7652716 (288)	867.7652716 (288)	897.065116 (38)
Δ_a	kHz	0.05094 (36)	0.02355328 (113)	0.02332568 (184)	0.0503420 (72)
Δ_b	kHz	0.4022 (153)	0.54057 (103)	0.532587 (35)	0.38337 (36)
Δ_{JK}	kHz	-0.09793 (244)	0.0631726 (88)	0.0651291 (157)	-0.091484 (53)
δ_J	Hz	18.214 (183)	5.96063 (66)	5.87244 (87)	17.9047 (36)
δ_K	Hz	79.73 (106)	85.686 (40)	84.3342 (277)	81.030 (48)
N a-type		934	0	6570	1850
N b-type		842	0	4623	2063
J_{max}^m		130	175	159	149
K_{max}^m		22	63	50	31
Stand. Dev.	MHz	0.0724	0.0748	0.0758	0.0759
Unitless stand. dev.*	unitless	1.035	1.065	1.083	1.084

*The unitless standard deviation of a set of N calculated frequency transition f_i^{calc} compared to a set of experimental frequency transitions f_i^{exp} measured with experimental error Δ_i is defined as: $\sqrt{\frac{1}{N} \sum_i \left(\frac{f_i^{\text{calc}} - f_i^{\text{exp}}}{\Delta_i} \right)^2}$.

two lowest energy fundamental modes of 3-MP correspond to the out-of-plane bending of the -OCH3 group and to the -CH3 torsion. The band center of the lowest energy fundamental vibration $\nu_6=1$ was measured by Fourier Transform (FT) Far-IR spectroscopy at 78.3 cm^{-1} by our group in Ref. [3]. Because the methyl torsion is non-active in the Far-IR, only our DFT calculations provide a rough idea of its vibrational energy around 240 cm^{-1} .^[3] Nevertheless, a very weak vibrational band centred around 152 cm^{-1} was observed in the FT Far-IR spectrum.^[3] This band may be assigned to the overtone $\nu_6=2$ of the methoxy out-of-plane bending, which is predicted at 174.6 cm^{-1} by anharmonic B3LYP/cc-pVTZ calculations. The fit of rotational transitions in the vibrationally ES for the C2(0;0) conformer confirms this hypothesis. Indeed, the Table 3 shows the excellent agreement between the fitted and calculated rotational constants for C2(0;0) in $\nu_6=1$ and $\nu_6=2$ and for C3(180;0) in $\nu_6=1$. In Ref. [7], Caminati *et al.* assigned MW rotational lines to three satellites ($\nu_1=1, 2, 3$) of the C2(0;0) conformer of 3-MP. In this study, starting from the molecular parameters fitted in the MW frequency range, the mm-wave study allowed to extend the assignment up to $J_{\text{max}}=170$ with the complete determination of the quartic centrifugal constants. Rotational transitions in the $\nu_6=1$ ES were also observed and assigned for the C3(180;0) conformer. In this last case, a very good estimation of the rotational constants was obtained by scaling the GS experimental constants with a factor defined by the ratio between the anharmonic B3LYP/cc-pVTZ rotational constants of the $\nu_6=1$ state and their equivalent in the GS (see Table 3).

We notice that, due to the weakness of their lines, we failed to assign rotational transitions in the $\nu_6=1$ states of the C1(180;180) and C4(0;180) conformers. As shown in Tables 2 and 3, all the fits performed in this study provide standard deviations close to 80 kHz (the unitless standard deviations are always close to 1) and all the rotational constants up to quartic centrifugal distortion terms are experimentally determined, which allows to reproduce the mm-wave spectra at the

experimental accuracy. The complete line list is provided in the supporting information.

The amplitude and the orientation of the permanent dipole moment is very sensitive to the conformation (see Table 1 and Figure 1). Our *ab initio* calculations show that the conformer C1(180;180) with the lowest energy has the weakest dipole moment and, reciprocally, the conformer C4(0;180) with the highest energy has the strongest dipole moment. This situation explains why the four stable conformers contribute significantly to the mm-wave spectrum with GS rotational lines close in intensity as shown in Figure 3. The good agreement of our calculated dipole vector for the C2(0;0) and C3(180;0) conformer and the Stark measurement performed by Caminati *et al.*^[7] and the number of a-type and b-type transitions assigned in the fits (see Table 2) ensure the quality of our calculations both in MP2/cc-pVQZ and B3LYP/CBS levels of theory. While, for the C1(180;180) and C4(0;180) conformers both a-type and b-type transitions were assigned, for the C2(0;0) and C3(180;0) only b-type and a-type transitions were observed, respectively. For the calculations of the GS mm-wave spectra using the SPCAT program,^[12] the components of dipole vector in the (a, b) inertia plane were fixed to the *ab initio* values and the conformational populations were fitted with the ASCP program^[13,14] by considering the measured intensities. Therefore semi-experimental populations were determined for each conformer (see Table 1). The determined values do not modify the energetic classification between the four conformers but the semi-experimental populations are slightly different compared to the *ab initio* predictions with the C1(180;180) and C4(0;180) conformers respectively more and less abundant. The Figure 4a shows the evolution of the relative accuracy of the GS rotational constants for the four conformers of 3-MP. Compared to previous CC2/cc-pVTZ calculations,^[15] the B3LYP/CBS calculations improve the prediction of the B and C constants by one order of magnitude. From the experimental point of view, the GS rotational constants are determined at the kHz level. Compared to the

Table 3. First part: summary of the fitted parameters in the $v_0=1$ and $v_0=2$ ES compared with anharmonic corrected B3LYP/cc-pVTZ calculation. 1σ uncertainties are quoted in parentheses in the unit of the last digit. The inertia defect is obtained by $\Delta I = I_a - I_b - I_c$. Second part: the number N of assignments in the fit, maximum values of quantum number J_{\max}^a and K_{\max}^b and standard and unitless standard deviations.

Parameter	Unit	$v_0=1$		$v_0=2$			
		C2(0,0) Exp.	Calc.*	C3(180,0) Exp.	Calc.*	C2:(0,0) Exp.	Calc.*
ν_{ham}	cm ⁻¹		87.3		86.6		174.6
ν_{anham}	cm ⁻¹	78.3**	80.2	78.3**	82.9	151.9**	159.0
A	MHz	3615.98914 (157)	3615.79	3605.03423 (137)	3612.28	3603.19449 (189)	3602.86
B	MHz	1130.478542 (55)	1130.42	1133.495105 (159)	1132.69	1131.283069 (70)	1131.15
C	MHz	867.650530 (47)	867.59	868.812985 (55)	868.73	868.692281 (56)	868.55
ΔI	amu. Å ²	-4.34266 (11)	-4.284	-4.35697 (15)	-4.297	-5.21953 (14)	-5.192
Δ_J	kHz	0.02393331 (137)		0.0235124 (104)		0.02435709 (178)	
Δ_K	kHz	0.55091 (150)		0.49908 (115)		0.52144 (174)	
Δ_{JK}	kHz	0.0637319 (148)		0.062605 (274)		0.0642602 (183)	
δ_J	Hz	5.98882 (74)		5.7885 (52)		6.00687 (97)	
δ_K	Hz	84.276 (46)		78.627 (122)		81.346 (59)	
N a-type		4861		0		3117	
N b-type		0		997		0	
J_{\max}^a		170		144		160	
K_{\max}^b		57		25		55	
Stand. Dev.	MHz	0.0791		0.0819		0.079	
Unitless stand. dev.	unitless	1.123		1.169		1.106	

*Frequencies and rotational constants in the ES were calculated at the B3LYP/cc-pVTZ level of theory. The rotational constants A, B, C were corrected following the relation: $[A, B, C]_{\text{Corr.}}^{\text{ES}} = [A, B, C]_{\text{Exp.}}^{\text{ES}} \times \frac{[A, B, C]_{\text{anham}}^{\text{B3LYP/cc-pVTZ}}}{[A, B, C]_{\text{anham}}^{\text{B3LYP/cc-pVTZ}}}$ equations.^[19] **FT Far-IR measurements [3].




Figure 3. (a) The mm-wave spectrum (70–110 GHz) in black is compared with the fitted spectra of each conformer in the GS and ES (OCH₃ out-of-plane bending ($v_0=1, 2$)). (b) and (c) are zoom of 300 MHz in 94350 and 103150 MHz regions respectively, each contribution is identified with the code colour of (a).

UV measurements,^[5] the accuracies of the GS rotational constants and the inertial defects were improved by at least two orders of magnitude (see Table 1). With such a degree of accuracy, we can conclude that the inertial defect is not dependent on the conformation as it was neither isomeric dependent by considering the results obtained on 2-MP and 4-MP in UV.^[4] Nevertheless, our experimental results show an increasing of the inertial defect with the excitation of the methoxy out-of-plane bending as it was already observed in

the MW domain by Caminati *et al.*^[7] and with the anisole molecule which presents inertial defects very close to 3-MP.^[16] This last point seems to indicate that the phenol group does not impact the planarity of the 3-MP molecule contrary to the methyl internal rotor in methylanisole where the inertial defects are significantly larger compared to methoxyphenol.^[17,18]

The 70–330 GHz mm-wave rotational spectra of 3-MP were measured at room temperature using a frequency multi-




Figure 4. Evolution of the relative accuracy $\delta = | \text{experimental} - \text{calculated} |$ of the rotational constants for the GS of the four conformers in (a) and for ES of C2(0,0) and C3(180,0) in (b). The rotational constants A, B and C correspond to the triangles, the squares and the circles respectively. In Figure 4 (a), CC2/cc-pVTZ level of theory calculations refer to Ref. [5], B3LYP/CBS calculations have been performed in this study, M. Wilke *et al.* are experimental values of Ref. [5], and Caminati *et al.* are the experimental values of Ref. [7]. In Figure 4 (b), the anharmonic B3LYP/cc-pVTZ calculations have been performed in this study. The corrected values are determined by scaling the experimental GS constants scaled with the ratio $\frac{[A, B, C]_{\text{anham}}^{\text{B3LYP/cc-pVTZ}}}{[A, B, C]_{\text{anham}}^{\text{B3LYP/cc-pVTZ}}}$ obtained with the anharmonic B3LYP/cc-pVTZ calculations.

plication chain. In addition, B3LYP/CBS and MP2/cc-pVQZ high level of theory calculations was performed in order to analyse the conformational flexibility of 3-MP. Unlike previous MW^[1] and UV studies,^[5,6] our mm-wave analysis revealed the four stable conformations predicted theoretically. The conformer with the lowest energy has the weakest dipole moment and, reciprocally, the conformer with the highest energy has the strongest dipole moment. To reproduce the measured spectra of the four conformers at the experimental accuracy, the GS rotational constants are fitted at the kHz level of accuracy and the complete sets of quartic centrifugal distortion constants are determined. In addition to the GS assignment, rotational transitions in the vibrationally ES associated with the methoxy out-of-plane bending have been assigned for two conformers. While the degree of non-planarity does not seem to be sensitive to the conformation and isomerism of 3-MP, this out-

of-plane vibration contributes to the inertial defect of the molecule. A similar study of 2-MP (guaiaicol) and 4-MP (mequinol) has been undertaken to better understand the isomerism influence on the conformational landscape of methoxy-aromatic compounds.

Experimental Section

3-MP was purchased from Alpha Aesar with a stated purity of 97% and mostly purified of methanol traces by continuous pumping. The room temperature absorption spectrum of 3-MP was measured in the mm-wave domain (70–330 GHz). A continuous flow at a pressure of 11 μ bar was maintained by a roughing pump. The mm-wave radiation was passed through a 125 cm-long and 56 mm-diameter double path stainless steel absorption cell equipped with Teflon windows and probed by the radiation generated by a frequency multiplier chain described in Ref. [8]. The double pass configuration used in Ref. [19] has been made possible by adding a polarization grid and a rooftop mirror. Two off-axis parabolic mirrors are used, one before the grid to collimate the radiation into the cell and one after the grid to refocus it on a liquid helium cooled InSb bolometer (140–330 GHz) or at the entrance of the detector stage formed by a horn antenna and a zero bias Schottky diode (70–110 GHz). To optimise the spectrometer sensitivity a frequency modulation was added to the mm-wave source, while the signal detection was performed by a standard lock-in amplifier operating at the second harmonic of the modulation frequency. The frequency was modulated at 10 kHz with a depth in the range of 300 to 900 kHz, the individual frequency points were measured with an integration time of 50 ms or 200 ms and steps of 60 to 180 kHz. The baseline arising from Fabry-Pérot (FP) effects with an amplitude and a width around 50 times larger than the molecular intensities and linewidths, respectively, was easily removed by using a low pass FFT filter subtracted from the spectrum as described in Ref. [20]. The spectral resolution is limited to 100 kHz since the observed lines are Doppler limited ($\Delta\nu_{\text{Doppler}} \approx 90$ kHz (FWHM)) and artificially broadened by the frequency modulation.^[8] The experimental error of measured line frequencies was estimated to about 70 kHz using Eq. 2 of Ref. [21] taking into account the averaged S/N ratio (≈ 5), the frequency step and the molecular linewidth.

Acknowledgements

The present work takes place in the Labex CaPPA (Chemical and Physical Properties of the Atmosphere) funded by the French National Research Agency (ANR) through the PIA (Programme d'Investissements d'Avenir) under contract ANR-11-LABX-005-01. We thank the PhD financial supports of A. Roucou, i.e. the région Hauts-de-France and the French Délégation Générale pour l'Armement (DGA). The authors are also grateful for the financial support received from the Région Hauts-de-France, the Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (CPER Climibio), and the European Fund for Regional Economic Development. Finally, the authors would like to thank the Centre de Ressources Informatiques de Lille 1 (CRI) for the computational cluster.

Conflict of Interest

The authors declare no conflict of interest.


Keywords: rotational spectroscopy · conformation analysis · methoxyphenol · molecular modelling · biomass

- [1] W. Ahmad, C. Coeur, A. Tomas, T. Fagniez, J.-B. Brubach, A. Cuisset, *Appl. Opt.* **2017**, *56*, E116–E122.
- [2] A. Lauragais, C. Coeur-Tourneur, A. Cassez, K. Deboudt, M. Fourmentin, M. Choël, *Atmos. Environ.* **2014**, *86*, 155–163.
- [3] A. Cuisset, C. Coeur, G. Mouret, W. Ahmad, A. Tomas, O. Pirali, *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer* **2016**, *179*, 51–58.
- [4] J. A. Ruiz-Santoyo, M. Rodríguez-Matus, J. L. Cabellos, J. T. Yi, D. W. Pratt, M. Schmitt, G. Merino, L. Álvarez-Valtierra, *J. Chem. Phys.* **2015**, *143*, 094301.
- [5] M. Wilke, M. Schneider, J. Wilke, J. A. Ruiz-Santoyo, J. J. Campos-Amador, M. E. Gonzalez-Medina, L. Álvarez-Valtierra, M. Schmitt, *J. Mol. Struct.* **2017**, *1140*, 59–66.
- [6] S. Ullrich, W. D. Geppert, C. E. H. Dessent, K. Müller-Dethlefs, *J. Phys. Chem. A* **2000**, *104*, 11864–11869.
- [7] W. Caminati, S. Melandri, L. B. Favero, *J. Mol. Spectrosc.* **1993**, *161*, 427–434.
- [8] G. Mouret, M. Guinet, A. Cuisset, L. Croize, S. Eliet, R. Bocquet, F. Hindle, *IEEE Sens. J.* **2013**, *13*, 133–138.
- [9] M. J. Frisch et al., Gaussian16 Revision A.03. Gaussian Inc. Wallingford CT **2016**.
- [10] R. A. Kendall, T. H. Dunning Jr, R. J. Harrison. *J. Chem. Phys.* **1992**, *96*, 6796–6806.
- [11] D. E. Woon, T. H. Dunning Jr., *J. Chem. Phys.* **1994**, *101*, 8877–8893.
- [12] H. M. Pickett. *J. Mol. Spectrosc.* **1991**, *148*, 371–377.
- [13] Z. Kisiel, E. Białkowska-Jaworska, L. Pszczółkowski, *J. Chem. Phys.* **1998**, *109*, 10263–10272.
- [14] Z. Kisiel, E. Białkowska-Jaworska, L. Pszczółkowski, *J. Mol. Spectrosc.* **2000**, *199*, 5–12.
- [15] A. Roucou, G. Dhont, A. Cuisset, M. A. Martin-Drumel, S. Thorwirth, D. Fontanari, W. L. Meerts, *J. Chem. Phys.* **2017**, *147*, 054303.
- [16] B. Reinhold, I. A. Finneran, S. T. Shipman, *J. Mol. Spectrosc.* **2011**, *270*, 89–97.
- [17] L. Álvarez-Valtierra, J. T. Yi, D. W. Pratt, *J. Phys. Chem. B* **2006**, *110*, 19914–19922.
- [18] L. Ferres, H. Mouhib, W. Stahl, H. V. L. Nguyen, *ChemPhysChem* **2017**, *18*, 1855–1859.
- [19] A. M. Daly, L. Kolesnikova, S. Mata, J. L. Alonso, *J. Mol. Spectrosc.* **2014**, *306*, 11–18.
- [20] A. Roucou, I. Kleiner, M. Goubet, S. Bteich, G. Mouret, R. Bocquet, F. Hindle, W. L. Meerts, A. Cuisset, *ChemPhysChem* **2018**, DOI:10.1002/cphc.201701266.
- [21] M. Martin-Drumel, F. Hindle, G. Mouret, A. Cuisset, J. Cernicharo, *Astrophys. J.* **2015**, *799*(2), 115.

Manuscript received: February 16, 2018
Version of record online: March 30, 2018

COMMUNICATIONS

Potential energy surface of the conformational landscape of 3-Methoxyphenol. Four conformers have been identified, C1 is the most stable and C4 the less stable. Parts of 1 GHz of their simulated mm-wave spectrum are presented.



A. Roucou, Dr. D. Fontanari, G. Dhont, Dr. A. Jabri, Dr. C. Bray, F. Hindle, Prof. G. Mouret, Prof. R. Bocquet, Prof. A. Cuisset*

1 – 8

Full Conformational Landscape of 3-Methoxyphenol Revealed by Room Temperature mm-wave Rotational Spectroscopy Supported by Quantum Chemical Calculations

